

Q. 2403

COMMENTARII  
DE REBUS  
IN  
SCIENTIA NATVRALI  
ET  
MEDICINA  
GESTIS.



VOLVMINIS V. PARS I.

---

LIPSIAE, MDCCLVI.  
APVD IOH. FRIDERICVM GLEDITSCH.  
Venduntur etiam  
Amstelodami apud I. Schreuder et P. Mortier iun. Londini apud A.  
Linde, Parisiis apud Briasson, Patavii apud I. Manfr , Venetiis in B.  
Albrizzi et S. Coleti officinis, Romae apud Venant. Monaldini.









# I.

Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar, för År 1753. Vol. XIV. Med. Kongl. Academiens Tillstånd. Tryckte i Stockholm hos Lars Salvius på dess egen kostnad. 8. pl. 20. tab. aen. 8.

i. c.

Acta Academiae Regiae Scientiarum Suecicae.  
Annus 1753. Vol. XIV.

**T**rimestre primum :

1) Cl. SCHEFFERS *artis metallorum a se inuicem separandorum historiam* continuat, iam in primis de caementatione agens, quod artificium ait antiquum esse et obsoletum, ex quo commodiores et parabiliores methodi, eidem fini obtinendo inseruietes innotuere, ita, ut errent, qui velut nouum illud tradunt.

2) *De partibus corporis humani sensibilibus et irritabilibus* Ill. ALBERTI DE HALLER dissertatio legitur eadem, quae reperitur in Comment. Societ. Reg. Scient. Gotting. Tom. II. pag. 114. ad 134. Sectio scilicet prima, in Suecicum sermonem translata\*.

A 2

3) *Nouas*

\* vid. Comment. nostr. Vol. II. Part. IV. p. 695. seqq.



P. 37.

3) *Nouas duas Tabaci species* edit Cl. CAROL. LINNAEVS. Sunt vero in eius Speciebus plantarum, Homiae 1753 editis, *Nicotianae species* 3 et 4, pag. 180. 181, ipsi *paniculata* et *glutinosa* appellatae. Vtriusque figuram exhibet; Prioris iconem Cl. FEVILLÉE in itinere Peruuiano dederat, quam mediocrem esse ait Noster, et talem, ex qua planta agnosci non possit. Simillima est *paniculata turcicae*, (ita Cl. LINNAEVS secundam *Nicotianae* speciem in spec. plant. p. 180. appellat, ibi *rusticam* vocatam). Folia scilicet aequae ad rotunditatem accedunt, florum color idem est, illi aequae obtusi sunt; caulis vero et pediculi florum ac foliorum, flores etiam ipsi duplo longiores et angustiores sunt in *paniculata*, quam in *turcica*, ut varietatem quis existimare possit ex loci conditione natam, nisi fructus in primis aliter esset comparatus, conis ad modum in acumen desinens, ut in vulgari *nicotiana americana*. Huius quidem *nicotianae*, ut et alterius, semina Noster accepit a Cl. IVSSIEV, et haec quidem *paniculata* liberum aerem egregie tulit, laete adoleuit, et semina innumera produxit. Ex odore et sapore iudicat leniorem hanc *nicotianae* speciem fere reliquis omnibus, ut vel sexui sequiori commendari possit, si hunc fumandi cupido occupet. Tum hanc ob causam, tum etiam ob habitum eius gracilem, in vernacula *Tabacum virginum* appellari vult. Altera species, de qua iam agit, nulli adhuc botanico descripta est. *Foliis* gaudet cordatis, *flores* in racemum secundum, quem vocat, dispositi sunt, seu omnes ad idem latus conuersi. *Calix* quinquifidus, sed superiore lacinia duplo maiore reliquis, quo caractere facile haec species ab aliis distinguitur. *Corollae* color obscurior est, quam in *americana*, neque regularis est; sed galeae ad modum versus latus ringit; *fructus* acuminatus. Plantae caulis, pediculi et folia filis tenuibus teguntur, liquorem glutinosum exsudentibus, qui  
digitis



digitis prehendentis adhaeret. Ex odore, sapore, glutine et floris colore tristiore colligit Noster fortio- rem hanc speciem esse reliquis huc usque notis, insigni tabacopolarum usui, quo gustibus omnibus accommodare se possint. Igitur et ob flores galeae similes, et quia credit nicotianae huius vires eas fu- turas, quae sunt opii, dum a Turcis praelium orsu- ris adhibetur, *tabacum militum* vernacula lingua ap- pellari vult. Maiori vero cura haec species indiget, ut maturescat, saltem in Suecia, sperat tamen et huic climati eam adsuesieri posse, dum modo veris tem- pore terrae fimo substrato inferatur, post terrae bo- nae implantetur. Ceterum de tabaci usu, nisi qua- tenus medicina est, minus bene sentire Nostrum, iam aliunde constat.

4) *De Gypso.* Obseruationes exhibet Cl. ALEX. p. 44. FRID. CRONSTEDT eo potissimum tendentes, ut via monstretur inuestigandi, num eodem modo gypsum natura condatur, quo arte ex lapide efficitur.

5) Cl. POLHEMII inuentum *contignationes*, quae p. 48. *fluctibus obsistant*, nullo adhibito ferro *construendi*, filius eius explicat.

6) Cl. KALMIVS in edendis obseruatis suis de p. 52. *serpente crotalophoro* pergit. Egregie natat serpens hic per mare et per fluuios velocius fere, quam su- per terra progreditur. Ad modum vesicae inflatae natare videtur. Natantem e nauicula adgredi tutum non est, quia facile in eam se proiicit. Odor eius ingratus est, in primis quando apricatur, aut valde iratus est. Hoc odore, saepius non visus vel audi- tus, detegitur. Aiunt eo veluti veneno hominem interdum in mortis periculum deduci. Equi et bo- ues praesentiam serpentis plerumque ex odore agno- scunt, nisi cum ventus a loco, in quo constituti sunt,

versus serpentes tendit: tali enim casu ipsius auctoris equus proxime ad serpentem accessit. Raro hominibus nocet, nisi defendendi sui gratia. Passus est hominum pedes sibi imponi, nesciorum quid esset; dormientibus obrepfit, nullo illorum damno. Neque tamen mansuetudini huic fidere fas est, quae in primis satur utitur, atrox dum esurit, item tempestate pluvia. Iulio mense rarius mordere aiunt barbari. Non mordet, nisi ante in circulum conuolutus. In rectam lineam extensus damnum dare non potest, sed hunc situm cum altero illo velocissime permutat, tardus alioquin in progrediendo. Is est inter serpentes Americae orientalis, qui morsus quam longissime se proiciat, neque tamen ultra dimidiam longitudinem corporis sui. Proiecturus se parti posteriori corporis sui innititur, non faciens hoc, nisi certus fere sit, attingere se posse, ad quod collineat.

Quae accidunt iis, quos momordit, alii iam explicarunt. Huc pertinet, quod dolor inde natus sub initium non maior sit, quam si membrum spina laesum fuisset, donec anxietas, virium prostratio et intumescencia mali magnitudinem ostendant. Locus, in quo laesio contigit, nihil monstrat praeter quam foramina duo, velut acu facta. Sequitur sitis imensa et dolor vehementissimus circa cor. Sienti potum praebere est mortem praesentem exhibere. Lingua intumescit eo usque, ut os totum occupet; praeter ea nigrescit. Haec quam longissime vim veneni progressam esse ostendunt, quidam tamen et ex eo statu sanitati restituti sunt. Corpus totum maculis variis notatur, creduntque laesum coloribus serpentis, qui momordit, variegari. Tandem si auxilium nullum adhibeatur, sensum omnem perdit agrotus et moritur. Saepius etiam, qui post morsum sanitati restituti sunt, colore tamen flauescente et facie ingrate maculosa per omne residuum vitae tempus notantur. Alii quantumvis bene valere sibi videant.



deantur, quotannis eo tempore, quo morsus contingit, dolorem singularem in corpore sentiunt, simul intumescuntibus partibus, quae mala decocto aristolochiae lenienda sunt. Retulit quidam Nostro, territum se improuisa serpentis vicinia, ceterum nihil laesum, prostrationem virium tantam sensisse, ut aliorum auxilio, domum iturus, indiguerit. Integris quatuordecim diebus post ea illa diei hora, qua territus fuerat, lecto decumbendum ipsi erat, ob dolorem vehementem in tergo et capite, reliquam totam diem ante et post illam horam bene valebat. Idem veneni effectus est in bruta; a viro fide digno accepit Noster, canem a serpente laesum, decocto aristolochiae sanatum, sequenti anno, eo tempore, quo laesus fuerat, rursus aegrotasse, eodem remedio denuo cum fructu adhibito; secunda vice laesum et sanatum esse, sed anno, qui hanc alteram laesionem sequebatur, circa laesionis tempus rursus aegrotasse et in rabiem incidisse, ut occidendus fuerit. Vaccae, equi, cet. plerumque statim a morfu obeunt. Canes diutius perdurant, et saepius conualescunt. Vidit canes quinquies laesos et semper restitutos, licet valde aegrotassent et intumuissent: alii tamen canes statim ut laesi conciderunt. Ocreas interdum pertundit serpens longis suis et acutis dentibus, et tunc, si ocreae pedem accurate includant, ut difficulter exui possint, insigni laesi malo id contingit. Tutiores sunt amplae illae caligae, quibus nautae utuntur, ad talos usque demissae, quae tum quia cedunt, tum quia corrugantur, ictus vim eludunt. Tutissimum est, adhuc sub his caligis ocreas gestare. Quidam ocreis indutus, in quibus serpentis morsus euaneerat, cum aliquo tempore post illis denuo uti vellet, et manum per superficiem earum inuncturus duceret, a dente in areis residua adeo vulneratus esse fertur, ut diem obierit. Periculi plenum aiunt, ocreis uti, quae morsum serpentis pertulerunt, ob dentes ple-

rumque in illis relictos. Cl. KALMIVS tamen in patriam redux, felem vulneravit dentibus, quos in America ex ore serpentis secuerat, nullo felis damno. Americani dentibus his ad venae sectionem utuntur, a veneno prius purgatis.

Nutritur serpens auiculis, ranis, sciuris et leporibus illis parvis, qui in America septentrionali reperiuntur, inter leporem et cuniculum mediis, item animali quodam *Minck* dicto, lutrarum ad modum aquas inhabitante, figura, magnitudine, colore ad martem accedente. Vbi serpens maioris animalis, ut leporis, sciuri potitus est, dimidium eius deglutit, post quietus iacet, dimidium hoc ore tenens, donec absumtum, deinde residuum deglutit.

Aiunt serpenti huic vim esse auiculas et animalcula fascinandi, ita quidem, ut, dum ad radicem arboris v. g. procumbit, animalculo vel in summa arbore constituto, oculis in illud defixis efficiat, ut continuo magis magisque ad se animal adpropinquet, interdum quidem adscendens rursus arborem, sed rediens rursus versus serpentem, hosque itus reditusque alternatim tam diu continuans, donec in os hians serpentis profiliat, inter ea gemitum edens. Noster plures modos proposuit fascinandi hanc vim explicandi. Vel enim laesum est animal a serpente, ut longe progredi non possit, vel ad fulgentes ignis ad modum serpentis oculos obstupescit, vel odore serpentis sensus eius velut perturbantur\*. Loquuntur de hac serpentis vi fascinatrice, americae incolae omnes, docti et indocti, sed qui oculis suis eam vidisse adseruissent, KALMIVS vix decem vel duodecim reperit. Captum serpentem, et in carcere vel  
ut

\* Primam in primis causarum, quas Cl. KALMIVS recenset, fascinationi huic explicandae adhibuit HANS SLOANE Transact. philos. n. 439. art. I. Cogitata eius germanice exhibentur in *Hamburg. Magazin.* Vol. IIII. Part. IV. art. 7.



ut adseruatum, nihil amplius comedere, fide digni testes adseruerunt Nostro, etsi dimidium annum famem perferre possit. Alii, propria experientia nixi, captum etiam serpentem hac fascinandi vi uti testantur.

In sanando vulnere, quod serpens inflixit, satis felices sunt Americani barbari, si remedia debito tempore adhibentur. Frustra tamen omnia, si venenum immissum sit ictu vehementiore a serpente valde irritato, ut dissectae sint venae quaedam maiores, cordi proximae, aut etiam vasa, quibus cum multis corporis partibus communicatio est. Tunc certa mors et intra minutum fere temporis expectanda. Id barbaro contigit, qui Anglis quibusdam peritiam suam sanandi haec vulnera comprobaturus, aliquot serpentis morsus pertulit, remediis suis, quae non edebat, statim restitutus; tandem caudae extremo serpentemprehendit, quo omnium maxime irritantur; tunc conuersus serpens brachium viri vulnerauit. Is vero remedia sua et hic adhibuit, sed frustra, paucis minutis exanimatus. Quae eius remedia fuerint, de hoc certi nihil constat: sed quoniam ex regione *Senega* oriundus erat, coniectare licet, eum usum fuisse *Polygala* seu herba, aduersus morsus serpentis crotalophori faciente, Senegenfi.

Alius casus, quo insanabile vulnus serpentis crotalophori creditur, est, cum feminae praegnantis infligitur. Barbari certe, uxoribus suis, quibus hoc fatum contigit, ne auxilium quidem afferunt. Hic vero serpens, hominibus et brutis omnis generis adeo infestus, porcos inimicos habet, qui auide ipsum quaeritant, adeo, ut culturam loco cuidam, serpentibus his habitato, adlaturus, grege porcorum saltem ad purgandum illum opus habeat. Prehensum serpentem ore quatiunt, deinde deuorant, caput tamen non attingunt. Morsus serpentis plerum-

que nihil ipsis nocet. Haec iam eduntur a Cl. K A L M I O, reliqua trimestri proximo seruantur.

p. 67. 7) *Terrae quosdam motus in Norrlandia Occidentali* (Vaester Norrland) 1752. *animaduersos*, describit NIC. GISLER. Tres potissimum recensentur, quibus communes obseruatae fuerunt leges quaedam notatu dignae, velut: viam quasi terrae motus constantem, et antea obseruatam a regione media inter austrum et occidentem (S. W.) ad mediam inter boream et orientem (N. O.) fuisse. Superficie terrestris partem, milliarium Suecicorum quadratorum circiter quadraginta eodem fere tempore fuisse succussam; impetum vero aequè vehementem fuisse in insulis profundo mari circumdatis, ac in continente. Tremitus terrae comites semper habuisse sonitus vehementes in aere editos, splendorem quoque coelum, lunae ad modum illustrantem, et iuxta directionem tremitus terrestris protensum. Quae omnia cum aliis multis eo conspirant, ut terrae motus multum similitudinis habere cum fulmine coelesti cuincant; utriusque vero originem ex vi electrica, tandem in maiori luce collocatum iri Noster sperat. Ceterum annos illos inde ab 1739 ad 1744, qui steriles regionibus borealibus fuerunt, vacuos fere fuisse tonitribus, obseruatum est, insequentes autem tum terrae motus frequentes, tum fulgura frequentia habuisse; haec scilicet ita grata esse ob annorum, quibus contingunt, fertilitatem colonis borealibus ait Noster, ut propius versus austrum habitantibus timentur.

p. 74. 8) *Modum, quo lucius piscis genus propagat*, describit Cl. ABRAHAM ARILLANDER, Inspector cocturae nitri. Vnicus est in regione, quam Noster incolit, *Sauolax* ei nomen est, lucius piscis, qui quo modo genus propaget, obseruari potest; reliqui vel gregatim ei rei operam dant, vel profundius  
aquae



aquae immerguntur, ut distincte spectari non possint. Haec autem vidit: Sub finem aprilis et integro maio ad ripas fluminum profundiores, gramine aut falicibus lactas, negotium id lucius exsequitur. Sub initium veris minores ordiuntur; cum magis versus aestatem annus vergit, maiores adveniunt, idque septimanas plures durat; interdum tamen maxima pars operis sub glacie peragitur. Feminam ripae adpropinquantem mas sequitur, unicus si parua sit, maiorem mares plures comitantur. Mares autem plerumque feminis minores sunt, numquam certe maiores Noster vidit. Femina progreditur, donec in aquam parum profundam perueniat, ut tergum, caput quoque interdum et oculi emineant, sapienti procul dubio naturae consilio, quo ipsum corporis pondus ovis eiiciendis auxilietur. Mas a latere sequitur, simul cum femina subsistit, laterique eius se applicat, ut aperturae in abdomine piscium, (*genitalia* vocat Noster) proximae sibi sint; Ita se mutuo per aliquod tempus fricant lateribus, interdum inferiori corporis dimidio cedentes, ita tamen, ut semper accurate sibi mutuo applicent caudasque, iudicavit observator, capitibus magis propinquas. Sic ubi per aliquod tempus subsisterunt, femina subito corpus versus marem vertit, ut abdomen utriusque iuxta se inuicem positum sit, tuncque caudis aquam vehementer feriunt, sicque in aqua progrediuntur, paululum a se inuicem separati, congregiuntur vero rursus eundemque lusum saepius repetunt, decem aut duodecim vicibus pro piscis magnitudine. Referunt vero piscatores periti, non omnia ova uno eodemque tempore eiici, sed feminam saepius ad ripam redire, hocque opus repetere. Noster ipse id non vidit. Ex piscibus, qui hoc tempore capiuntur, ova et semen masculinum libere effluunt, ad magnam distantiam proficientia, si abdomen digito prematur. Si  
plures

plures mares eandem feminam comitantur, duo quidem utrumque eius latus obsident, reliqui ad eorum latera ponuntur, ut series quatuor aut quinque iuxta se positorum conspiciatur. Femina vero mox ad hoc latus, mox ad illud conuertitur, mares motus eius sequuntur, interdum caudam feminae subeunt, quod fabulae originem dedisse videtur, feminam marem sequi et sperma eius deglutire, quo ova fecundentur. Sed Noster ferro, quo pisces figuntur, saepius in ipso opere eos cepit, semper reperiens feminas esse, quae praecedunt, cum sexus ouorum aut spermatis profluxu facile et certo distinguatur.

p. 77. 9) *Effectus fulminis, in templum parochiae Alfsua in Gothlandia delapsi*, describuntur. Contigit id iulii decimo nono die, anni 1752, hora circiter undecima, ante meridiana, dum cultui diuino populus in templo operam daret. Nos ea saltem, quae hominibus acciderunt, percensebimus. Cum portam quandam templi fulmen tetigisset, qui proximi ei sederant, per octiduum dolorem pedum sentire; alius, remotior tamen paulo a porta, sensu omni priuatus concidit, elatus ex templo; is aliquot dies insignes pedum dolores sensit. Femina quaedam similiter sensatione orba concidit, septimanis quinque aut sex de doloribus multo vehementioribus conquesta, quam ante nominati, in exterioribus corporis laesio nulla apparuit. Pastor loci SALS MALMSTEN, e suggestu verba ad populum faciens, concidit. Capillamentum eius arsisse viderunt. Elatus, post tres horae quadrantes conscius sui rursus factus est. Crines tum capillamenti, tum proprii supra verticem, et ante occiput dextrum, combusti erant aut conglomerati; in dextra colli parte cutis ambusta et caro denudata usque ad axillam, a qua tres striae rubrae, duos digitos latae, progrediebantur, una super scapulam sinistram, altera in superiore brachii parte usque



vsque ad cubitum, tertia a superiore brachii articulo versus foueam subaxillarem. In medio superficiei exterioris femoris dextri stria nascebatur, producta super femur et genu usque ad tibiam, immo ad digitum maiorem pedis. Hae striae post aliquod tempus euanescebant, nulla cutis secessione facta. Crines e cute nati, in locis laesis partim combusti erant, partim conglomerati. Quatuor septimanas insomnes transegit, insignem dolorem in brachiis et pedibus sentiens, maxime et diutissime in brachio dextro et pede sinistro, ubi venae ipsi sectae sunt. In illis partibus, in quibus vestigia sui fulmen reliquerat, dolorem nullum sensit. In subselliis virorum plures calorem vehementem circa pedes senserunt. Cum detonuisset, plenum erat templum fumo et odore sulphureo, in primis circa suggestum, adeo, ut remotiores ab eo, discernere non possent, vacuusne esset, an a parocho occuparetur. Vir, qui auxilium parocho adlaturus, ad suggestum festinabat, retulit sellam suggestus adeo calidam fuisse, tantumque sulphuris odorem, ut fere respirationem sibi ademerit.

Trimestre secundum:

1) *Historiam eorum, quae de aurora boreali sci.* p. 81. mus, continuat Cl. VARGENTIN, exorsus eam trimestri tertio anni praecedentis. Iam in primis hypotheses recenset, quibus ad explicandum phaenomenon physici usi sunt. Cum vero incertum adhuc sit, ad quam distantiam a superficie telluris attollatur, ad parallaxin eius diligentius obseruandam hortatur curiosos, in primis Suecos.

2) *De irritabilibus corporis humani partibus agit* p. 93. Cl. ALB. DE HALLER. Sunt haec ea, quae latine habet Sectio II. dissertationis in Commentariis Societ. Reg. Scient. Gotting. Tom. II. citatae nobis trimestri primo, art. 2.

3) *Lanas*

p. 123. 3) *Lanas nigro, quod castoreum vocatur, tingere docet solis materiis, quas Suecia profert, adhibitis*, Cl. HARALDVS VRLANDER. Vtitur autem *arbuto*, quam vulgarem Sueciae plantam, ab Anglis sub nomine *Iackas Hapuck*, tabaci condimentum adhiberi, narravit Cl. LINNAEVS, in Comment. Acad. Scient. Suecicae ann. 1743. Trim. 4. art. 6. Modum procedendi distincte describit, et, quantum praestet methodo hucusque usitatae, nigrore castoreo lanas imbuendi, ostendit.

p. 126. 4) *De aberrationibus geometricis* disserit Cl. A. G. KAESTNER, qui error in distantiae quaesitae magnitudine definienda nascatur, ex errore paruo in angulo capiendi admissio, formula analytica docens, et alia eo pertinentia tradens.

p. 137. 5) Cl. IO. LINDHULT *diarium aegrorum vi electrica sanatorum continuat*. Sunt autem mala, quae vel omnino sustulit vel leuauit vis electrica; surditas etiam a natiuitate; dolores in artubus et musculis; paralyfis; febris; membra contracta; membra frigore perusta; sermonis usus tantum non ademptus; epilepsia. Casus omnes recensere longum esset, et parum ad scopum nostrum conducens, plerumque enim morbi non ita, ut medicus postulare posset, sed ut aegri forte retulerunt, narrantur, modus vero, quo electricitas adplicata est, numquam docetur, generatim electricitate aegros usos esse narratur, tempore, per quod hoc continuauerunt, obiter indicato. Pauca igitur saltem specimina seligemus.

Iuuenis inde a natiuitate surdus, hincque voces proferre nescius, aetatis trium et viginti annorum, ingenii ceteroquin viuidi, postquam electricitate uti decembris decimo quarto die anni 1752 coeperat, statim sonitus fortiores, currus v. g. per plateas vectos, aut clamorem vehementiorem in aurem eius directum,



directum, audiuit; usu electricitatis assidue continuato, ianuario anni sequentis canem exiguum post tergum latrantem audiuit; februario sonitum ex succussibus machinae electricae natum percepit; quae omnia signis indicavit; martio mense auditus in aure sinistra fere restitutus est, adeo, ut mox referre voces quasdam auditas inciperet: usuque electricitatis continuo id consequutus est, ut satis bene aure sinistra valeat; minus dextra. Nomen etiam et voces quasdam faciliores pronunciat non male, litteras item plures alphabeti. Auditam primo vocem dissyllabam referre studet, alia voce, plus vel minus auditae simili imitatur. Experimenta haec facta sunt post tergum eius, ne videre labiorum motum posset.

*Febris electricitate fugatae unicum captum est ex p. 143.* Experimentum, in hortulano; aetatis trium et triginta annorum, quartana per longum tempus, dimidium scilicet fere annum, vexato. Electricitate adhibita, primum ianuarii vicesimo octavo anni 1753, diebus, quibus a febre liber erat, meliorem appetitum ciborum consequutus est, noctes vero plures, immediate se sequentes, multum sudavit, morbi paroxysmus quilibet lenior factus est, et februarii quinto febris omnino cessit, ut sexto domum redierit.

*Inter contracta membra sanata exemplum est feminae p. 146.* nae, quae cultro articulum indicis medium ad eam profunditatem vulnerauerat, ut os per vulnus conspici posset. Vulneri quidem auxilium chirurgus attulit, sed digitus curvatus mansit, articulus vero motu destitutus. Hoc sesquiannum pertulit, electricitate vero unica vice adhibita extendere et flectere digitum aequè bene, ut reliquos, potuit.

*Vir annorum quadraginta, nouembri anni 1740 p. 147.* tantam frigoris vim in pedibus ambobus perpeffus fuerat, ut chirurgi amputationem sinistri consulerent. Felicius tamen sanatus, debilitatem perpetuam lateris sinistri sensit, inde a femore ad pedem usque

usque, ut iter pedestre paulo longius conficere difficulter posset, sed saepius ei esset quiescendum, etsi a frigore omni diligenter caueret. Anno 1743 in loco, aeri perspiranti nimium exposito, dormiens, difficilius audire coepit, et tinnitum aurium sensit, dolores etiam brachii sinistri et lateris sinistri, tempestatum mutationibus ingruentibus. Fontibus medicatis usu auditum recuperavit, et reliquorum malorum leuamina quaedam sensit. Electricitate uti incipiens ianuarii quarto die, id per aliquot dies continuauit, nulla mutatione animaduersa. Sed octauo eius mensis, incallescere pedes sensit et prurire plane, ut cum frigus illos ante duodecim annos percusserat. Maxime dolebat pes sinister, adeo etiam intumescens, ut per aliquot dies calceis uti nequiuert. Cessauerat tumor die undecimo, nihilque incommodi amplius in pedibus sentiebat; electricitatem adhibere desinit vicesimo primo, cum tinnitum auris sinistrae nullum amplius perciperet, latere etiam aegro plus virium haberet, dolorisque parte maxima esset liberatus.

p. 148. Infans annorum nouem, qui recte huc usque valuerat, variolis grauiter decumbens anno 1748, sed conualescens satis bene ab illis, multum taciturnior solito obseruatus est, numquam postulauit quidpiam, et pauca solum verba repetere ausus est. Tandem linguae usum ad sermonem omnem amisit, manente auditu, nam iussa perfecit, et suum nomen percepit, etsi submissius solito appellaretur. Simul obstructione capitis vexatus est, ut nec nares emungeret, nec per eas respiraret. Fontem medicum, *Norr-malms Brunn* appellatum, anno 1751 adhibuit, qui illam, de qua diximus, obstructionem leuauit, post ea infans paucula verba audita repetere didicit. Aestate 1752, eodem fonte rursus usus, nouembri mense electricas operationes perpessus est. Ante quam illis subiiceretur, paucissimas voces, infanti-



fantibus perquam familiares, et fere tantum monosyllabas pronunciare poterat, cum vero interdum electricitate uteretur, plures voces bene satis edere didicit.

Subiiciuntur phaenomena quaedam, quae prae-p. 150.  
ter expectationem inter experimenta electrica contigerunt. Vir, cui dentium dolores electricitate leuabantur, postridie tumore sub mento deformabatur; Forte ipse manum globo applicauit, ut alios electricos redderet, hoc cum per horam continuasset, tumor cessauit. Vir honestus, annorum quinquaginta quatuor, qui bene semper valuerat, in itineribus suis a Cl. BOERHAAVIO didicit, conspici-  
lis interdum utendum esse, ut oculi conferuentur. Sequi hoc consilium coepit, ante annos aliquot ultra viginti, nihilo minus visus eius adeo est debilitatus, ut proximos decem vel duodecim annos carere illis non potuerit: cum enim minutas litteras oculis nudis legere vellet aut scribere, fumum veluti oculis se obducere sensit, litteras autem euanescere; cum haec ad candelam fierent, doluere etiam oculi. Ianuario mense, nihil de mali sui remedio cogitans, manum globo electrico applicuit, iamque motum insolitum in corpore sentiens, alteram manum oculis admouit; Cum vesperi domum rediret, noua singula hebdomade prodeuntia ad candelam legere potens, nulla plane difficultate, post ea vero conspici-  
lis neque legens neque scribens indiguit. Alius vir, aetatis annorum quadraginta unius, operationibus electricis se subiecit ob dolorem axillarum, quem etiam illis depulit, simul quoque ab alio malo liberatus; quod, nullum contra illud auxilium sperans, ne quidem indicauerat. Erat id tumor induratus, in testiculo dextro, dolens cum tempestas mutaretur, a male curato testiculo venereo residuus.

1151. 6) *Machinam, palis data quavis obliquitate terrae infigendis idoneam* describit Cl. ELIANDER.

1155. 7) *Ex diario Academicae quaedam eduntur: ut* 1) Cl. RETZLI, prouinciae Sconienſis medici, obſeruata in cadauere militis, cereuiſia, vino, in primis ſpiritu frumenti immoderatus uſi; aetatem annorum quadraginta is attigerat et mane quadam in platea mortuus reperiēbatur. Pulmo dexter coſtis et ſpinae dorſi accreuerat, ſiniſter ſemi putrefactus erat, coloris praeternaturalis, vaſis omnibus ſanguine coagulato plenis. In ventriculo cordis dextro reperiēbatur polypus duos digitos longus, latus unum, pellucidus medullae calidae ad modum, membrana ſimplici tenui incluſus, cuius ſubſtantia interior pinguedini aut oleoſo cuidam ſimillima erat. Vicini illi erant tres alii, longi digitos quatuor, lati quartam digiti partem, quorum duo, ſuperius arteriarum ad modum, in ramos binos abibant, inferius figurae conicae, liberi undique, tunicae craſſiori incluſi, ſubſtantiae interioris carneae et fibroſae. Sani ventriculi pars inferior inflammata et ſemiputrefacta. In capite exterius laeſio nulla, detracta vero cute, in ſiniſtro latere reperiēbatur liuor, ſanguinem coagulatum indicans, ,paullulum ultra muſculum temporalem. Praeter ea nihil ſingularis in capite, exceptis duabus hydatidibus, pellucidis, aqua clara turgidis, in ſepto lucido, et aquae copia ſatis inſigni in ventriculis cerebri, cum medulla oblongata moueretur. Macilentus homo fuerat, abdomen tamen et thoracem pinguedine, digitos duos craſſa, obductos habebat, qua caro tegebatur. Coſtae verae et ſpuriae pinguedine plenae, pericardium cum membranis pingue, minus tamen meſenterio. Ex ſterno et cartilaginibus fere offeſis iudicari potuiſſet, hominem annos quinquaginta attigſſe.

2) Cl.



2) Cl. HOLTIVSENIUS, centurio, *modum* p. 157  
tradit *feces cerevisiae, peracta eius coctione, usui futuro servandi*. Summa methodi huc redit, ut feces lin-  
teo puro inclusae, cineribus immittantur, qui humi-  
dum omne ex illis extrahant, et in massam confi-  
sistentem illas mutant.

3) Solana tuberosa, (Potatoes) ex feminibus, p. 158.  
quae in Suecia maturuerant, propagata egregie suc-  
cessisse observavit Cl. KYLANDER, pastor nosocomii  
Linciopongiensis. Idem refert, id, cuius flores albi  
sunt, albas habere etiam radices, rubris minores,  
ceterum interiore colore et sapore, reliquis nihil dif-  
similes.

4) Vermiculos, frumenti in primis secalis gra. p. 159.  
nula excauantes, pelli, si tabulata loci, in quo fru-  
mentum servatur, solutione vitrioli obducantur, do-  
cet Cl. RISBERG, pastor Asumi in Scania.

### Trimestre tertium:

1) *Phaenomena aestus marini breuiter et generatim* p. 161.  
recenset Secretarius Cl. VARGENTIN.

2) Cl. HELLANT, quo modo aestus marinus se p. 170.  
habeat in regionibus quibusdam, intra circulum po-  
larem arcticum sitis, scilicet prope *Vordhus* insulam  
et promontorium boreum (*Nordcap*), propriis ex ob-  
servationibus enarrat.

3) *Relationem de serpente crotalophoro finit* p. 185.  
TRVS KALM, hic in primis agens *de remediis contra*  
*morsum eius*. Facilius occiditur hic serpens alio quo-  
vis; virgula super dorsum caesus fere perit; praeter  
ea tardissime mouetur. Horae spatio post quam cae-  
sus est, aut citius etiam, vitae signa omnia perie-  
runt, licet nec caput laesum sit, nec locus quidam  
laesionis notari possit. Sonitu, quem edit, se ipsum

prodit, sicque facile occiditur, iam etiam a barbaris  
 Americae indigenis, qui ante Europaeorum aduen-  
 tum superstitiose illi parcebant. Editur a quibusdam  
 tum medicamenti loco, tum ab aliis ob carnis et  
 pinguedinis saporem illis probatum. Cauent, qui  
 illo vesci volunt, ne se ipsum mordeat, quod valde  
 irritatum facere aiunt, aequè cito ita perientes, ut  
 aliud quoduis animal morfu eius periisset, tuncque  
 non sine vitae periculo comedendum. Ex pinguedi-  
 ne oleum paratur hoc modo: Occiditur, cautione  
 adhibita, ne se ipsum mordeat; pinguedo exempta  
 in orbe soli exponitur, ut liquecat et in oleum abeat,  
 vase vitreo seruandum. Huic incomparabiles vires  
 adscribuntur, aduersus dolores varios, in primis a  
 violentis tendinosarum partium extensionibus indu-  
 ctos, locum adfectum, in quo dolor sentitur, oleo  
 hoc ungendo. Quibus manus tremebant, cor et  
 iecur serpentis crudum et calidum adhuc comede-  
 runt, a tremore liberati; aliis tamen remedium hoc  
 nihil profuit, sed additur, tremorem hic ab ebriosita-  
 te natum. Balteos ex cute serpentis cum crotalis  
 barbari gerunt, Europaeorum quidam his gestis con-  
 tra varios morbos praeseruari se credunt, et simili  
 superstitione alias serpentis partes appendent. Ce-  
 terum vaginae gladiorum cute hac obducuntur.

Plantas, quarum vires contra morsum serpentis  
 praedicant, has nominat.

p. 183. *Collinsonia* LINN. Spec. plant. Tom. I. pag. 28.  
 Huius decocto barbarus sanatus est, cui frustra re-  
 media reliqua omnia adhibebantur: lingua adeo  
 intumuerat, ut in ore contineri non posset.

*Sanicula flosculis masculis pedunculatis, hermaphro-  
 ditis sessilibus* LINN. Spec. plant. T. I. p. 235. Ra-  
 dix contusa loco laeso, cultro ante leuiter vulnerato  
 imposita, extrahere venenum dicitur.

*Actaea racemo ovato fructibusque baccatis.* LINN.  
 Spec. pl. T. I. p. 504. *Aconitum baccis niueis* COR-

N V T.



NV T. Canad. p. 76. Hanc vel serpentes ipsi extimescere aiunt, ut qui manu plantam teneat, tuto eum prehendere possit; quod, qui retulerunt Nostro, propria experientia dixerunt se didicisse.

*Sanguinaria* LINN. Spec. plant. T. I. p. 505. Masticatur radix et loco laeso imponitur.

*Ranunculus hirsutus*, foliis ternatis multifidis, calyce reflexo, fructu oblongo. In locis umbrosis et humidis, in sylvis Americae crescit. Radix masticata vel comminuta vulneri imponitur, cultri ope paullulum refricato, ita venenum extrahitur.

*Thymus foliis ovatis, acuminatis, serratis, corymbis lateralibus terminatricibusque pedunculatis.* GRONOV. Fl. Virgin. p. 64. Succus, ex foliis expressus, in lacte aut alio vehiculo bibitur.

*Polygala caule simplici erecto, foliis ovato-lanceolatis, alternis, integerrimis, racemo terminatrice erecto.* GRONOV. Fl. Virgin. p. 80. Potissimum in regione Senega reperitur. De ea vid. LINNAEI dissertatio: *Radix Senega*.

*Serratula foliis linearibus sparsis.* Radix laudatur.

*Solidago paniculato corymbosa, racemis reflexis, floribus confertis adscendentibus, foliis trineruiis subserrato scabris.* LINN. Hort. Vpsal. p. 259. Varietas eius foliis glabris, *Rattle Snake herb*, *herba serpentis crotalophori* appellata, in primis laudatur. Barbari vario modo illa utuntur; masticatam in os aegri expunt, inter lapides binos contusam deglutiendam praebent aut decoctum eius, eodemque vulnus obligant, semper tamen eius quidpiam deglutendum est.

*Aristolochia caulibus infirmis angulosis flexuosis, foliis cordato-oblongis planis, floribus recurvis solitariis.* GRONOV. Fl. Virgin. p. 112. Decoctum bibitur, ut diximus trimestris primi articulo quinto.

*Fagus foliis lanceolatis acuminata serratis* LINN. H. Vpsal. p. 287. *Castanea satiua* C. B. Sur-

culorum castaneae decocto vulnus obligatur, idem bibitur.

Iam ad alia remedia pergit. Celebratur autem *pinguedo omnis*, oleum oliuarum, adeps porcinus, butyrum; vulneri statim imposita et intra corpus adsumta. Serpentem, qui laesit, occidere statim, et pinguedine eius uti suadet Cl. COLDEN. De oleo serpentis ante diximus. *Sal culinare* in ore madefactum et comminutum, deinde vulneri impositum prodest. Quidam locum laesum antea cultro vulnérant. *Theriacam* aliqui laudarunt. Interdum profuit foucae in terra factae indere partem laesam et humum circa eam accumulare: Venenum extrahi sic credunt. *Tabacus* et *pulvis pyrius* masticata et commixta vulneri imponuntur, simul salua tabaco feta deglutitur. Fuit, qui venenum *ex filii vulnere exsugeret*, cautionibus notis adhibitis, sicque nullo sui damno. Alius Nostro retulit vulneri filii laesi imposuisse se partem posteriorem gallinae plane denuadatam, paullo post mortuae, ita quinque gallinas periisse veneno, in eas ex vulnere transmigrante, sextam et ultimam saltem paululum aegrotasse, filium vero fuisse seruatum.

p. 195. 4) *Coregoni piscaturam in fluuiis Norrlandicis* describit Cl. GISLER. Suecis *Sik* appellatur piscis, qui est ARTEDI *species* 37 et 40. Varietates eius Noster describit: Fluuios adscendit, ouorum deponendorum causa, aduersum nitentibus flumine et vento gaudens. Generis propagandi haec ratio est: Mas morfu et suctione feminae adhaeret, sub operculo branchiae; deinde abdomen oscillatione velut ludentes sibi alternatim applicant, hocque opus continuant, donec sperma et ouula effluerint. Si minor masculus feminam maiorem adsecutus sit, illi post branchiam prope pinnam pectoralem adhaeret. Sed reliqua, quae ad capturam et salituram piscis pertinent,



minent, oeconomica magis sunt, et ad regiones illas, ubi hoc negotio occupantur, spectantia, quam ut hic longi de illis esse debeamus.

5) *Mercurii*, maii sexto die 1753 *sub sole trans-* p. 210.  
*euntis* observationes, Holmiae habitas, edit Cl. VARGENTIN, nubibus quidem interruptas, ut exitum planetae observare non potuerit, quas tamen ingeniose ad mercurii theoriam emendandam adhibet.

6) *Quid sit materia illa, porcellanae parandae a* p. 220.  
*Sinenfibus adhiberi solita, Petuntse dicta*, inquit Cl. SCHEFFER. Cl. SAVARY in dictionario rei mercatoriae gallico narrat quidem Sinenfibus ad porcellanam lapidem quendam *Petuntse* adhiberi, sed eius characteres pullos exhibet. Nostro materies quaedam, velut ex Sina adlata, obuenit, splendens, semipellucida, lamellosa, glaciei mariae ad modum, coloris viridis diluti, ad griseum vergentis, ponderosa, ut, qui illam Cl. SCHEFFERO tradebat, metallo, in primis stanno, fetam existimauerit. Nihil tamen metalli continebat, ferro excepto, neque mineris stanni notis similis erat, lapidi Bononiensi similior: Non efferuescebat cum acidis, neque ab iis soluebatur, in igne in particulas minutas dissiliebat et ustione colorem album consequabatur, sed calce rubra ferri permixtum, cuius color *Colcothari* aut *croco martis* erat simillimus. Cum phlogisto usta odorem sulphureum edebat gypsi ad modum. Ferri quantitas, quam continebat, circiter quinquagesima ponderis erat. Ex Cl. MARGGRAFII experimentis statim collegit Noster, ob ferrum admixtum phosphoro inutilem fore. Tamen, tum veritatem adfertorum Cl. MARGGRAFII examinaturus, tum inuestigaturus, cui usui lapis hic ex Sina adlatus sit, MARGGRAFII modo eum tractavit, nihil vero phosphorescentis reperit, ruber color evanuit et mas-

fa alba, satis compacta, cohaerens et semipellucida  
eualit. Hoc occasionem dedit suspicioni, materiam  
hanc forte a Sinensibus porcellanae adhiberi. Igitur  
comminutam argillae, ex qua tubuli tabaco sugendo  
parantur, apyrae, commiscuit obtinuitque post ustio-  
nem quidpiam porcellanae plane simile, nisi quod  
minus album erat, ob argillam, quae fortiter usta  
albedinem non seruat: fistulae enim minore ignis vi  
parantur. Pertinet autem haec materies ad P O T-  
T I I *marmor metallicum*; nam post ustionem aliquo  
modo efferuescit cum acidis, satisque vero simile  
erit ex adductis nomen *Petuntse* illi conuenire.

p. 224. 7) Cl. EKSTROEM *machinas* describit, quibus  
*bonitas fructuum cerealium a gravitate specifica illorum  
plenius possit examinari.* Obseruat enim de frumen-  
torum bonitate iudicari non posse, nisi simul graui-  
tas illorum specifica, ad aquam relata, item inuolu-  
crorum, nucleo ipsi comparata cognoscatur. Expe-  
rimentis vero obiter institutis reperit, secalis pon-  
dus specificum ad aquam esse circiter in ratione 4:3,  
nuclei vero pondus ad inuolucrum in ratione 2:1.  
Hinc aliqua non contemnenda oeconomica sequun-  
tur. Quodsi enim data mensura secalis ponderis sui  
libram dimidiam ob humidum, quod imbibit, amisit,  
non saltem dimidia libra deterior est, sed libris dua-  
bus. Eadem enim mensura iam aquae sesquilibram  
continet, quae mensuram simul implet ponderisque  
partem efficit. Similiter si sumatur vera ratio pon-  
deris inuolucris ad nucleum ut 2:1, id exinde effici-  
tur, si data mensura secalis sicci, sed nuclei minus  
densi, libra una deficiat a pondere mensurae aequa-  
lis, secalis aequae sicci, sed nuclei ditioris, ut illo  
mensura non una tantum libra deterior sit altera, sed  
libram unam praeter ea, inuolucrorum plus habere,  
quibus panis saporis deterioris minusque nutrens  
efficitur.

8) *Ex*



8) *Ex diario academiae* haec referuntur: 1) RE-p. 241.

SINA Sueciae Academiae monstrari iussit sericum a bombycibus, manu eius, cum aestatem *Drottninghol-mii* ageret, curatis et mororum Suecicorum foliis nutritis. Centum bombyces unciam semis serici dedere, bonitate nihil ulli extraneorum cedentis.

2) *Piscibus sapor putridus* ex aqua, in qua commorati sunt, natus, adimi docetur, si sal iniiciatur, aquae et pisces in ea rudicula probe agitentur, opere hoc bis vel ter repetito. Inde colligere licet saporem hunc putridum cuti saltem piscium inhaerere, dum viuunt, sed coctione in carnem penetrare. Nam *Cyprinus* LINN. Faun. Suecic. p. 322, nobis *Karau-sche*, saporem hunc in lingua sua seruat, quae rudicula tangi nequit.

3) Opilio quidam, experimento proprio comprobatum Academiae edidit, oues aliaque animalia, stercore lupi aqua diluto commaculata, tuta a lupis esse, qui ea fugiant. Maculae vero hae firmiter pellibus adhaerent, ut sub initium veris, cum primo in campum educuntur pecora, notari illa hoc modo sufficiat.

Trimestre quartum:

1) *Philosophorum sententias de causis aestus marini* p. 245. recenset Cl. VARGENTIN.

2) Cll. HIORTERI et STROEMERI *observationes meteorologicas Upsalienses* 1750, in compendium missas edit Cl. FERNER.

3) *Gasterosteum* LINN. Faun. Suecic. 276. 277. p. 261. Suecis *Skott Spigg*, capere et ex eo oleum, usibus oeconomicis, quibus alias oleum adhibetur, excoquere docet ZACH. WESTBECK. Magna adest copia piscium horum, quos nec alii pisces, nec aues adgrediun-

grediuntur, aculeis illorum territi. Oleum ex iis obtinetur, si aqua adfusa coquantur, optimum ex viuis. Residuum post oleum excoctum agris sterco-  
randis egregie seruit. Suadet praeter ea Auctor, ut  
similiter tentetur, an oleum coqui possit ex extis  
*clupeae* LINN. Faun. Suec. 315. quae alias vel plane  
abiiciuntur, vel porcis escae loco dantur.

p. 266. 4) *Situm geographicum urbis Abo* ex propriis ob-  
seruationibus determinat Cl. GADOLIN, eclipsibus  
circum iouialium usus. Latitudinem statuit gradu-  
um 60 minut. 27. Longitudinis differentiam ab *Vp-  
salia* gradus 4. minut. 30.

p. 272. 5) *Sepes piscibus capiendis struere* docet IO. BRAV-  
NER.

p. 278. 6) *Papilionem populi tremulae (Espen)* describit  
CAROL. CLERK. Equidem de eo egerunt Cl. ROE-  
SEL. App. I. p. 204. Tab. 33. fig. 1. 2. et Cl. VDD-  
MAN in diss. sub Cl. LECHII praesidio habita Aboae,  
*de nouis quibusdam insectorum speciebus*; p. 27. n. 54.  
tab. 2. fig. 15. sed Cl. CLERK in primis metamorpho-  
ses accurate obseruauit.

p. 281, 7) *Mori in Gallia quo modo colantur*, docet Ex-  
cell. Baro, CAROL. FRID. SCHEFFER, Regni Con-  
siliarius. Naetus est descriptionem hanc in Gallia ab  
experto quodam mororum cultore, e *Prouincia Gal-  
liae (Provence)* aduocato, ut Normannos et Insula-  
nos artem suam doceret.

p. 287. 8) *Assessor, litteris C. G. B. saltem indicatus*,  
*equis auenae loco praebere suadet panes*, ex secalis et  
auenae faragine aequis partibus commixtis paratos,  
ostendens multo minoribus impensis id fieri, alias  
etiam ob causas prodesse. Auenae crudae multum  
ab



ab equis iuutiliter consumi, grana integra docent, quae egerunt. Vel hinc igitur patet prodesse, ut comminuta praebeantur.

9) *Observationes de Sterna rectricibus maximis nigris* LINN. Faun. Suec. 129. edit NIC. GISSLER. p. 291.

10) *Eclipsin solarem oct. 26. anni 1753* obseruavit NIC. GISSLER. p. 293.

11) *Experimenta quaedam, ad acidum salis communis pertinentia* edit CL. G. BRANDT. Discedit ab iis, qui expulsionem acidi salis deberi aiunt acido vitrioli, utpote fortiori, in terris bolaribus et aliis materiis, quae ad hanc operationem adhibentur, reperiundo. Dato enim pauxillum acidi vitriolici, quod percipi alias nequeat, in his materiis reperiri, ab eo tamen tantus effectus proficisci nequit; deinde vitra, ignem vehementem absque fusione tolerantia, et materies vitri, eodem modo sali addita, spiritum similiter educunt, cum tamen nihil vitriolici contineant. Quo plus eiusmodi materiarum difficulter liquefcentium additur, eo magis fusio salis impeditur, ut destillatio spiritus salis fiat, a fusione salis impedita. Sed hic inulto plus ignis opus, quam acidum vitrioli adhibendo.

Paratur etiam acidum salis nulla alia re addita, praeterquam illo salis lixiuio, quod crystallisatione peracta superest, neque in salem abit. Flauescens color, quo plerumque gaudet spiritus salis, rectificatione ipsi adimitur, adeoque est a peregrino quopiam admixto. A ferro non esse ita reperit Noster. Libras plurimas spiritus salis Lunaeburgici, argilla alba gallica admixta parati, flauescentis, deinde filtrati, ad olei consistentiam destillauit, pauxillum qualibet vice retortae paruae infundendo, et residuo post destillationem nouum semper adfundendo. Ita  
oleum

oleum falis rubrum obtinuit, quod frigori exposi-  
tum, pellicula obductum est, et sal pulcrum rubro  
colore deposuit. A ferro autem nihil coloris rubini,  
quantum huc usque constat, proficiscitur, neque  
nouit Noster ferrum calcinatum, in acido falis solu-  
tum, in crystallos falis coagulari. Ex spiritu falis  
Hispanici, addita argilla eadem gallica, etiam spiritum  
luteolum obtinuit, quo similiter tractato, neque  
oleum falis rubrum, neque sal crystallinum rubrum  
obtinuit, sed massam quandam humidam, quae ad  
consistentiam falis reduci nullo modo poterat. Re-  
tortae concentrationi spiritus falis adhibendae sunt;  
nam, quod propter consistentiam sic appellatur ole-  
um falis, aequae ac oleum vitrioli, lutum penetrat,  
quo capitella cucurbitis iunguntur, et per earum su-  
perficiem exterioriorem defluit. Destillato acido a sale,  
addita argilla, tandem sal ammoniacum obtinetur,  
partim collo retortae adhaerens, partim in recipiens  
vas decidens, a quo spiritus filtratione purgandus est.  
Non vero est hoc sal ammoniacum ab urinoso quo-  
piam falis communis, sed ab alcali volatili, in argilla  
reperiundo, et cum acido falis in sal ammoniacum  
coeunte. Talcum etiam acido destillando commo-  
de adhibetur ob difficillimam suam in igne fusionem;  
praeter ea cum non efferuescat cum acidis, nihil eo-  
rum mutat vel absorbet, habet tamen pinguedinis  
quidpiam, unde luteus fit spiritus falis; minimis ve-  
ro impensis, minimoque labore spiritus falis oleo vi-  
trioli adhibito paratur, eo etiam commodo, quod  
tunc vasa vitrea adhiberi possint, spiritum nec absor-  
bentia, nec transmittentia.

In igne acidum falis omnium maxime volatile  
est ut, sole radios in filtrum eo madidum mittente,  
conclauae frigidum etiam, nebula alba ab eo replea-  
tur. Ex aere humidum attrahit; aqua sali superin-  
fusa et ad siccitatem destillata, magna eius pars simul  
educi potest. Ex terra pinguedinem attrahit magis,  
quam



quam acida alia omnia, unde spiritus falis antea clarus, flauus fit; cum materiis calcariis efferuescit. Calces metallorum et semimetallorum soluit; phlogiston flamma coerulea falis igniti prodit, similem flammam et fortiozem adhuc solutiones mercurii sublimati et cupri in hoc menstruo exhibent, non vero solutiones argenti et plumbi. Aurum purum ab acido falis non soluitur, bene tamen in terrae speciem redactum; unde soluuntur ab eo aurum fulminans et aurum solo alcali fixo praecipitatum, reducitur tamen aurum destillatione menstrui.

Auri puri partem unam, partibus undecim stanni puri, fusione commiscuit, calcinauit, ita, ut particulae metallicaee nullae in calce apparerent, calcis pondus, incrementum  $14\frac{3}{4}$  *pro cent* nactum esse reperit, alio tempore una parte auri viginti partibus stanni mixta, calcis pondus  $17\frac{1}{2}$  in singula centena auctum est, auri scilicet pondus erat *assum* (as) 40, stanni 200, calcis 988. His calcibus superfudit spiritum falis clarum, qui inde flauescibat, postquam paululum incaluisse; a stanni puri vero solutione colorem non mutat. Cum vero non omnis calx soluta esset, destillauit menstruum ad siccitatem in retorta, et alium clarum spiritum falis residuo superfudit, destillatione repetita, quod cum quinta vice fieret, (omnia autem igne non vehementi fiebant), liquorem crocei coloris in retorta reperit; acidum falis vero auri et stanni soluisse aliquid et secum duxisse tentaminibus docimasticis didicit. Similiter, auro cum bismutho calcinato superinfusus spiritus falis et destillatus aliquid metalli secum duxit. Argentum in acido falis non soluitur, ad volatilitatem tamen disponitur, quod luna cornea ostendit. Stannum difficulter soluitur, facilius calx stanni, stannum ipsum vero libenter iungitur acido falis concentrato, quod mercurius sublimatus continet, aequae, ac argento, eiusque ope destillationibus mediantibus volatile fit. Cuprum

prum difficulter ab acido falis soluitur, facile vero calx veneris, flammam coeruleam deinde edens, quam cum non edat cuprum nitri aut vitrioli spiritu solutum, nouum id indicium est phlogisti acido falis contenti. Cuprum cum auro fusione commixtum, et si cupri quantitas 12, 13 et pluribus vicibus maior sit, granulatum et mercurio sublimato mixtum, ignis ope non accurate miscetur, sed aurum metallica forma ad fundum decedit, cuprum in massam rubram, quem colorem habet, etiam nullo auro addito, coit. Plumbi parum ab acido soluitur, siue metallica forma adsit, siue calcinatum, calx tamen plumbi aut vitrum, eo adfuso, falis ad modum albescit, et ad ignitionem incalescens maximam partem in fumum abit. Quod inseruit auro, ab exiguo plumbi admisto depurando. Calx vero plumbi aeque ac argenti acido mercurii sublimati unitur, et in plumbum corneum abit, a quo mercurius viuus destillatione separatur. Ferrum soluitur a spiritu falis, clarescente, dum solutio peragitur, si antea flauus magis fuerit, sed flauescente rursus solutione, in loco frigido posita. Ferrum combustum acido falis rubrum colorem conciliat, si solutio saturata sit et adhuc calida, flauescentem, cum refriguit. Gallae in solutione ferri, hoc acido facta, nihil mutant, etiam maxime saturata. Mercurius cum acido hoc in sal illud siccum, mercurii sublimatis nomine notum, coit. Obseruat Noster, errare illos, qui mercurium sublimatum in aqua regis solui negant. Bismuthum ab hoc acido difficulter soluitur, nisi calcinatum. Haec iam edit Auctor, reliqua proxime daturus.

p. 312. 12) *De calore aquae in regionibus borealibus* agit Cl. ANDREAS HELLANT. Cum constet, puteos profundiores et non nimis amplos, calorem toto anno parum mutare, ex his obseruationibus rectius de



de regionis cuiusdam temperie iudicari potest, quam ex calore aeris, adeo variabili. Reperit vero Noster, ut exemplum adducamus, puteos *Tornenses* in Laponia non profundiores sexpedis 4. Suecicis, calidos hieme ad gradum 1 aut  $1\frac{1}{2}$  thermometri Reaumuriani, supra punctum congelationis, septembri vero, quo mense aqua plerumque calidissima fuit ad 3 vel  $3\frac{1}{2}$ . In profundissimis et optime clausis puteis numquam infra gradus 2, numquam supra 4 constitit. Ex similibus observationibus infert calores medios Parisiis, Holmiae, Torneae et ad promontorium boreale (*Nordcap*) esse graduum 13,  $7\frac{1}{2}$ , 3,  $2\frac{1}{4}$ , thermometri Celsiusiani, cuius limites cum Reaumuriani limitibus iidem sunt, quatuor vero gradus Reaumuriani respondent quinque Celsiusianis, quoniam spatium intra punctum congelationis et aquae ebullientis REAUMURIUS diuidit in partes 80, CL. CELSIUS vero in 100. Similiter Noster oceani calorem examinavit, quem ceteris paribus, in aqua minus profunda, maiorem reperit; siue ad terram magis naus accedat, siue refluxu maris, in dato loco profunditas minor fiat.

13) *Ex diario Academiae* quaedam eduntur. Cl. p. 320.  
DALMANNVS foeniculi semina matura in Suecia obtineri docet radicibus plantae per hiemem in arena sicca seruatis. Cl. LIDBECKIO Lundini Suecorum egregie successerunt conatus plantas educandi tum Americae borealis, quarum semina Cl. KALMIVS attulerat, tum officinales varias et ad rem tinctoriam pertinentes. Cl. BOSIVS Vitebergae Professor, Academiae membrum, de contextu illo vegetabili post inundationes anni 1752 in locis, Vnstrutae adiacentibus, Academiae quaedam scripsit.



II

Memoires de Physique pure, sans Mathematiques, de toutes les Academies des Sciences, rassemblés en un seul corps et rangés selon l'ordre de leur publication. Tome premier pour les Années 1665. 1666. 1667. à Lausanne, chez Antoine Chapuis 1754. 4. mai. alph. 1. pl. 10. tab. aen. 25.

i. e.

Commentarii, Physicam puram illustrantes absque Mathematicis, ex actis Academiarum omnium scientiarum in unum collecti opus, et ad temporis, quo prodierunt, dispositi ordinem. Tomus I. annos 1665. 1666. 1667 complectens.

**G**enevae eruditam conuenisse societatem, quae editos huc usque omnium fere, scientiis amplificandis dicatarum, academiarum commentarios, uno comprehensos opere constituerit edere, inter alia noua physico-medica retulimus \*, neque exiguam inde a plerisque eruditorum expectari posse iudicauimus utilitatem. Cuius igitur operis primus quum breui post prodierit in publicum tomus, optimaque inde perlegentibus perspecta instituti ratio spem nostram non modo expleuerit, verum etiam fere superauerit, nostris iam decet inferere accuratiorem eius recensio- nem commentariis, praemissis, quae institutum ipsum spectant, paucissimis. Quamuis enim de eodem non nulla citato loco exposuimus, supersunt tamen adhuc, quae, quum in praefamine hunc in finem addiderint Cll. Editores, huc referri omnino merentur.

Scopum

\* vid. Comment. nostr. Vol. III. Part. II. p. 354. seq.



Scopum nimirum totius huius operis primo loco quod attinet, eum potissimum ipsi Cll. Editores profitentur habuisse sibi praefixum, ut quae in tot tam vastisque, quae iam ediderit quaeque Academia, commentariorum voluminibus occurrit, rerum pertractatarum varietatem remouerent atque miscelam, facto scriptorum ex ordine scientiarum, quas quaeque illustrant, delectu: quo quidem euenit, ut eruditi quisque suae, quam prae ceteris excolit, scientiae capita, optimis obseruationibus et experimentis illustrata, uno quasi intuitu perlustrare possit atque recolere, missis, quae alias spectant disciplinas, commentariis. Quasnam in primis scientias sibi proposuerint Nostri illustrare hoc opere, ex data alio tempore relatione lectoribus iam cognitum erit atque perspectum, in primo hocce tomo ad physicam generalem ipsos monemus respexisse solam, sequentibus reliquas ex facto ordine pertractaturos disciplinas. Fontes autem, unde hauriant ipsi suas, quas colligunt in unum opus, commentationes, ipsa quidem statim indicat operis inscriptio, atque nunc etiam intelleximus in primis ex Transactionibus Societatis Londinensis philosophicis, ex commentariis Academiae Parisinae, ex Actis Academiae Florentinae, quae del Cimento appellatur, primi tomi desumptas fuisse dissertationes; appendicem vero cuilibet tomo se addituros esse pollicentur Cll. Editores, atque eidem ex optimis nostri aevi Italorum Germanorumque diariis notatu digniores inserturos obseruationes et experimenta. Ordinem, quem in colligendis his scriptis obseruarunt, tempus exhibuit, quo nimirum singula in publicum fuerunt edita, facto ab academiarum fundatione ad nostra usque tempora progressu, ita tamen, ut etiam, si argumenti id postulet similitudo, ex recentioribus iungantur illis superioris saeculi. Porro delectum rerum quod attinet atque reliquam dissertationum harum dispositionem, ex scientiarum, quas illustrant,

differentia nunc similis argumenti dissertationes sibi iunxerunt, nunc alias diuersi argumenti separarunt inuicem, mancas autem et inutiles visas, nec non fusiores praefationes aliaque, ad argumenti tractationem non pertinentia, prorsus praetermiserunt, alias iam melius cognitae emendarunt, suasque interferuerunt animaduersiones, ubique tamen, si quid omiserint vel correxerint, fideliter ipsi professi fuerunt. Tandem lingua equidem gallica aeque ac latina se uti velle promiserant Cll. Collectores, suafu tamen amicorum metuque ducti, ut, si latinam eligerent, minor subscribentium foret numerus, gallicam inuiti praetulerunt. Haec adeo essent, quae moneri adhuc poterant de instituti huius ratione atque ordine superest, ut ipsius primi tomi exhibeatur recensio, verum quum illud et insignis scriptorum varietas ac copia, et nostri instituti vetent leges, pauca tantum speciminis loco iuuabit inde delibare breuissimis.

p. 3.

No. I. *Observationes et experimenta cum rore mariali facta a Cl. THOM. HENSHAW*, stabuli praefecto, desumpta ex Philos. Transact. ann. 1665. exhibentur. Roris huius aliqua copia, in vasis clausis, calori vaporum et balnei maris per duos menses exposita, nihil mutata fuit, clara adhuc et dulcis. Simili ratione soli per aestatem expositam roris quantitatem reperit Cl. Auctor immutatam, praeter materiem viridem in superficie natantem, mucori similem. Ligneo beneque tecto vasi immissa roris copia; umbroso loco per mensem relicta, post putrida valde inuenta fuit, sedimento nigro, limi instar, deposito. Atque ita oriri illud obseruatum fuit, ut primum in superficie roris enata pellicula splendens, glutinosa, fundum peteret, pluresque eam sequerentur. Materia haec vitro immissa, per noctem maximam partem auolauit, relicta tenaciori, pellucida, albidiori materia.



materia. Clauso vasi haec iniecta, in balneo maris, multum per vapores amisit, exsiccata prorsus, fungo tamen in vitro formato. In alio vase, cui infuderat roris copiam, millepedes inuenit; in alio vero pelliculam similem nactus viridem, eam bene tecto immisit vitro, sed aliquot dies post innumeras vidit in vitro muscas paruas. In camera clausa ad fenestram soli meridiano exposuit putridi visci roris copiam, multaque aliquot septimanas post obseruauit insecta minima. Ex putrido rore per euaporationem ficcato, terram obtinuit griseum, quae lota et cum rore denuo mixta, post euaporationem terram foliatam friabilem dedit. Terra haec igne fixa mansit, lapidi porphyrio subiecta, aquae adfusae ruffum tribuit colorem; saepius calcinata tandem exhibuit sal albidum, subtile, lentis ope sali petrae simile visum. Cui tractationi deinde subiungunt Cll. Editores monitum, vehementer optantes, ut haec quis repetat experimenta, noua addat microscopiis in primis armatus melioribus, quibus tum adhuc caruit Cl HENSHAW; factasque ita obseruationes cum ipsis communicet, ut accuratior inde de roris natura, origine et usu erudito orbi offerri queat expositio. Cui voto nostrum quoque addimus, illud monentes, aliquam de rore melleo iam exhibitam in Promptuarii Hamburgensis Vol. XIII. nos etiam indicasse alio tempore commutationem \*.

Haec sufficiant in praesens adduxisse, plura in posterum ex sequenti, quod medicinam nobis cariorum pertractabit, volumine adlaturi, unicum adhuc addimus, appendicem complecti tres dissertationes, quarum prima effectus speculi caustici metallici exponit, ex Promptuarii Hamburgensis Vol. V. P. III. n. 5. pag. 269. depromta; altera obseruationes physicas circa petrificationum originem; et tertia denique epistolam de dente argenteo cerui exhibent, utraque

C 2

vero

\* Comment. nostr. Vol. IV. Pars III. p. 474.

vero auctorem habet Cl. HOPPE, Geranum, atque  
extant in Deliciis physicis, Berolini editis, quarum  
ipsi dedimus alio loco expositionem\*.

In fine additus est copiosus rerum index, tabu-  
laeque aeneae ad illustrandas accuratius, quae expo-  
nuntur, res, suis archetypis exacte respondentes.

### III.

Recueil de Memoires, ou Collection de Pièces  
Academiques, concernant la Médecine,  
l'Anatomie et la Chirurgie, la Chymie, la  
Physique expérimentale, la Botanique et  
l'Histoire Naturelle, tirées des meilleures  
sources, et mis en ordre par feu M. I.  
BERRYAT, Conseiller Médecin ordinaire du  
Roi, Intendant de ses Eaux minérales, Cor-  
respondant de l'Academie Royale des Scien-  
ces de Paris et Membre de la Société des  
Sciences et Belles Lettres d'Auxerre. Tome  
I et II. à Dijon chez Franc. Desventer; à  
Auxerre chez Franç. Fournier, 1754 4.  
mai. Tom. I. alph. 4. pl. 14. tab. aen. 6.  
Tom. II. alph. 4. pl. 11. tab. aen. 15.

i. c.

Collectio dissertationum academicarum, medi-  
cinam, anatomen, chirurgiam, chymiam,  
physicam experimentalem, botanicam, hi-  
storiamque naturalem spectantium, ex opti-  
mis haustarum fontibus, et in ordinem re-  
dactarum a Cl. B. I. BERRYAT. Tomus I.  
et II.

**D**ispersas nimium in tot tamque vastis aëtorum,  
quae florentissimae in Europa scientiarum aca-  
demiae

• l. c. Part. II. p. 298.



demiae hoc saeculo publicarunt, voluminibus observationes et experimenta physico-medica simili modo similesque in usus, ac praecedentis collectionis Lausaniensis Editores, in unum opus complexus est ill. BERRYAT, quod vero post eius fata demum edere in publicum coeperunt nominati in inscriptione bibliopolae. Hinc, quae fusius de hoc ipso exponamus, non habemus. Iisdem enim, atque prioris, ex fontibus, ex celeberrimarum nimirum academiarum commentariis haustum fuit illud atque collectum, additis vero etiam ex aliis eruditis diariis parvaequae molis scriptis, quae saepe cito evanescunt, observationibus notatu dignioribus. Scientiae quoque ferme eadem, veluti docet inscriptio, hoc opere illustrantur. In binis, quos iam ediderunt, tomis prioribus monemus tantum nos inuenisse translatas ex actis, quae ab origine sui ad annum 1709 publicavit Academia Regia Scientiarum Parisina, commentationes, unicam vero ex diario illo, quod vocant *Journal des Scavans*, interfertam, annis et fontibus, unde desumtae sint, ubique in margine indicatis.



IV.

Traité d'Osteologie. Par M. BERTIN, Docteur Régent de la Faculté de Médecine en l'Univerſité de Paris, de l'Academie Royale des Sciences, ci-devant premier Medecin du Prince des Valaquies et de Moldavie, ancien Professeur de Chirurgie, et premier Médecin d'une des Armées du Roi. à Paris, chez Vincent 1754. 12. Tom. I. 15½ pl. tab. aen. 1. Tom. II. 1 alph. tab. aen. 1. Tom. III. 22½ pl. tab. aen. 1. Tom. IV. 17 pl. tab. aen. 1.

i. c.

Tractatus de Osteologia. Auctore Cl. BERTIN.

**A**mpla admodum corporis humani ossium pertractatio, a Cl. Auctore, cuius merita in uniuersam anatomen nemo nescit, sollicitè proposita, omnibus quidem commendanda est: siquidem in generali aequè ac speciali eius expositione, in quas duas partes suam distinxit osteologiam, studii exquisitioris dederit luculenta documenta: nostro tamen fini accommodatum visum est, data generali totius operis delineatione, quaedam tantum hic adducere, quae singularia sunt, quum in doctrinae uniuersae cuiuscunque explicatione non possint non communia etiam simul referri.

Quatuor quidem tomis totum constat opus, ex quibus tamen primum tantum generali ossium contemplationi destinatum est. Naturae conueniens ossium coagmentatio, quae sceleton sistit, varias admittit diuisiones, quae *primo capite* disquiruntur, sigillatim vero considerata ossa tum longitudine, tum figura differunt: hinc varie denominantur, et corpus atque extremitates offerunt perspiciendas, quae epiphyes atque apophyses sistunt. Eorum compositio  
cauita-



cauitates efficit, et ipsa per articulationes cohaerent, quarum varia constituuntur genera, et ad ligamentorum, cartilaginum, glandularumque articularium considerationem ducunt. His absolutis Cl. Auctor medullam ossium indagat et ad illam accedentia vasa, porro periostrum, nec non vasa, quae mediante hoc ossibus traduntur, quo facto ultimo tandem loco substantia ipsa ossium eorumque elementa explicantur in capitibus octodecim.

In sequentibus deinde tomis specialis ossium pertractatio proponitur. *Secundus* de capite agit fusc quidem, sed exacte, singulorum scilicet ossium momenta declarantur. Occasione descriptionis dentium primae et secundae dentitionis phaenomena dilucidantur, atque utilitates recensentur, quae per ossium capitis compositionem praestantur. Fiunt nempe, praeter eminentias et apophyses, tum interne, tum externe conspicuas, fossae itidem aliae extus, aliae intus detegendae, in quibus vel organorum, vel vasorum aliarumque partium sedes est, quae singulae studiose indicantur. Scissurarum, orificiorum, canalium futurarumque usus post haec depinguntur, sinuum splenoidalium, ossium supernumerariorum, epiphysium ossium cranii historia suppeditatur: et post contemplationem configurationis singularis ossium, quae caput constituunt, non vanam, sed utilissimam hanc disquisitionem esse docetur, facta scilicet applicatione ad praxin. Proponuntur haec in capitibus quadraginta et tribus.

*Tertio* tomo, eadem seruata norma, spina vertebrarum, pectoris pelvisque ossa atque illa extremitatis superioris explicantur, singulorum etiam additis utilitatibus, nec non variis in praxi medico-chirurgica necessariis, conscriptis, quae cuncta capitibus septuaginta recensentur.

*Quarto* tandem tomo, quicquid ex ossibus superest, adnadmueris etiam eorum specialibus aegritudinibus,

dinibus, adducitur, omnisque inferioris extremitatis compages declaratur. Ossis praeter ea hyoidis hic occurrit descriptio, nec non cartilaginum laryngis, narium, auris, interarticularium, palpebrarum et quae extremitatibus ossium superinducuntur, expositio. Huc deinde relata est historia ossiculorum auris, et generalis aliqua epiphysium historia. Quae cuncta capita quinquaginta quinque complent.

Ipsi operi praemissa praefatio amplam institutionis et pertractatarum partium recensitionem continet, additis simul rationibus, quae methodum descriptionis datae defendunt. Sic enim multis probatur argumentis, quare in ossis cuiuscunque expositione tendinum adhaesiones fuerint notatae studiosissime, et similia.

T. I. Sed ad ipsum opus progredimur, ex quo non  
 p. 114. nulla notamus. Articulationis cum veteribus duo genera constituit Cl. Auctor, *diarthrodiam*, quae cum motu est, et *synarthrodiam*, quae sine illo esse deprehenditur. Diarthroscos tres dantur species, *enarthrosis* nempe, quae liberrima est et respondentem capiti cavitatem requirit, ut in articulatione scapulae et humeri, *ginglymus*, et *arthrodia*, in qua posteriori ossa iuncta supra se leuiter tantum mouentur, ut in carpi ossibus, vertebrarumque compositione. In synarthrosi pariter tria sunt genera *sutura*, *harmonia*, *gomphosis*, concrefcentia inter se ossa symphyssi iunguntur. Vtriusque generis articulatio mixta quaedam habet, quae in corporibus vertebrarum et primae costae cum sterno est. Ex cartilaginibus illae,  
 p. 163. quae interarticulares sunt, ligamentosam naturam obtinent, et distinctas in iis fibras se perspexisse asserit Cl. Auctor, nec non primarum spuriarum costarum cartilagines haud raro inter se confluisse vnicamque constituisse obseruauit idem. Cartilago primae et secundae, huius etiam et tertiae costae non  
 p. 176. nunquam articulo inter se committuntur. Praeter glandu-



glandulas articulares, ab HAVERSIO dictas, aliae  
 occurrunt, *externae* Nostro dictae, quae molles sunt,  
 in pinguedine sepultae, rubicundo tamen colore,  
 spongiosoque suo habitu distinguuntur, quorum li-  
 quorem ligamentorum fibris secedentibus sese infi-  
 nuare coniicit Cl. Auctor. Aliae porro in vicinis  
 articulorum locis occurrunt, vagae et externam tan-  
 tum ligamentorum tendinumque superficiem hume-  
 ctantes, prout v. c. circa trochanterem maiorem.  
 Non semper tamen manifestae sunt et capsae tendi-  
 num iis destitutae inveniuntur. Summa autem est  
 copiosi huius succi secreti ad motum continuandum  
 necessitas, quare ad articulos vasa etiam plura abeunt,  
 vel per ligamentorum fibras vel per singularia orifi-  
 cia, ex quibus eam ob rationem succus articularis  
 elabi nequit, quod membranoso contextu et tenerri-  
 mis pelliculis eadem clauduntur. Harum existentia p. 185.  
 comprobatur motu facto ossis, v. c. femoris, in ar-  
 ticulo, tunc minora tubercula sistunt, vel dissecto  
 etiam ligamento et flatu immisso apparent. Quae  
 internas porro sedes occupat, in primis cauorum  
 ossium, medulla partim ex cellulari opere ossium  
 huc destillat, partim ex ipsis inuoluentibus medul-  
 lam membranis secernitur. Has autem membranas p. 195.  
 non solum, ut quidam putant, esse organum, ex eius  
 in quibusdam locis defectu manifestum est. Vbicum-  
 que autem illa praesens est, ibi simul perioستي interni  
 fungitur officio, quale in uniuersum in ossibus non  
 esse multis comprobare annititur Noster. Tertia p. 203.  
 quoque datur medullae species, quae lamellas ossis  
 intercedit, et per ossa perpetuo transsudat, ex qua  
 tamen sine omni fundamento concluditur, esse me-  
 dullam succum ossium nutritium, siquidem illa qua-  
 litatibus succi nutritii destituatur. Inseruit illa potius p. 212.  
 fibrarum flexilitati, forte terrestres iungit, quibus  
 ossa constant, particulas, quod exinde probabile vi-  
 detur Cl. Auctori, quoniam, si igne expellitur oleum

ex ossibus, illa vitri instar fragilia redduntur, cohaesionemque recuperant, si oleo iterum immerguntur. Neruosa tamen filamenta, quae cylindri medullae longorum ossium membranam adeunt, quum ipsa ossa non sentiant, sedes doloris habenda sunt, quem non nulli interno perioestio, quod negare Cl. Aucto-

p. 219. rem diximus, tribuunt. Confirmat vero, se primum esse, qui eius perioestii absentiam stabiliuerit, quum ipsi Cl. NESBITT cogitata non innotuerint. Mediante perioestio externa vasa ad interiora ossium pergunt, quum ipsum hoc perioestium quibusdam productionibus ad interiora pergat, et fibras vasculosas;

p. 232. tendinosas ligamentosasque habeat, immo probare annititur Noster, ipsum perioestium externum eiusque interna strata in os permutari, hancque suam sententiam contra Cl. SPIGELIUM defendit. Ea vero est conditio considerata, non nulla ex ossibus membranaceo ex statu in osseum transire, alia cartilaginea

p. 268. antea videri. Ossa enim longa ab initio cylindrum sistunt gelatinosum, qui deinde cartilagineus redditur. Vix in cartilaginem vertitur ille, tunc in medio iam loco principium ossificationis comparet, quod sensim ad extremitates continuatur. Qua propter autem in medio primum, deinde in extremitatibus os generetur, a vasis dependere dicitur, quae medio in loco maiora sunt, quorum actione cartilaginea portio induratur atque mutatur. In reliquis locis vasa admodum parua sunt, paullo capaciora in extremitatibus, hinc post mediae partis ossificationem, deinde in his accessus et formatio ossea faciliior fit. In longis etiam ossibus eorumque media parte orificia maiora apparent, quae vasa admittunt, iis autem aliquantum ampliora sunt. Haec, dum ossa indurantur, quod fit, dum introeuntia vasa magis sensilia euadunt, coarctantur, nec non simul ossificationis signa adesse deprehenduntur. Vasorum interim ingens fere copia in ossa absumitur: arteriosa triplicis sunt



sunt generis. *Vnum* subtilissimum est, ex perioestio p. 278.  
 ortum per insensibiles fere poros ossa subeuns, in  
 foetu tantum obuium, *alterum* in cauitatem ossium in-  
 feritur, per foramina ad extremitates ossium depre-  
 hendenda, quod in cellulas distribuitur et secretioni  
 medullae simul praest, *tertium* in mediam partem  
 immittitur, in primis longorum ossium; hoc oblique  
 procedit, sed variata directione, in femore v. c. et  
 humero ab inferioribus sursum, in tibia a superiori-  
 bus deorsum fertur. Ad interiora quoque penetrat,  
 multisque ramificationibus ludit. Eadem via et sub- p. 287,  
 ordinatio venarum est, de tertio tantum genere no-  
 tat Cl. Auctor, easdem cum arteriis non iungi, sed  
 separatim distribui, licet per eadem, ac illae, orifi-  
 cia ingrediantur. Nec cartilagines destituuntur vasis,  
 quo plus enim a statu osseo absunt, eo copiosiora  
 continent. De termino subtiliorum vasorum in ossi- p. 293.  
 bus, qui ob duram et impenetrabilem eorum sub-  
 stantiam obscurus est, detegendo sollicitus Noster,  
 disquisiuit rhachiticorum ossa, eaque libera esse et in  
 cellulis fluctuare inuenit, quibusdam solum ex his ad  
 ossa adhaerentibus. In uniuersum ossium substantia p. 306.  
 triplex esseprehenditur, alia admodum dura et  
 densa est, quae a Cl. Auctore dicitur *compacta*, alia,  
 quae a praecedente interius secedit, ex lamellis osseis,  
 tenerrimis constat, quae vario sese modo decussant;  
 relinquunt autem areas variae formae, sed quo ma-  
 gis ad mediam ossis partem accedunt, eo pauciores  
 illae fiunt et constituunt substantiam *cellularem*: his  
 tandem lamellis intersunt filamenta ossea innumera,  
 sine ordine disposita, quae substantiam effingunt  
*reticularem*. Huius substantiae contemplatio ducit  
 Cl. Auctorem ad considerationem geneseos ossium  
 uberiolem, in qua declaranda argumenta conquirat  
 omnia, quibus, cartilagines atque membranas permu-  
 tari in ossa, possit euinci. Ossa in primis lata exp. 319.  
 membranis varie conformatis nasci asserit, quarum  
 non

non nullae prius indolem cartilagineam assumunt, aliae non. Obseruari hanc mutationem declarat, dum germen incipit osseum enasci, quo nomine prima puncta ossea conspicua denotat. Hoc, quocunque loco in lato osse sit constitutum, radios spargit, qui ad centrum densius positi sensim secedunt, intermediam vero eorum distantiam serius nati noui radii

p. 321. occupant, ex prioribus quasi dimissi. Est autem primum illud osseum punctum lactis instar candidum, sensim cum duritie increcente hunc colorem amittit. Ex his fundamentis ossium omnis exoritur substantia, compacta ex squamis constat, gelatinoso oleosoque succo iunctis, igne in gelatinam resoluendis, ex perioostio, membrana vel cartilagine enascentibus. Ha-

p. 325. rum praesentiam status naturalis atque morbosus declarat, earum vero situs talis esse videtur, ut ad eandem lineam quaecunque series posita sit, et fibram longitudinalem constituat. Etenim has monstrant fissurae ossium, eorundemque facta diffractio, ex iis formantur strata diuersa ossium, et ex his tandem substantia, quam Noster compactam vocat. Dum fibrae a se secedunt cellularem, ex diuersa etiam fibrarum inclinatione tandem reticularem substantiam constituunt, quae conformationis ratio exemplo femoris ossis illustratur. Addit ad finem Cl. Auctor varias quaestiones de utilitate diuersarum partium in ossibus, quas scite resoluit, v. c. apophysium, epiphysiumque utilitates exponens. Sed iam ad alia transeamus.

T. II. In descriptione ossium capitis, frontis os rarius in  
p. 6. adulto diuisum reperiri obseruat, quamuis nos non infrequenter continuatam per mediam partem futuram viderimus. Circa foramen tamen coecum, cui  
p. 10. scissura vel canalis adstat, inuenit Noster foramen,  
p. 16. stilo immisso in fossam nasalem patulum. Si loco foraminis supraorbitalis os tantum, ad neruos et va-  
sa or-



sa orbitae transmittendos, scissum est, ad margines  
 scissurae transuersim affixum ligamentum constituitur,  
 quod neruum aequae ac arteriam protegit atque a  
 compressione defendit. Occasione sulci, qui sinum **p. 45.**  
 durae matris lateralem dextrum, in osse occipitis  
 suscipit, et qui vix non semper solet sinistro maior  
 esse, monet Noster, inde posse intelligi, quaenam  
 sit ad deplendum cerebrum, in sectione iugularis ve-  
 nae dextrae utilitas, et quare ad euacuanda vasa ex-  
 teriora eligi potius debeat vena iugularis sinistra. In  
 ossis occipitis formatione inter inferiores potissimum **p. 58.**  
 partes et laterales et mediam, quae cum sphenoido  
 osse iungitur, coaceruantur granula ossea, quae con-  
 tinentur duplici strato tenore substantiae compactae,  
 licet inter se illa ab initio iuncta non sint. Os tem-  
 porum in tres partes distinguit, squamosam nempe,  
 petrosam et mastoideam. In petrosa parte et fora-  
 mine quidem acustico praeter minora, quae mollem  
 nerui acustici portionem recipiunt, foramina atque  
 praeter canalis illius, quem portio dura ingreditur,  
 orificium, reliquis maius aliquod foramen primo ab **p. 66.**  
 Nostro animaduertitur, quod ramum duri nerui ali-  
 quem ad canales semi circulares transmittit, quem  
 ad interiora auris pertinere nemo hucusque concessit.  
 Substantia porro, quae est inter externam laminam **p. 71.**  
 compactam ossis petrosi atque cochleam et canales  
 semicirculares, ex minoribus aggregatis, sabuli in-  
 star, osseis fit moleculis. In basi ossis petrosi, eo **p. 87.**  
 quidem loco, ex quo in infante sensim enascitur pro-  
 cessus mastoideus, stratum substantiae partim cartila-  
 gineae partim ligamentosae inueniri docuerunt No-  
 strum laminae separatae, quibus cartilaginis quidquam  
 inerat. Sinus etiam sphenoidales non in cognomine **p. 101.**  
 tantum osse constitui, sed cochleis, extremitatibus  
 summis ossium palatinorum adhaerentibus, augeri,  
 primus auditoribus suis demonstravit. Porro a late- **p. 113.**  
 re extremitatis anterioris laminae cribrosae ossis  
 ethmoi-

- ethmoidei utrinque fissuram obseruauit, longam va-  
**p. 117.** riisque foraminibus pertusam. Nec non ossium tur-  
 binatorum varietates varias reperit, praeter enim  
 minima, a Cl. MORGAGNO descripta, quae vel in-  
 tegra, vel diuisa erant, alia his insidentia non nun-  
**p. 124.** quam occurrerunt. Deinde per fissuram laminae  
 cribrosae, iam dictam, duas arterias et totidem ner-  
 uos intrare cranium, atque ad duram matrem proce-  
 dere serpentino modo vidit, quarum itinera nondum  
 fuerunt cognita, in tractatu de arteriis, quem edere  
**p. 138.** constituerat Cl. Auctor, fusius describenda. In an-  
 teriore ossis unguium parte occurrunt saepe varia fo-  
 ramina, de quibus tamen Noster dubitat, num natu-  
 ralia cuncta sint, nec raro vidit os unguis plane de-  
 fuisse, cuius defectum os planum supplebat, vel pro-  
**p. 178.** ductio apophyseos superioris ossis maxillaris. In osse  
 maxillari superiore ob duritiem eiusdem neruorum  
 atque arteriarum, ad dentes accedentium, viae ob-  
 scuriores sunt et difficulter cognoscuntur, eas tamen  
 feliciter inuestigauit Cl. Auctor in subiectis rhachiticis,  
 in quibus ossa mollescent, et ex canali infraorbitario  
 duos aut tres ramulos ad dentes protendi, eorumque  
 radicibus etiam, incisorum nempe et caninorum, in-  
**p. 215.** feri inuenit. Rarioris est obseruationis ossa maxillaria  
 superiora cum osse sphenoideo iungi, aliquod tamen  
 exemplum habuit Cl. Auctor, in quo coniunctio ad  
**p. 242.** apicem fissurae orbitariae inferioris facta est. Den-  
 tium marmorea substantia ad coronam alias tantum  
 pertinere putatur, eam tamen Noster ad radicem  
 continuari usque credit, per gradus autem debilio-  
 rem eandem reddi, et in uniuersum omnia, quae ad  
 genesis dentium, dentitionemque pertinent, momen-  
 ta accurate et studiosè describit, quorum omnium  
 rationem reddere hic impedimur. Hac etiam occa-  
 sione funesta saepe vel doloris plena symptomata,  
**p. 282.** quae primae dentitioni accedunt, considerat simul  
 pensitatis, quae opponi solent iisdem, remediis, in-  
 ter



ter quae, quum a truncis neruorum male affectis pleraque efficiantur symptomata, incisio gingiuarum malum quidem paulum leuat, meliorem tamen futuram esse iudicat resectionem gingivae ab uno fine ad alterum factam. In enumeratione foraminum et p. 362. scissurarum, per quas nerui ex cranio abeunt, mentionem etiam fieri obseruamus sinus cuiusdam, de quo tamen num constans sit dicendus, dubius est Cl. Auctor. Deprehenditur nimirum in minori ossis sphenoidei ala, quam processum acutum nominant, ad posteriorem eius apophysin deuenit, intus cellulis osseis distinguitur, a latere orbitae minori orificio aperitur, in quod arteriae opticae ramus intrat, a latere vero, quae cranium respicit, pluribus minoribus foraminibus pertunditur. Varia deinde subtilia p. 369. quidem, notatu tamen digna et utilitatis plena momenta continet expositio utilitatum, quas praestant decem paria foraminum baseos cranii, quorum quidem declarationem uberiores utique lectoribus maxime commendare debemus. Sic per laminam cribrosam ossis ethmoidei praeter neruum olfactorium, filamenta a quinti paris primo ramo ex orbita per foramen orbitarium internum anterieusque redeuntia describit, quae in duram matrem distribuuntur; intrant per laminae cribrosae lateralem fissuram, et per eius foraminula quaedam ramis exeunt ad nares seseque in membranam pituitariam immergunt. Vocari hos posse putat Noster accessorios anteriores vel recurrentes. Eodem modo arteriae etiam plures per hanc laminam deferuntur, quarum singularum descriptio accuratissima additur. Nec eorum praetermittitur orificiorum descriptio, per quae nihil transit, quo pertinet, praeter foramen *coecum*, quod certe p. 381. non semper apertum esse inuenitur, maiora illa foramina, in sceletio conspicua, ad extremitates apophysium petrosarum, inter eas et sphenoideum atque basilare os constituta, quae in recentibus ossibus substantia

stantia cartilaginofo - ligamentosa replentur, per quae nullius vasis transitus detegitur, ut iure possint foramina dici, per quae nihil transit. Aegre tamen abstinemus a recensione reliquorum foraminum, canaliculorum et scissurarum, tum extus, tum intus in cranio occurrentium, quarum cognitio varie medicum, aliorum sanitatis curam habentem, instruere posset; sed, ne nimis diffusi videamur, ex iis quaedam speciminis quoque loco proponemus. Postquam horum nimirum orificiorum originem et situm descripsit, utilitatem, quam praestant, uberius declarat Cl. Auctor, vasorum transeuntium ramos, quae singularem, qua pollebat, angiologiae peritiam produnt, p. 410. exponit. Vsum v. c. foraminis orbitarii interni et anterioris sic explicat, ut neruum et arteriam in fossam ethmoidalem per illud transmitti doceat: neruus scilicet ramus est primi rami paris quinti, arteria vero ramus arteriae ophthalmicae. Quandoque sola arteria per illud foramen exit, et tunc neruus, qui per posterius foramen transit, solito crassior est, quandoque contrarium accidit, ut neruus solus per anterius, p. 14. arteria sola per posterius foramen transeat. Eodem studio Noster deprehendit, per fissuram spheno maxillarem, quae arteriarum transitui pateat, in orbitam aequae distribuendarum, ac in duram matrem transmittendarum, nullam ferri, ut inde in curandis oculorum duraeque matris morbis argumentum p. 417. desumi nequeat. Per canales zygomaticos nervosos vidit tertii paris ramos egredi, et per foramen palatinum, saepissime clausum, non nunquam arteriae palatinae ramum. Mirabilem futurarum cranii structuram ex H V N A L T O \* ita repetiit, ut omnem eius commentationem suo insereret libro *corniculorum sphenoidalem* (cornets sphenoidaux) quoque fabricam et usum

\* vid. Memoir. d' Acad. Roy. de Scienc. à Paris 1730. pag. 777. ed. Amsterd.



usum, alibi expositum, \*) confirmavit. Ad ossium Wormianorum diuersos situs adnotamus, quaedam etiam a nobis obseruata fuisse in suturae sagittalis continuatione, quae per os frontis fiebat, aequè ac in ipsa parietalium atque frontis ossis coniunctione, quo loco *fontanella* in iuniori homine constituitur, quale p. 473. exemplum etiam occurrit Cl. Auctori, qui praeter ea ossa talia, intus tantum distinguenda, inuenit, nulla exteriori nota praesente. Formationem vero horum ossiculorum singularem macerando capita foetus et iuniorum hominum, inuenit Noster, fuisse nempe concreta materiae calcareae, membrana inuoluta, a dura matre et pericranio deducta; sensim p. 476. magis indurata, quaedam etiam euanescebant. Quae solitaria nascuntur, radiatis ex fibris concrescunt. De epiphysibus ossium cranii notat Noster, ossicula p. 488. auditus primo cartilaginea aut mucilaginosa esse, parum ossea, deinde ossea iam facta magnitudinis proportionem reliquis maiora deprehendi et cum iis adulti hominis accurate conuenire. Quum porro varia ossium cranii configuratio notatu digna sit, suturarum diuersitatem a cranii et ossium reciproco lentiore et auctiore incremento deducendam esse opinatur, idque variis exemplis corroborat, in primis ex hydrocephalo quodam, septimo aetatis anno demum defuncto, p. 498. qui ab anteriore parte naturalem situm et magnitudinem habebat tantum, reliquis omnibus extensis, ut inde pateat, in iuniore magis homine partes osseas facilius in varias formas posse compingi. Immo, haec ossium consideratio haud paucas offert in medicina facienda regulas, quarum aliquot ad finem huius tomi Cl. Auctor adducit.

Vertebrae, quarum compositione fulcimentum T. III. totius trunci stabilitur, in posteriore corporis facie p. 5. fissuras

\* Ibid. 1744. p. 412.

- fissuras duas ostendunt oblongas, septo osseo vel ligamentofo diuisas, in quas arteriae et venae duae ad vertebrarum substantiam dimittuntur: quandoque
- p. 36. duo tantum adsunt foramina. In ultimae, septimae nempe, vertebrae colli corpore inferius quandoque sed rarius, polita faciecula; recipiendo primae costae capiti accommodata, inuenitur. Subiungit deinde Cl. Auctor considerationi structurae vertebrarum varias regulas practicas, veram luxationem earum fieri
- p. 80. posse negans. Primae tamen et secundae vertebrarum colli luxationem mox subsequi mortem debere non concedit: siquidem inuenit primam vertebrae cum occipitis osse coalitam illudque ipsum os occipitis magno suo foramine orificio primae vertebrae non respondisse, neque condylos occipitis cum cauitatibus primae vertebrae cohaesisse. Prima etiam vertebra non rotatorium tantum circa secundam exercet motum, sed supra secundam in flexione et extensione capitis mouetur. Varias porro in rhachiticis factas, obseruationes recenset Noster, ex quibus compressam fuisse interiorem vertebrarum cauitatem elucescit, sine notabili in medullam spinalem et inde
- p. 131. expectandas functiones redundante noxa. Inter costas quandoque supernumerarias occurrere, rarum non est, si tamen undecim tantum adesse creduntur, duodecima saepe inter scalenos haeret musculos, quae minor est et ad sternum non defertur, sed membranacea potius expansione cum prima costa cohaeret. Plerumque ab apophysi transuersa penultimae colli vertebrae nascitur, nec non cum prima
- p. 134. vertebra coalescit. Osseas etiam partes costarum inter se confluendo concreescere obseruauit Noster, et H V N A L T V S foetus sceleton adseruabat, cuius quinque superiores costae inter se erant perfecte iunctae.
- p. 141. Supernumerarias autem costas ex singulari ossea conformatione fieri, neque in germine praexistere iudicat Cl. Auctor, cum lumborum tamen vertebra aliquam iunctam fuisse nunquam se reperisse scribit
- Inter



Inter morbos costarum, quas caries facile infestat, p. 154.  
 fractura illarum est, num vero ex eo, quod post earum fracturam, illaeso pulmone exorians emphysema signum exhibeat, ex quo possit de aere, pulmones inter et costas existente, concludi, alii iudicent. Sic etiam, ubi sterni momenta anatomica excussit omnia, p. 184.  
 ad eam devenit quaestionem, num illud moveri possit, variorum autem reliquit sententias, B. HAMB-  
 GERO adstipulatur, et ad motum sterni non nisi oculorum opus esse adiumento credit atque conside-  
 ratione costarum directionis, quae a vertebrae ita descendunt, ut earum cartilaginee nunquam ad extremitatum posteriorum altitudinem iterum adscendant. Num vero hae rationes omnibus satisfaciant dubitationibus, iam definire non audemus. Post accuratam porro pelvis ossei descriptionem, de ea quoque quaestione iudicat Cl. BERTIN, an ossa innomi- p. 247.  
 nata in gravidis et parturientibus diducantur? quam olim iamiam affirmando concesserat, et exemplo feminae, post partum laboriosum dissectae, secessionem horum ossium a se invicem omnino possibilem confirmat. In radii deinde descriptione ad tendinem p. 324.  
 bicipitis musculi respicit, qui capsula continetur, atque studiosiore opera, quomodo ille in supinatione et pronatione manus sese habeat, declarat. Supinationem moderatam statum radii naturalem esse assumit, in quo casu biceps supinatoris musculi officio fungitur, qui deinde demum, si supinatio fuerit completa, brachium flectit. Quoniam vero ad supinationis aequae ac pronationis actionem praestandam plerumque aliquas quoque cubiti partes esse putatur, cui opinioni se suffragari non posse Cl. Auctor ob varias p. 333.  
 rationes commovebatur, ex natura articulationis et peruestigatione eius sollicita tandem concludit, cubi- p. 344.  
 tum in his actionibus sese non movere, sed illum centrum esse immobile, circa quod radius per extremitatem suam inferiorem motum semicircularem de-  
 scribat,

scribat, hinc motum illum, quem nosmet ipsi in extremitate cubitus percipimus, supinando vel pronando manum, tantum esse apparentem. Subtiliter etiam ad finem huius tomi de mechanismo et utilitate variorum motuum, per extremitatem superiorem praestanda differit Noster.

- To.IV. Nec defunt in extremitatibus, quas vocant, inferioribus adhuc quaedam notanda: Sic in inferiori extremitate tibiae eiusque externo latere fossa occurrit polita deorsumque respiciens: in hac glandulam articulare semilunarem primo se inuenisse gloriatur Cl. Auctor, quae tamen a nostro olim, nunc Dresdae anatomen cum laude faciente, PITSCHELIO iam diu descripta et delineata fuit \*. Eam vero inter glandulas fibulae denuo descripsit Cl. BERTIN. In rotulae, quam os sesamoïdes articulationis genu vocat, Noster, media substantia humor unctuosus seruatur, quem a medullari quidem non distinctum esse vult, nisi quod prae reliquis ossibus, si exsudat, facilius in guttas coeat. Inter morbos horum ossium cariem esse nemo dubitat, eos autem recensens Cl. Auctor, memorat, se vidisse tibiam integram fere, carie destructam, eam vero substantia ossea effusa iterum, stupenda ratione restitutam. In ossium sesamoïdeorum descriptione, quae effectus susceptorum laborum esse autumat, in infantia nulla, in senepura, et in uniuersum in mare quoque plura ac in femina obseruari asserit, simulque rarius quidem, non tamen sine exemplo in iis, qui molliter et otiose vitam transigunt, ad senilem etiam aetatem transitum fieri iudicat, sine sesamoïdeorum ossium inuenienda praesentia.
- p. 58.
- p. 86.
- p. 104.
- p. 232.

Exposita autem omnium ossium historia, tandem de cartilaginibus, ossiculis auditus et epiphyphis

\* vid. EIVSD. diss. de axungia articulorum Lips. 1740. 4. §. 16. c. ic.



bus corporis humani additur explicatio. Cartilaginum quidem earum, quae ad laryngem, auriculamque pertinent, et inter articulos constituuntur, priorum praecipue mentio videbatur facienda esse, quod musculis aequae ac ossa, cui adhaereant, fixum praebent punctum. De cartilaginibus auricularum vero dum p. 307. loquitur Cl. Auctor, praeterire non possumus singularem aliquam eius opinionem, qua, data hac occasione, neruorum, in superficie harum cartilaginum distributorum, officium aliquod in eo ponit, ut auditui quoque inferuiant. Adducit nimirum iuuenis exemplum hominis, qui etiamsi abscessu in auribus facto officula auditus, membranam tympani, nec non osseam cochleam perdidisset, nihilo tamen secius satis distincte audiuerit. Quare portionis durae, in facie et supra auriculam distributae, ramos, quum aliquis eius ramulus in labyrinthum quoque penetret, id est, in eum locum, in quo portio mollis diuiditur, sonorum perceptiones facere posse autumat. Cartilagines autem omnes in osseam substantiam p. 315. haud conuertuntur, ex iis, quae rarius hanc mutationem subeunt, triangularis nasi cartilago est, quae in senibus saepe ossea facta deprehensa est. Sed quum vix non omnia corporis humani ossa epiphyfes habeant, eorum etiam recensitionem ultimo datam esse deprehendimus capite, in quo vertebrarum varias cartilagines declaraturus Cl. Auctor, de phaenomeno illo differit, quare post peractum somnum longiores videantur homines, ac ante eundem, illud autem ex natura trium cartilagineorum stratorum, p. 352. quae inter vertebrae deprehenduntur, explicat, quippe quae somni tempore a rore transudante et penetrante, compressione omni deficiente, distenduntur. Eandem fere causam in infantibus, febre acuta vel intermittentibus laborantibus, locum habere demonstrat Noster, nec non exemplis variis, quam utilis euadere possit omnium, quae in ossium consideratione

ne se offerunt, conditionum peruestigatio confirmat. Promittit etiam, se musculorum daturum esse explanationem, quae aequae ac arteriarum, cui se insudare indicauerat, utinam prodire posset, utilitate sua se certe commendatura.

V.

Essays and Observations, Physical and Litterary. Read before a Society in Edinburgh, and published by them. Volume I. Edinburgh: Printed by G. Hamilton and I. Balfour. MDCCCLIV. in 8vo majori. 466 pagin. absque praefatione et indice. Tab. aen. 8. \*.

i. c.

Tentamina et Obseruationes medici et litterarii argumenti, coram Societate Edimburgensi praelecta, ab eademque in lucem edita. Vol. I.

**D**iu iam expectauimus nouae huius societatis elaborationes. Prior enim societas in quinti ultimi-que voluminis medicorum Tentaminum et Obseruationum praefatione \*\* iam anno 1742 indicauerat, se

\* Prodiit iamiam Altenburgi germanica huius primi voluminis versio, cuius priores nouem articulos Cl. KAESTNERVS noster, reliquos vero omnes Zwickauiensium Physicus Cl. IOH. ERNEST. GREDING, Med. Licent. transtulit.

\*\* Satis cognita esse arbitramur utilissima illa, quae prior Edimburgi florens societas ab anno 1733 usque ad annum 1744. in quinque voluminibus edidit, medica Tentamina et obseruationes, quibus nec medicus nec chirurgus facile carere poterit. In gallicum sermonem illa vertit Cl. DEMOURS adiectis adnotationibus



se in aliam nouam societatem receptam esse, quae totum naturalis scientiae et medicinae ambitum disquirendum sibi proposuisset. Dispersio vero membrorum ob bellum, in Scotiae regno ante hos decem annos gestum, et irreparabilis iactura alterius dictae societatis secretarii Cl. quondam, MAC LAVRIN, in causa fuerunt, quod primum hocce volumen nunc demum lucem publicam adspicere potuit. Ex copioso enim nouiter detectarum Cl. huic viro mortis tempore communicatarum numero, societas post mortem eius non nisi paucas, distractis reliquis, recuperare potuit. Noua vero haec societas veritatem dissertationum hic impressarum et certitudinem observationum nec adserit, nec defensionem earundem, quam auctoribus prorsus relinquit, in se suscipiet. Dissertationes quoque sententiae alicuius iam impressae contrarias aequae ac illas, quae veritati alicuius confirmandae inseruiunt, lubente animo inferendas curabit. Exteri quoque dissertationes suas a scopo societatis non abludentes alterutri secretariorum aut Cl. ALEXANDRO MONRO Anatomiae Professori, aut Cl. DAVID HUME Facultatis, quam vocant, Aduocatorum, bibliothecario transmittere possunt.

Cum vero non omnes hic insertae dissertationes ad scopum nostrum pertineant, eas tantum, quae physico-medici argumenti sunt, paulo curatius, re-

D. 4

liquas

tionibus quibusdam Parisiis 1740, 42, 43, 47. Germanica quoque versio Altenburgi in totidem voluminibus ab anno 1749 ad annum 1755 prodiit, interprete Cl. KOENIGSDOERFFER, Med. D. quibus sextum volumen, Cl. DEMOVS adnotationes, variasque alias versiones continens, accessit. Nec incongruum erit hic loci simul enarrare, eorundem Tentaminum nouam prouenisse editionem Edimburgi anno 1752 sex voluminibus in forma, quam dicunt octauam minorem, totum illud opus comprehendentem, quam, a nobis nondum quidem visam, insigniter tamen multis in locis auctam esse legimus.

liquas autem, quoad titulum tantum, more nobis consueto, lectoribus nostris sumus indicaturi.

p. 1. 1) *De legibus motus* satis prolixè disseruit HENRICVS HOME, cui prolixiores adhuc

2) *Adnotationes de legibus motus et de inertia materiae* opposuit Cl. IOHANNES STEWART. Haud parum vero mirati sumus, societatem hisce binis dissertationibus imprimendi locum concessisse; nos certe temporis, quod his legendis impendimus, valde poenituit. Praeter id enim, quod ambae nihil noui et notatu digni contineant, prioris quoque auctor, Cl. HOME, diuersis corporum phaenomenis, p. 45. explicationis loco, nomina tantum, a phaenomenis desumpta, imposuit, et sic, licet id videri non velit, re ipsa tamen qualitates veterum scholasticorum occultas recoxit. Et posterior, scil. Cl. STEWART, p. 68. qui Cl. HOME fere ubique, sed itidem parum firmis argumentis, refellere conatur, eo tandem deuenit, ut cogitandi facultatem a materia haud alienam esse p. 109. arbitretur, et tam motus continuationem quamlibet, quam corporum grauitatem cogitanti cuidam enti atque intelligenti adscribat, et sic quasi cuilibet corpusculo spiritum quemdam familiarem praeponat. Nos igitur lectores his ulterius recensendis non morabimur.

p. 141. 3) PAPPI ALEXANDRINI *collectionum mathematicarum libri quarti propositio quarta generalior facta, cui propositiones aliquot eodem spectantes adiunguntur; auctore MATTHEO STEWART, in Acad. Edinenfi Matheos Professore.*

p. 173. 4) *De causa variationis obliquitatis Eclipticae*, Cl. COLIN MAC. LVRIN.

4) EIVSD.



5) EIVSD. *subitaneae et stupendae variationes in* p. 184.  
*superficie Iouis.*

6) *Obferuationes de tonitru et electricitate* Cl. p. 189.

EBENEZER MAC. FAIT. Cl. FRANKLINI experimentum, quo probatur, fulgur et ignem electricum unum idemque esse d. 15. Sept. 1753 in monte *Calton-hill* dicto repetiit. Binas adhibuit acuminatas virgas ferreas, tubis vitreis insertas, quarum altera  $\frac{1}{2}$  pollic. diametri et 11 pedes longa, altera tres pedes longa fuit. Licet vero frequens fulgur et copiosus ignis in aere adfuerit, in virgarum tamen extremitatibus ignis antea, quam pluuiæ quidpiam decideret aerque humidior fieret, non adparuit. Minor virga c. tubo casu fortuito exemta ignem nihilo minus aluit, id, quod in longiori virga itidem contigit. Ex hoc monte tandem in illum *Castle-hill* dictum transmigrans, urbis plateas transeundo, nullum obseruauit ignem; qui vero in longiori virga, quam primum, praetergressis domibus, montem attigisset, statim rursus adparuit. Minor virga, cuius tubum perdidit, nullum ostendit ignem, quem vero, dum longiorem virgam acuminata sua parte casu contingeret, illico concepit. Obtusa quoque breuioris virgae pars flammae longioris virgae admota ignem cepit, atque ambabus his extremitatibus contiguas, vel trium aut quatuor tantum pollicum spatio a se inuicem distantibus, flamma fortior adparuit, quam in singula seorsim, ulterius vero a se inuicem remotis flamma obtusae extremitatis euauit. Fulguris fulmine semel aut bis recta versus acuminatam virgae extremitatem tendente, ignis quidem cum fulgure sese expandendo unire, statim vero cessante fulgure iterum lucere videbatur. Et licet durante hoc experimento multum pluuiæ decideret, ignis tamen non prius exstinctus est, quam adeo plueret, ac si aqua ex plenis amphoris effunderetur, id, quod experimenti quoque

finem fecit. Varias dein subiungit adnotationes, v. c. malos turresque forsitan a tonitru praecaveri posse, si parti eorum summae ligni frustum planum rotundum pedis circiter vel maioris diametri horizontaliter imponeretur: Hac enim ratione impediri, quominus flammæ illis insideant atque illuc accumulentur. Auroram quoque borealem et fulgur eiusdem materiei esse, et comparatione instituta admodum probabile fieri, tempestates, electricitatem, vim magneticam et auroram borealem mirifice inter se connexa esse.

p. 197. 7) EIVSD. *Phaenomena quaedam nebulosa tempestate observanda.* Nebulosa tempestate durante frigore, quando sol ad certam altitudinem perucnerat, frequenter arcum in nebula albi coloris observavit; altitudo arcus angulum solis supra horizontem elevationi aequalem atque semicirculum formare ipsi videbatur. Sic quoque montem ipsi hac tempestate adscendenti atque supra nebulam emergenti tota subiacens regio magno quasi diluvio inundata visa est. In eiusmodi quoque vel simili tempestatis statu iridem circa hominis istuc ambulantis umbram in nebula observari posse, qualem duplici colorum serie gaudentem d. 23 Octobr. 1753 iterum observavit Cl. Auctor.

p. 200. 8) *Mensurae Scoticae cum Anglicis comparatae a*  
IACOBO GRAY.

p. 205. 9) *Dissertatio de sexu plantarum* Auctore Cl. CAROLO ALSTON, Med. D. Regio Botanico in Scotia. An pulvis antherarum sit pars ad foecundationem necessaria, an excrementitia, eos, qui in structuram florum et sexum plantarum inde declarandum inquisierunt, dubios reliquit. Noster itaque hanc rem ulteriori disquisitione dignam iudicavit, omnemque tra-  
stationem



Stationem in quatuor sectiones diuifit, in quarum prima veterum, in fecunda recentiorum fententias recenset, in tertio difquirit, an farina antherarum ad foecundationem requiratur, in quarta demum verum ufum huius pulueris perueftigat.

In *fectione prima* oftendit veteres Phyficos THEO. p. 208. PHRASTVM, DIOSCORIDEM et PLINIVM ad sexum plantarum fine euidenti partium declaratione prouocaffe, et palmae dactyliferae praecipuum exemplum attuliffe, ab eo tempore vero ufque ad CAESALPINVM, qui circa initium feculi praecedentis Romae obiit, neminem de sexu plantarum cogitaffe.

In *fectione fecunda* oftenditur recentiores hanc p. 213. rem attentius difquifiiffe. Cl. GREVVIVS ex his primus fuit, qui pulueri antherarum *subtilem et viuificam efficaciam* adfcripfit, et fimul iudicauit THOMAM MILLINGTON idem afferuiffe. RAIVS fententiam prolatam fine ulteriori difquifitione affumfit; R. I. CAMERARIUS vero, qui sexum plantarum declarare annifus eft, haud pauca tamen dubia contra eandem adiunxit. MORLANDVS puluerem antherarum congenerem plantularum feminalium effe dixit. Quae WALDSCHMIDIUS et GACKENHOLZIVS in sexu plantarum demonftrando afferuerunt, Nofter non vidit, noua tamen argumenta non continere ex recenfione aliorum cognouit. Cll. Virorum GEOFFROY et VAILLANTII afferta recenset et breuiter perstringit. Tandem reliquis relictis LINNAEVM ftrenuum fexus plantarum defenforem adducit.

In *fectione tertia* praecipue difquirit, an puluis an- p. 226. therarum ad foecundationem neceffarius fit? et negando refpondet, quoniam per experimenta, quorum non nulla iam anno 1737. instituit, conuictus fuerit, plantam foeminam fine praefente mare femina foecunda produxiffe, cum vero hoc per experimenta in spinachia, cannabi et mercuriali instituta cognouerit, obiectionem de puluere antherarum per ventum late

late dissipando, nec non de staminibus inter stylos forte latentibus, nullam esse monet, asserendo se attentionem singularem adhibuisse. Assumit igitur PONTEDERA assertum, *apicum liquorem ad embryonis foecundationem in omnibus plantis non esse necessarium*. In eo itaque totus est, ut argumenta, quae sexum plantarum confirmant, a LINNAEO in variis scriptis proposita et a GESNERO \* et WAHLBOMIO \*\* magis illustrata refutet. Nos, qui sexum plantarum satis probabilem, dubiis tamen non carentem cognoscimus, primaria tantum indicabimus, cum litem dirimere nequeamus.

- p. 232. Modum huius impraegnationis, quem VAILLANTIVS et alii parietariae exemplo declarant, a I. BAVHINO iam indicatum fuisse monet, sed demonstrare annititur hoc exemplum, cum descriptione floris Linnaeana collatum, dissipationem pulveris magis, quam impraegnationem ovarii declarare. Nec aliis exemplis eundem magis confirmari contendit, quoniam rimas et canales, in stylo pulverem suscipientes,
- p. 239. non concedit. Ratione proportionis styli et staminum recte nobis monere videtur, unam antheram ad plurima semina foecunda reddenda in cannacoro, plurimas vero antheras ad unum semen in pruno aliisque congeneribus deprehendi, ea vero, quae circa styli longitudinem in variis plantis staminibus minus proportionatam affert, proportionis leges vix
- p. 242. laedere videntur. De stylo post emissionem pulveris antherarum marcescente et negotium foecundationis finiente, tanquam argumento a tempore desumpto, ideo dubitat, quoniam plantas adducit, quarum antherae pulverem demittunt, ante quam styli conspiciantur.

\* in Diff. de vegetabilibus. I. et II. Tiguri 1740. et 41. 4to.

\*\* in Diff. de sponsalibus plantarum sub Praesidio LINNAEI habita. Holmiae 1746. 4to. vid. Amoenitates Academicas. Vol. I. a p. 61 ad 109.



tur. Hoc vero in cannabi, mays etc. nunquam perspeximus. Pluuias tempore florendi farinam foecundantem eluere et ita fructificationem impedire non concedit, cum potius humido nimio vegetationem impediendi illud adscribat.

Praecipuum argumentum, ex cultura palmae p. 247.  
 Etyliferae eiusque foecundatione desumptum, Noster negat, et praestantissimis viris, qui illud observationibus factis declararunt, assertum LABATII, viri in re herbaria et vegetationis historia parum instructi, opponit, qui etiam in Martinia insula, ubi vera datylorum cultura locum non habet, observationes suas instituit. Nec TOVRNEFORTIVS et PONTEDE-  
 RA, licet eximii fuerint botanici, testes contra plantarum sexum adduci possunt, cum ille in Hispania, hic in Italia, palmarum vegetationem non rite obseruare potuerint. Non negligendum quidem est argumentum, quod palmae non nisi post definitam annorum seriem ad fructus producendos aptae euadunt, non omittendum tamen est alterum, quod scilicet cultura ad producendos egregios fructus requiratur, inutiles enim, et certe minus foecundi sunt, qui in syluestribus locis in palmis solitariis producuntur fructus. Nos vero, qui in recensendo auctorum dissensu, a Cl. Auctore indicato, non pergere possumus, repetitis experientiis rem vere dubiam tantum confici posse asserimus.

In *sectione quarta*, in qua usum pulueris antherarum p. 279.  
 definire suscipit Noster, eundem excrementitiam partem quidem esse iudicat. Cum enim non nulli, commixtionem pulueris genitalis nouis varietatibus plantarum ansam praebere asserant, hae vero varietates ab aliis monstrosae vel morbosae dicantur, sententiae suae robur inde accedere autumat. Ipse vero Auctor hac in tractatione acquiescit, et confitetur, se tantum dubia contra sexum plantarum ad rem alterius declarandam attulisse.

p. 284. 10) *Adnotationes de chemicis solutionibus et praecipitationibus* \* Cl. ANDREAE PLUMMER. Ad facilitandam solutionum et praecipitationum chemicarum theoriam ex earum phaenomenis inter se comparatis laudabili instituto propositiones quasdam generales deduxit, quas exemplis ubique cognitis illu-

p. 287. strare aut confirmare annisus est. v. c. menstruum dari uniuersale quam maxime dubitat, et potius probabile esse arbitratur, fore, ut ad cuiuslibet naturalis vel artificialis corporis solutionem proprium inuenia-

p. 298. tur menstruum. Item: Quorundam menstruorum soluentes vires in actu solutionis non destrui, sed in aliis corporibus soluendis exferi, menstruaque a dissolutis corporibus separata priores qualitates omnes vel retinere vel recuperare posse. Ad cuius posterioris quoque propositionis veritatem confirmandam sequentia potissimum experimenta instituit.

p. 315. 11) EIVSD. *Experimenta cum salibus neutris, ex diuersis acidis liquoribus et salibus alcalinis fixis et volatilibus compositis, instituta* \*\*. Sal alcali fixum variis liquoribus acidis, spiritu nitri, salis, crystallis tartari solutis, aceto destillato, saturauit, sal hinc obtentum siccum retortae vitreae indidit, atque affuso dein oleo vitrioli, spiritu nitri, vel salis, unitos antea salis alcalici acidis liquores destillando rursus separauit, qui in soluendis corporibus ut plurimum easdem vires

p. 323. ac ante unionem cum sale alcalico exseruerunt. Quo vero se ipsum conuinceret, sal alcali volatile acido unitum iterum expelli atque priori qualitati suae restitui posse, uncias octo spiritus MINDERERI (qui ex sale volatili ammoniaci et aceto destillato ad saturationem addito componitur) ex cucurbita, addita salis alcalici fixi uncia dimidia destillauit, atque liquorem optimo spiritui salis ammoniaci simillimum exinde

\* d. 3 Ianuar. 1738. praelectae.

\*\* d. 7 Iunii 1739.



inde obtinuit. Ex quibus omnibus dein varia corollaria deducere, atque solutionum ac praecipitationum phaenomena ex particularum sese plus minus attrahentium vel repellentium viribus explicare an- nititur.

12) *Tentamina et observationes cum aqua minerali p. 341.*  
*Hartfellenfi prope Moffat 1750 instituta, una cum re-*  
*latione virium eiusdem medicatarum, quatenus adhuc per*  
*experientiam innotuerunt. Auctore GVILIELMO*  
*HORSEBURGH.* Varia eaque satis accurata, licet non in loco scaturiginis, diuersis temporibus cum hocce medicato fonte, qui ex monte *Hartfell*, tria circiter milliaria septentrionem versus a *Moffat* sito, scaturit, atque a IOHANNE WILLIAMSON, hunc anno 1748 detegente, publicoque usui propriis sum- tibus adaptante, *Williamsonianus* dicitur, experi- menta instituit Cl. Auctor. Post tempestatem enim valde pluuiosam d. 26. August. 1750 hausta, in lagenis subere et cera probe munitis ipsi missa, clara pelluci- da, saporis acris aluminosi fortiter chalybeati stypti- que fuit. Cum sapone illam coagulari, atque gra- uitatem eius specificam ad aquam fluuii *Annan* esseprehendit, ut unciarum quatuor granorum quinque ad uncias quatuor grana undecim. Cum lactis ae- p. 342.  
quali quantitate cocta illud non coagulauit. Syru- pus violarum debilem ipsi colorem viridem, puluis vero gallarum statim coeruleum, dein obscure pur- pureum et tandem nigrum conciliauit. Infusum theae eadem, minori licet gradu, praestitit. Ab oleo vel spiritu vitrioli nec efferuescentia nec coloris mutatio orta est. Oleum tartari vero per deliquium nullam quidem efferuescentiam, sed tenues virides nubes in medio aquae suspensas una cum magna bul- lularum aerearum quantitate sensim disparentium ex- citauit, quo facto, nubes, sensim condensatae, fun- dum petierunt. Solutio sacchari saturni aquosa ean- p. 243.  
dem

dem parum albicantem, minus vero albicantem, quam aquam simplicem, reddidit, cum pulueris albi praecipitatione. Aeri liberiori die primo septembris in vase lapideo, charta obtecto exposita, die secundo septembris puluerem fuscum lateritium praecipitauerat, et plures splendentes braëteolas cuprei coloris in superficie exhibebat, die tertio maior pulueris fusci quantitas in fundo, et omnes vasis partes aqua tectae flauo colore tinctae inueniebantur, loco braëteolarum vero pellicula aquae superficiem obtegerat; die sexto aluminosus ille sapor admodum fortis, chalybeatus vero longe debilior fuit; substantia flaua lateribus adhaerens crassior, polita oleosaque adparuit, et aqua cum puluere gallarum immediate coeruleum colorem induit; die decimo tertio aluminosus sapor adhuc remansit fortis, chalybeatus vero vix distingui potuit; syrupus violarum debilem colorem viridem, et puluis gallarum coeruleum debilius quam die sexto produxit; die nono octobris saporem magis aluminosum quam recens aqua, syrupus violarum vero viridiorem quam antea colorem exhibuit. Mensura (*Chopine*) dein huius aquae in patina stannea ad quartae partis remanentiam cocta flauiusculi coloris atque lutosa facta est. Praecipitatis floccis ochraceis sapor austerior aluminosiorque remansit, quam in illa recenti aut quae liberiori aeri exposita fuit. Puluis gallarum hanc admodum lente et post undecim demum horas in debile coeruleum mutauit. Alia mensura eiusdem aquae in patina stannea ad remanentiam unciae unius atque dimidiaeuaporata, atque dein filtrata, limpida atque saporis fortiter chalybeati fuit. Haec ulterius euaporata reliquit sal dilute fusci coloris (qui color ab empyreumate provenisse videtur, leniori enim igne euaporata mere album exhibuit), et saporis aluminosi, fortiter chalybeati austeri. Huius salis parum, haustui aquae inditum, flauum illi conciliauit colorem, orientibus vero



vero flocculis flavis, sensim auctis seque praecipitantibus, sequente die aqua limpida facta saporem fontis medicati originarium, sed fortiozem habuit. Et decantatae huius limpidae aquae pars altera cum syrupo violarum debilem viridem tincturam; altera vero cum pulvere gallarum colorem violaceum, lente tamen, dein purpureum et altero die obscure coeruleum in atrum vergentem; remanens vero in fundo vitri aqua turbida cum syrupo violarum fortius viridem exhibuit, quam prior limpida. Haeque tres mixturae simul sumtae, unciam unam semis non excedentes, mensurae aquae simplicis affusae colorem obscure violaceum produxere. Si huic sali, ante dissolutionem in parua aquae quantitate, oleum tartari per deliquium instillatur, obscure viridem colorem producit. Super candente ferro ustum eadem phaenomena, ac si aquae inditum esset, exhibet, saporem aluminosum amittit, humidum fit, bullas gignit, et in crucibulo calcinatum colorem illum purpureum, quem vitrioli martis calx rubra habet, exacte refert; magnes quoque varias particulas manifeste attrahit. Hocce sal cum oleo vitrioli nullos emittit fumos, neque sal neque terra huius fontis cum spiritu siue oleo vitrioli vel oleo tartari per deliquium efferuescentiam quandam producant. Repetita haec experimenta p.348. cum eadem aqua, die duodecimo octobris 1750, tempestate iam diu valde sicca, hausta, eadem quidem phaenomena, sed longe debiliora, exhibuerunt. Ex p.350. quibus tandem colligit, fontem hunc medicatum 1) volatile quoddam et 2) fixum principium martiale continere; praeter ea vero 3) principium quoque alcalinum fixum, 4) admodum parvam, et minorem quidem, quam aqua simplex, quantitatem salis communis, 5) aluminis, et 6) terrae calcariae, nequaquam vero ochraceae, continere videri: Porro p.354. 7) quantitatem horum mineralium principiorum post tempestatem siccam ideo forsitan minorem, quam

*Tom. V. Pars I.* E post

- post pluuiosam deprehendi, quia hac, venae, mineralia principia continentes, altius aqua immerfae esse possint, quam illa : Dein fontem hunc 8) vitriolum martis natium continere, quod 9) fixum atque omnibus vitrioli martis proprietatibus praeditum esse, per varia experimenta euincere conatur, licet
- p. 356. crytalli, quas inde obtinuit, iis, quae arte parantur, pallidioris viridi colore praeditae fuerint. Et cum oleum tartari per deliquium huic aquae mense augusto 1752 viridem colorem statim communicasset, atque solito plures et viridiores in illa nubes excitasset; syrupus vero violarum nullam viridem tinturam, et pulvis gallarum debile tantum coeruleum exhiberet, causam horum phaenomenorum eam forsitan esse suspicatus est Cl. Auctor, quod principio martiali consueto maior acidi quantitas iuncta sit. Huius coniecturae autem veritatem instillata una vel altera olei tartari per deliquium gutta ostendit, atque in mixtura cum pulvere gallarum illico colorem admodum obscure coeruleum produxit: quare experimentum cum oleo tartari per deliquium semper adhibendum esse suadet, si martiale principium gallarum pulvere sufficienter detegi nequeat.
- p. 362. Diuturnam quoque huius aquae agitationem martiale principium
- p. 364. paululum debilitare experimento cognouit. De reliquo hoc tantum adhuc notamus, societatem in subiecta quadam nota ex viginti ipsi insimul traditis, testimonioque munitis variorum hoc fonte curatorum morborum historiis, duos casus recensere, ex quibus satis adparet, phthisin pulmonalem iam confirmatam his aquis unice curatam fuisse \*.

13) De

\* Hinc quoque apparet, non omnes aquas minerales sulphureas et martiales in phthisi pulmonali perniciosas esse, uti Cl. RAVLIN illas pronunciauit. Conf. eiusdem *Observations de Medecine*, cet. et *Comment. nostr.* Vol. IV. P. III. 417.



13) *De diuersis variarum ex calce viua paratarum* p. 372.

*aquarum viribus.* Auctore ROBERTO WHYTT.

Posteaquam commentarium suum de usu aquae calcis viuae quinto tentaminum Edinburgensium volumini iam inseruerat Cl. Auctor, litteris a Cl. H A L E S mense maio 1751 datis monitus fuit, vires aquae calcis viuae multum augeri posse, si eadem secunda vice calci viuae, recens ex igne desumptae, infunderetur. Ad huius igitur obseruationis veritatem indagandam quaedam adhuc experimenta instituit, eademque paulo post in peculiari libello \* publicauit. Cum verò Cl. ALSTON, contrariam sententiam fouens, aquam ad certum tantum gradum a calce viua impraegnari posse, atque ideo semel impraegnata, ab extinctione recenter factae calcis in eadem, viribus augeri non posse, confidentius assereret \*\*, Cl. Auctor, ad demonstrandam veritatem prioris sui asserti, sequentia instituit experimenta, atque inuenit  
 I) cum 100 pollices cubici a) aquae fontanae 25320 p. 376.  
 grana ponderarent, b) eandem quantitatem aquae calcis testarum ostrearum ita paratae, ut 90 granis eiusdem, recens ex igne desumptae, unciae 96 aquae bullientis per horas 92 infusae essent, pendere 25356 grana, et sic ad aquam fontanam esse quam proxime ut 704 ad 703. c) eandem quantitatem ita paratae, ut librae uni calcis viuae librae decem aquae bullientis per quindecim horas infusae manerent, pendere 25397 grana, et sic ad aquam fontanam esse quam proxime ut 329 ad 328; d) eandem quantitatem ita paratae, ut librae uni calcis viuae recentis librae 7 aquae calcis (No. c. descriptae simpl.) per 7 horas  
 E 2 affu-

\* vid. Comment. nostr. Vol. IV. Pars IV. p. 611.

\*\* In Philos. Transact. Vol. XLVII. Artic 39. p. 265 seq. cuius etiam mentionem inieciimus Comment. nostr. Vol. III. Part. I. p. 29. et in peculiari libello, cui titulus, *Dissertation on quicklime* etc. ubi idem etiam de calce testarum ostrearum affirmauit.

- affusae essent, pendere 25457 grana, et sic ad aquam fontanam quam proxime esse ut 186 ad 185. Atque hae tres aquae b, c, d, tantum ratione saporis, quantum ratione grauitatis specificae a se inuicem diuersae fuerunt. Et cum aqua calcis (d) argento paucorum minutorum intervallo cupri colorem indueret, debilis (b) nullam sensibilem mutationem produxit. II) Cochlear paruum vini rubelli (*Claret-wine*) quatuor eiusmodi cochlearibus aquae calcis (b);  $2\frac{1}{3}$  cochlearibus aquae calcis (c); et  $1\frac{1}{2}$  cochleari aquae calcis (d) opus habuit, ut ex hac miscela color pulueris pyrii oriretur. III) Porro, grana 20 salis tartari cum unciis 8 drachmis 2. aquae calcis (b) per quinque dies calci infusae, commista  $2\frac{2}{3}$  gran. pulueris albi praecipitarunt. Eadem salis tartari quantitas ex eadem quantitate aquae calcis duplicatae, quae per 8 dies calci superaffusa steterat, plus quam 7 grana pulueris albi; et ex eadem quantitate aquae calcis duplicatae (d), quae per 24 horas calci infusa fuerat, grana 8 pulueris albi praecipitauit ita, ut post admissionem salis tartari hae aquae saporem calcis, et quidem tam ante, quam post praecipitationem, retinerent. Aquam igitur duplicatam (d) triplo maiorem quantitatem calcis continere posse argumentatur, quam illam simplicem (b). IV) Denique tres alias, prioribus vero b, c, d, similes calcis aquas per 19 dies aeri liberiori exposuit, quarum remanentes, post iteratam filtrationem, crustae, proportionatam quidem, sed paulo maiorem terrae calcaereae quantitatem, exhibuerunt; et hinc euaporationem, optimam cognoscendi viam esse censet, quantum terrae calcaereae quaelibet aqua calcis contineat. Cum differentia vero inter grauitates specificas diuersarum calcis aquarum longe maior sit, quam pondus terrae calcaereae in hisce aquis contentae, hinc euidens esse arbitratur, praeter hanc terram aliud quidpiam esse, quod calx viua aquae ad ponderis augmentum communicat.



municat. Et in subiecta nota praeter hanc terram agiliorem quandam atque subtiliorem partem adesse debere coniicit, cui aqua calcis saporem atque virtutes suas praecipue debeat. Hanc per sal tartari fortiter attrahi, atque hac ratione a terra praecipitata, quam solutam tenebat, separari existimat \*.

14) *Epitome litterarum Cl. IOHANNIS LINNÆI* p. 386.  
 NING medici Carolinopolitani (at Charles-town) in Carolina meridionali ad Cl. ROBERT WHYTT exaratarum de anthelminticis radicis *Anthelmiae* (the Indian Pink \*\*) viribus. Haec radix aut in puluere, aut in infuso cum aqua bulliente facto, exhibetur. Grana duodecim pulueris, et grana viginti in infuso, infanti trium annorum, per aliquot dies mane et vesperi repetita, sufficiunt. Nimia vero pulueris vel infusi dosis, breui post assumptionem, infantibus vertiginem et dolorem in oculis vel supra eosdem excitat, una cum irregulari musculorum adductorum et abductorum motu, reliquis oculi musculis in affectis manentibus. Haec symptomata vero cito transeunt, et citius adhuc ope debilis cuiusdam spirituosii liquoris, cui volatilia, seu crocus, vel quaedam oleorum essentialium calidorum adduntur, remoueri possunt. Cl. Auctor vero pulueri, quem efficacissime operari arbitratur, in principio statim ad haec praecauenda

E 3                      parum

\* Idem quoque Cl. DV HAMEL per experimenta cum calce viua eiusque aquis instituta cognouit. Ostendit vero aquam calcis viuae acidam esse, et acidum hoc terram, per sal tartari praecipitandam, solutam tenere. Vid. *Memoires de l' Acad. Roy. des Sciences l'an. 1747.* et *Comment. nostror. Vol. I. Part. II. pag. 204 seq.*

\*\* Est *Spigelia LINNAEI* Sp. Pl. p. 149. *Ampelaca quadrifolia fructu testiculato PLUMIERII* Gen. II. de eius efficacia differit PATRICK BROWNE *Gentleman's Magazine An. 1751. mens. Decembr. p. 544. ubi et icon. plantae.*

parum olei rutae, sabinae vel absinthii, et ad aluum aperiendam rhabarbari quidpiam, adiecit. Minus nauseosa est, et in febribus absque eo, ut calorem nimium excitet, tuto exhiberi potest: Et licet non semper vermes expellat, infantum tamen querelas admodum allevat. Infanti aethiopico quatuor annorum septimo die febris cuiusdam continuae cum successu exhibetur: R̄. Aq. theriacal. drachm. ij. Aq. font. unc. iij. puluer. rad. Anthelmiae. Tartari regenerati ana scrupul. j. puluer. croci anglie. gr. V. sacch. q. s. M. sumat cochl. j. secunda quaque hora. Proximo enim die una cum febre triginta teretes, et altero die post repetitam mixturam novem adhuc vermes secedunt.

P. 390. 15) *Curationis historia per largas medicamenti mercurialis alterantis doses peractae a Cl. GEORGIO DENNISTOWN, Chirurgo Falkirkienfi, Cl. A. PLUM-*

P. 391. *MER communicata.* Ingenuum quendam virum a lue venerea salivationis ope, cum scrupulis quatuor mercurii dulcis institutae, liberauerat quidem Cl. Auctor, post annum vero idem morbus cum tumore, nucis iuglandis magnitudine in eminentiore tibiae parte conspicuo, reuertitur. Licet iterum altera salivatione lente admodum cum scrupulis octo mercurii dulcis instituta diuque protracta, depelleretur, tumor tamen in tibia remansit, quem pilulis aethiopicis et lignorum decocto tollere tentavit. Post mensem vero cum dolores totum crus occupantes iterum increverent, loco pilularum aethiopicarum pilulas PLUMMERI \* cuius massae colomelanos loco totidem

\* Descriptio virium harum pilularum in Vol. I. Artic. 6. tentaminum Edinburgensium legitur. Compositio haec est. R̄p Sulphur. aurat. Antimon. Calomel. rite pp. ana. Drach. ij. Calomelas laeuigetur super marmor, per vices addendo Sulph. Antim. portionem, et diuturno



dem mercurii dulcis substituerat, exhibuit. Aeger p. 393.  
 curationis adeo diuturnae post mensem alterum per-  
 taesus dosin pilularum, quarum tres vel quatuor tan-  
 tum mane et vesperi assumere debebat, proprio ausu  
 ita adauxit, ut earum 24 quolibet die per sex inte-  
 gras septimanas assumeret. Dolores inter haec una  
 cum nodo prorsus euanuere, optimaque sanitas abs-  
 que ulla saluatione insecuta est, licet a 1 Dec. 1739  
 ad 1 Maii 1740, quatuordecim uncias harum pilul.  
 tres uncias mercurii dulcis continentes, et nouem  
 uncias earundem, scrup. quindecim mercurii dulc.  
 continentes, intra sex septimanas assumsisset. Cl. Au-  
 ctor postea plurimos morbos cutaneos et illum quo-  
 que, qui sub nomine *Sibbens* cognitus, in locis pa-  
 ludosis circa Falkirk facuit, atque eadem cum lue  
 venerea symptomata habet, huic alteranti medica-  
 mento facile cedere saepius expertus est.

16) *Descriptio vasorum seminalium, Auctore Cl. p. 396.*  
 ALEXANDRO MONRO, *Medicinae studioso*. Adeo  
 felici ipsi esse contigit, vt mercurius in vas deferens  
 impulsus vias seminales altius permearet, quam un-  
 quam adhuc descriptum esse arbitratur. Compa-  
 rat hinc suas praeparationes cum praeparatione Ill.  
 HALLERI, eiusque perelegantem figuram Philos.  
 Transact. Nro. 494. Artic. XII. insertam suis ipsius  
 elegantibus praeparatorum iconibus in Tabula III.  
 ideo apposuit, vt comparatio eo melior institui possit.  
 Cum vero figurarum explicatio absque figuris ipsis  
 vix intelligi queat, saltem notamus, Cl. Auctorem p. 399.  
 vas illud, quod Ill. HALLERVS sub *lymphatici* no-  
 mine \* descripsit, ab utraque parte mercurio per-

E 4

uium

turno tritu fiat pulvis subtilis. Dein Rp pulueris  
 praecedent. unc. β. Gum. Guajac. drach. iij. Resin.  
 Guajac. drachm. j. Balsam. Copayiui q. s. ut F. MP.  
 ex cuius singulis drachmis formentur Pilul. XII.

\* Conf. Philos. Transact. No. 494. Artic. 12. p. 340 seq.  
 et Commentar. nostr. Vol. I. P. IV. pag. 684.

ulum inuenisse, ita, ut, si re ipsa lymphaticum sit, valuulis destitutum et sic a reliquis vasis lymphaticis  
 p.400. structura diuersum esse debeat. Et quoniam, si inter praeparandum extrauasio quaedam in parte quaedam epididymidis contingat, vel si quaedam ex eius conuolutionibus ligentur, ne gutta quidem iniectionis ultra hanc extrauasionem vel ligaturam versus testiculum antrorsum propelli possit: item, si epididymis interea. dum mercurius in vas deferens iniicitur, transuersim discindatur, hic ex unico tantum huius discissae partis orificio exsiliat; hoc euidentissime demonstrare arbitratur, corpus epididymidis ex unico mirandum in modum conuoluto tubo compositum esse. Saepius quoque, sed frustra mercurium per arterias spermaticas in vasa seminalia impellere tentauit, licet enim per venas spermaticas reuerteretur, nunquam tamen in hosce conuolutos tubos penetrauit.

p.403. 17) *Dissectio mulieris grauidae, una cum adnotationibus de utero grauido, Auctore Cl. DONALD MONRO, Medico Londinensi.* In dissecanda hacce femina sexto mense grauida anastomoseos disquisitionem, si qua inter uteri atque secundinarum vasa reperiatur, sibi

p.404. potissimum proposuit Cl. Auctor. Aperto igitur abdomine uterum, quem intestinis tectum, et dextra parte elatiorem inuenit, per aortam descendantem primo subtiliore et dein crassiore iniectione rubra repleuit. Proximo die substantiam uteri paulo antea-

p.406. te dissecuit, et cum subiacens pars digitis premendo ab uteri substantia facile discederet, forfice capitulo munita uterum linea cum lateribus eiusdem parallela discidit. Quo facto, hanc substantiam villosam membranam esse, fere sponte sua se a discissis uteri lateribus separantem vidit. Inter haec nulla dilaceratio vasorum seu fibrarum obseruari potuit, si quaedam loca excipias, ubi paruae quaedam conuolutae arteriae,



arteriae, huic villosae membranae adhaerendi causa, ab anteriore uteri parte abscedebant. Vterus ipse, p. 407. eandem circiter crassitiem habens, ac non impraegnatus quispiam, compositus erat ex firma exteriori membrana, quae ope contextus cellulosi, per quem arteriarum numerus discurrebat, substantiae rubrae, dimidiam circiter uteri crassitiem aequanti atque musculosam faciem habenti, necebat; fibras vero vere musculares in regularibus stratis iacentes observare non potuit. Intra hanc albidior substantia aderat, quam extensio cellulosa membranam esse euidenter demonstrabat, numerosis vasis arteriosis venosisque ubique per illam discurrentibus. In medio discissorum uteri laterum vacuae venae cum distentis ab iniectione arteriis comparatae admodum amplae erant. In interna superficiei abscissae uteri partis arteriae conuolutae, et quaedam venarum orificia in conspectum veniebant, et exterior chorii lamina scabra, succu- p. 408. lenta quodam modo villosa, pallidi carnei coloris et non prorsus transparens erat. Conuolutae arteriae ipsi adhaerentes forcipe separabantur absque ulla dilaceratione fibrarum discernenda. Haec exterior chorii membrana alteri, seu transparenti propie sic dicto chorio, sese ab exteriore fere sponte sua separanti, per admodum subtilem teneramque cellulosa substantiam iungebatur. Quibus tandem cum amnio discissis, foetus aquis innatans capite deorsum positus apparuit. Allantois detegi non potuit. In- p. 410. iectis dein in arterias et venam umbilicales diuersis liquoribus, iniectionem quoque in venas uterinas, posteaquam discissas uteri margines consuerat, impulit. Exemto utero apertaue vagina in parte po- p. 411. steriore, insignis pars ceruicis uteri admodum parum distenta, et os tincae ut parua rima, annulo glandulari, crasso muco repleto, circumcirca obsita, apparuit. Separata dein superiore dimidia placentae parte ab utero, cui per firmiorem cellulosa membra-

nam, quam omnes reliquae oui partes, connexa erat; extrauafationes omnium quatuor iniectionis generum, illius tamen, quae in aortam descendentem iniecta erat, maxima pars inter placentam et uterum inueniebantur. Nullum vero vas placentae iniectione ex utero veniente, nec ullum vas uteri iniectione

p.412. secundinarum repletum erat. Plurimae aperturae *sinus* dictae, viridi iniectione plenae erant, quaedam vero admodum parum rubrae iniectionis continebant. Interna uteri membrana parti cuiuslibet orificii earum, quarum quaedam minimi digiti, alia vero vix flili capacitae erant, superextensa valuulae genus formabat. Venae exinde continuatae, utut amplae, ipsis tamen sinubus minoris diametri erant.

p.413. Venam spermaticam monstrosae magnitudinis et multoties arteria spermatica maiorem obseruauit, quae ambae circa se inuicem ita contorquebantur, ut interdum arteria venam intrare videretur. Quae omnia figuris in tab. IV. V. VI. VII. egregie illustrauit Auctor, variasque adnotationes subiunxit, quas vero, ne nimis longi simus, praeterimus, et saltem notamus, compressionem iliacarum venarum ab utero expanso ipsi causam, tam vastae distensionis venarum spermaticarum, quam oedematis pedum et labiorum pudendorum maxime probabilem videri.

p.426. 18) *Observationes de utero grauido supplementi loco additae a Cl. ALEXANDRO MONRO Medic. Cultore.* Feminae 40 annorum, quatuor infantum matris, quinque menses grauidae uterus fere aeque magnus, ac antecedens, licet figurae magis oualis et anterieus peritoneaeo contiguus fuit. Liqueur in hypogastricas arterias iniectus spermaticas et sat magnam arteriam in ligamento uteri rotundo repleuit; spermatica dextra parua, sinistra pennae anserinae, et hypogastricae mediae inter has magnitudinis fuerunt. Aer in venas inflatus totum uterum distendit, et venam in  
ligamen-



ligamento rotundo arteriae ante dictae responden-  
tem amplam manifestavit. Vteri antcrius discissi tres p. 428.  
quartae crassitiei partes manifesto musculi faciem ha-  
bebant, fibris pallide rubris, quae in aqua coctae a  
carne quacunque cocta distingui non poterant; plu-  
rimae eius fibrae tunc oblique a ceruice fundum ver-  
sus discurrere, aliae vero transuersim positae esse vi-  
debantur \*. Liquor amnii dilute fusci coloris fuit, p. 429.  
additum vero oleum vitrioli aut oleum tartari per  
deliquium nullam mutationem produxit, id quod ipsi  
probare videtur, illum parum serosi vel urinosi liquo-  
ris continere. Idem in aquae bullientis calore tenuis  
albicantis spumae quidpiam ostendit, eiusdemque  
uncia una ad siccitatem cocta scrupulum serosi coaguli  
reliquit. Ceruix uteri prope os tincae vesicularum  
racemis mucosae obscure fusci coloris repletis obsita  
erat, paruaque orificia idem liquoris genus continen-  
tia in earum interstitiis adparebant. Placenta remo- p. 430.  
ta inter hanc et uterum injectio in hypogastricas ar-  
terias impulsae extrauasata reperiiebatur, nihil vero  
eiusdem placentae vasa intrauerat. Dein multae  
paruae serpentinae arteriae orificiis suis in internam  
uteri membranam hiantes conspiciebantur; et aliae  
plerumque ampliores conuolutae arteriae, quarum  
extremitates nondum obseruari poterant, in intersti-  
tiis cavitatum cera repletarum, quae in priore disser-  
tatione *sinuum* nomine insigniuntur, prominentes  
apparebant. Hi vero sinus, uti Cl. Auctor illos ob-  
seruauit, in interiore uteri parte absque ulla praeuia  
dissectione conspici potuerunt, praecipue eo in loco,  
ubi placenta adhaeserat; in omni enim alia uteri  
parte eorum pauci tantum, iique admodum parui  
reperiuntur. Eorum latera membranacea fuerunt,  
quorum

\* Confer. Nou. Comment. Acad. Scient. Imper. Petro-  
pol. Tom. I. ad annos 1747. 1748. Artic. 2. p. 337.  
seq. et Comment. nostr. Vol. I. Part. II. p. 231. ubi  
idem a Cl. WEITBRECHT asseritur.

- quorum illud, quod cavitati uteri proximum est, in quolibet sinu admodum tenue cum amplo quodam
- p. 431.** orificio instructum deprehendit. Inflato aere vel injecto in venas liquore facile distendi; ex arteriis autem itidem quidem, sed longe difficilius repleri potuerunt; extensi, figurae sphaeroideae adparent; et cum diameter orificiorum cavitatum diametro minor sit, sinuum nomen illas obtinere posse censet. Dissectione arterias in quosdam eorum, minimum hiantes observavit; ex omnibus venae magnae exierunt, quae omnes una cum sinubus largas inter se communicationes habuerunt; et licet quidam sinus duas vel tres tantum paruas se in illos aperientes venas habuerint, in genere tamen diameter harum ex sinubus continuatarum venarum non longe inferior fuit diametro sinus ipsa. Et cum hinc adparere arbitretur, has cavitates nil nisi dilatatas quodam modo ramorum venosorum extremitates esse, earum formationem ex solito difficiliore sanguinis ex utero grauido regressu
- p. 432.** facile explicari posse autumat. Hic enim accumulatus venas omnes valde, earum vero extremitates, laxa interna uteri cellulosa membrana tantum tectas, maxime dilatabit, qui effectus istic, ubi maximus humorum affluxus est, i. e. ubi placenta adhaeret, maxime quoque conspicuus erit. Cum igitur hi sinus nil nisi impraegnationis effectus sint, nec unquam in utero virgineo inueniantur, menstruus quoque fluxus vel aliud quoddam phaenomenon ex eiusmodi structura vix explicari poterit. Prope marginem placentae, ubi sinus non adeo frequentes sunt, aliquot orificia arteriarum, quarum quaedam notabili diametro praeditae erant, directe in sinus hiantia inuenit, eademque Tab. VII. delineavit, Quin imò arterias cum sinubus communicantes in cadauere, a fratre dissecto, adfuisse arbitratur. Extravasata enim per aortam injecta rubra materies ipsi antea sinus repleuisse
- p. 434.**



uisse et dein per crassiorē viridē in venas impulsam iniectionem rursus extrusa esse videtur.

19) *De differentia respirationis atque motus cordis p. 436.*  
*inter homines dormientes vigilantesque differuit Cl. R.*  
 WHYT. Cum tota haec tractatio theoriae Cl. Auctoris iam antea propositae \* et a nobis etiam fusius expositae superstructa sit, nobis in hac recensenda procul dubio eo breuioribus esse licebit. Primo ostendere allaborat, pulsus tarditatem somni tempore partim a tardiore sanguinis regressu ad cor, praecipue vero a minore cordis ipsius sensibilitatis seu aptitudinis ad motum gradu prouenire. Et posito dein, cor somni tempore minus sensibile esse, atque ita sanguinem tardius et in minore quantitate in pulmones proiicere, necessitatem quoque respirandi hinc paullo imminui; et cum praeterea somni tempore pulmonum quoque sensibilitas paullulum imminuatur, respirationem inde quoque necessario paullo tardiorē atque profundiorē fieri debere autumat.

20) *Adnotationes de musculis intercostalibus, Aucto- p. 447.*  
*re Cl. ALEXANDRO MONRO, Anatom. Prof. BAY-*  
 LII propositam demonstrationem de actione muscutorum intercostalium internorum, a Cl. TAUVRE reiectam, ad rationes reddendas adplicauit, cur interni musculi intercostales inter spinam et costarum angulum deficient, et cur externi intercostales musculi eo loco deficient, ubi costae se versus sternum sursum conuertere incipiunt. Absque addita figura vero vix intelligi poterunt.

21) *EIVSD. Curatio disrupti tendinis Achillis. p. 450.*  
 Disruptio tendinis Achillis olim aut non adeo frequens,

\* In libro, cui titulus: *An Essay on the vital and other involuntary motions of Animals etc.* et Comment nostr. Vol. I. Part. IV. pag. 589. seq.

quens, aut pro alio quodam morbo habita, fuit. Raro enim eius mentio iniicitur. Ex viginti vero vel triginta retro annis longe frequentior facta, Cl. Auctori ipsi accidit, qui disruptionis tempore eam sensationem habuit, ac si calcei calx pavimento foramen impressisset, id quod alii, quibus hoc accidit, itidem factum esse putarunt; alii autem de acri ictu ope lapidis vel scipionis ipsis inflicto conquesti sunt. Adeo vero crepuit, cum tendo disrumperetur, ac si nux quaedam subito sub pedis calce frangeretur, id quod praesentes etiam accidisse autumabant. Cl. Auctor vero factum augurans pedem sinistrum statim dextra prehensum fortiter extendit, atque suram sinistra

p. 452. manu deorsum pressit. Ligatura ex pannis complicatis asserulaque constans superiori pedis parti adplicata breui longe molestior fuit, quam quae diu tolerari potuisset; hinc aliam magis compositam tab. VIII. fig. 2. 3. 4. delineatam machinam excogitavit, cuius tamen notitiam, cum sine iconibus intelligi nequeat, ex ipso libro repetere velit lector. Interim notamus, eius ope, servatis simul diaetae regulis, integre restitutum fuisse Cl. Auctorem.

p. 459. 22) *Relatio morbi a plumbi, minerarum metallicis Mill-Reek dicti, Auctore Cl. IACOBO WILSON Chirurgo Durisdeerienfi ad ALEX. MONRO, Anat. Prof.* Omnes quidem istic habitantes, ii tamen praecipue, quorum labor quotidianus in eliquando plumbo consistit, huic morbo subiecti deprehenduntur. In leuiori gradu molestia seu grauitas circa ventriculum et cartilaginem ensiformem adest, interdum quoque colicae faciem habet. Saliua aegri dulcis quodam modo coerulei coloris atque illi, quae a ma-

p. 460. sticato plumbo oritur, similis deprehenditur. Pulsus aliquantum debilis, et cutis per totum corpus frigida est, sudor quoque viscosus saepe prorumpit. Crura debilia sunt cum pungente stupore, totumque



que corpus debile et lassum est. Appetitus immi-  
nuitur, nec digerunt, quod comedunt. Interdum  
diarrhoea curationem facit, quodsi vero diutius con-  
tinuet, admodum nocet. In hoc stadio aegri tamen  
adhuc obambulare muniaque consueta obire possunt.  
Quodsi vero haec symptomata diu continuent, et  
spirituosi liquores ventriculo vacuo seu post plumbi  
operas bibantur, morbus ad secundum stadium per-  
uenit, in quo prioribus malis dolor fixus in ventri-  
culo et intestinis speciatim in inferiore abdominis  
parte ab uno osse ilium ad alterum se extendens ad-  
ditur. Aegri aluo admodum adstricta laborant, ipsis-  
que videtur, ac si intestina arroderentur, pulsus ce-  
lerior fit cum cutis calore. Vertigo cum vehemente  
dolore caput occupat, cui insensibilitas et delirium,  
maniae pessimi generis simile succedit; adeo ut pro-  
priam carnem dilacerent, et manus proprias mor-  
deant. Extremitates tremunt et conuelluntur; tan-  
dem debiles fiunt, pulsus tertio vel quarto quoque  
ictu intermittit, et comatosi vel apoplectici moriun-  
tur. Fumus ab eliquatione plumbi oriundus ideo  
pro causa huius morbi habetur; quia liquatores ei-  
dem maxime subiecti sunt. Cl. Auctor pascua saepe  
a fumo illis incumbente coerulea facta vidit, quae  
pecudes illa depascentes occiderunt. Animalia ea-  
dem fere, quae homines experiuntur, et in cane,  
hoc morbo laborante, Cl. Auctor *Sludge* s. subtiles  
plumbi in aqua inter abluendum subsidentes parti-  
culas interiori ventriculi et intestinorum tunicae ad-  
haerentes vidit, quae in quibusdam partibus cru-  
stam efformauerant. Intestina quibusdam in locis  
valde inflammata, in aliis sphacelo corrupta ac per-  
forata erant; et faeces admodum durae per tunicas  
intestinorum hinc inde crassiores factas eo difficilius  
transire poterant. In principio aptam medicinam  
morbum plerumque tollere, in vertigine successum  
dubium esse, et curatione ulterius dilata, morbum  
fere

fere semper occidere obseruauit. Itaque quoque iter unius diei ipsis plus nocere, quam bidui laborem asseuerat. Curationem, experientia edoctus potissimum in purgatione primarum viarum consistere arbitratur. Hinc vomitoria antimonialia larga dosi commendat, in maiori adhuc dosi statim repetenda, si prius exhibitum nec vomitus nec alui depositiones ciuerit.

## VI.

ALBERTI HALLERI, Praesidis S. Reg. Sc. Götting. Opuscula pathologica partim recussa, partim inedita: quibus sectiones cadauerum morbosorum potissimum continentur. Accedunt Experimenta de Respiratione quarta parte aucta. Lausannae sumpt. Marci-Mic. Boufquet et Soc. 1755. 8. pl. 19. tabb. aen. 3.

**Q**uo vero ex obseruationibus et experimentis, quam hypothesibus, plus cepit medicina incrementi, et quo maior ideo viris, qui illas, quam qui has, tradiderunt, debetur laus atque gloria: eo insignior etiam vel ex eo accedere videtur Ill. HALLERI de medicina meritis cumulus, quod ea, quae in morbosorum cadauerum sectionibus in primis obseruauit, in hisce opusculis pathologicis posteritati conseruare voluerit. Morbos enim causasque eorum rariores, vel nouas, vel praeteruisas non modo iis ipsis expositas, verum ipsam quoque naturalem partium corporis nostri fabricam et usum saepius vindicatum sibi illustratumque accuratius fuisse, perlegendo deprehendimus. Collecta quidem in unum volumen hic nobis offeruntur tum programmata, quae vocant, numero septemdecim, annis 1749 ad 1753, disputationibus inauguralibus candidatorum



datorum non nullorum praemissa; tum alia, quae Philosophicis Transactionibus, Actis Academiae Suecicae Stockholmienfibus, Commercioque litterario Norico inserta exstant, et quorum quaedam ipsi indicauimus; accessit etiam experimentorum de respiratione recensio, quae in opusculis anatomicis ipsius proposita, nos quoque exposuimus; \* scriptorumque tandem, quae haecenus edidit Noster, quaeque adhuc editurus est, catalogus; atque adeo, quae amplo sermone hic recenscamus, vix quaedam superesse videntur. Enim vero inter obseruata haec alia quum occurrant, quae nondum in publicum edita, e schedis suis addidit Ill. Auctor; alia etiam ex iis publicata quidem, a nobis tamen nondum indicata quum sint; quarta denique etiam pars experimentorum de respiratione noua nunc quum prodierit; ex iisdem omnino non nulla, eaque grauioris argumenti, nostris in commentariis exponamus, oportet.

Quando igitur ab ipsis obseruationibus morborumque historiis capiendum est initium, eas unice ex incisis cadaueribus morbofis petitas esse, opus non est, ut praemoneamus; inscriptio enim idem ipsa loquitur; illud tantum iuuabit de iis generatim addidisse, sincere, simpliciter, breuiterque enarrata esse phaenomena praecipua, neglectis, quae mere accidentia visa sint, omnibus, atque ex illis, quae fluxerint proxime, subiuncta paucissimis corollaria. Ordinem ad laesarum partium corporis nostri viciniam sibi Noster delegit, ita, ut a capitis morbofis affectionibus exorsus, ad reliquorum organorum viscerumque contemplanda vitia progressus fuerit.

*Obs. 1. Scirrhum cerebelli exhibet, ex Philos. p. 9. Transact. n. 474. repetita.*

*Obs. 2.*

\* vid. Comment. nostr. Vol. I. Part. II. p. 189 seq.

*Tom. V. Pars I.*

F

- p. 11.      *Obs. 2. Falcis foramina cerebrique hemisphaeriorum inde coalitio ulum falcis declarant, in sustinendis hemisphaeriis positum, ne alterum incumbat alteri, in primis quando in latus decumbimus.*
- p. 12.      *Obs. 3. Capsula lentis crystallinae obscurata proponitur. In fele quidem visa fuit capsula haec pellucida et facile separabilis a lente, lens alba et mucosa, intus nucleus solidior, in tres partes fissus, iris conuexa, ciliarium filamentorum conuexus circulus. Bis autem in femina lentem flauam et pelluentem, capsulam eius opacam et albam obseruauit Noster, eamque adeo posse obscurari, contra negantem illud b. GÜNZIVM, exinde collegit.*
- p. 13.      *Obs. 4. Aneurysma carotidis describitur. Tumor albus, ab aure ex maxilla inferiore ad clauiculam extensus, durus paullum, digitis tamen cedens, non in se rediens, obscuram mouit fluctuantis materiae suspicionem. Operationem praeuertit aegri mors. Atque tunc dissectus tumor cellulosus, membranaceus, pugno duplo maior occurrit, a subclauia ad diuisionem usque duorum ramorum carotidis expansus, cuius membrana amplior valde duriorque facta fuit; in ipso sacco multi grumi sanguinis, quorum exterior pars in cellulosam abiit, fluidi sanguinis parum adfuit.*
- p. 14.      *Obs. 5. Scirrhum musculo mastoideo medio in cellulosa eius, inhaerentem album oualem, vasculosum, musculo ipso ceterum sano, ut nouam obstipi colli causam exhibet; quae si fuerit, frustra suscipi posse musculi in latere, in quod inclinat caput, sectionem, et frustra etiam opposito lateri ex Cl. WINSLOWII consilio applicari remedia, inde colligit Noster, in paralyfi hanc concedens curandi methodum.*

*Obs. 6.*



*Obs. 6. Strumas* considerat, quas in planioribus p. 16. Helvetiae locis, et Gottingae quoque vidit Ill. Auctor aequae frequentes, ac in Alpibus. Glandulae thyroideae vitium est. Fuit haec aliquando mollis, solito maior, inflata, forte ab aere, ut putat Cl. L'ALOVETTE, per parturitionis conatus in minimos ductus ex arteria aspera irruente; alio tempore mollis carnosae, media callosa, pinguis, lapidea fuit; alio cutis lobi unius crassa, mollis, caro glandulosa, partim lardi similis, partim ossea fragmenta visa sunt. Tophi etiam et hydatides, et pus in eadem sese obtulerunt, quin in cane quoque vermes. Fertur diu struma, necat vero interdum comprimendo venas iugulares et arteriam asperam. Dubia ob vasorum copiam et amplitudinem amputatio.

*Obs. 7 et 9. Suffocationis causas rariores* offert, p. 19. quarum prior fuit auellana nux, infra glottidem, sub ligamentis inferioribus, haerens super tracheae ostium; altera, eaque rarior, in puellae, cetera sanae, ore et faucibus, detecta lumbricorum copia, et in primis par vermium teretium, asperam arteriam, in principio pulmonis, ad cordis sedem occupantium.

*Obs. 8. Raucitatis vocisque extinctae causam* repertam sistit in tumore et ulcere, epiglottidis dimidiam fere partem quod eroserat, neque vero feminam suffocauerat, uteri potius enectam vitio.

*Obs. 10. Gibbi historiam* tradit. Antrorsum et p. 20. extrorsum medium pueruli prominuit sternum cum cartilagineis appendicibus, costarum vero parte ossea introrsum contracta. Vitium fuit emollita costarum novem superiorum pars, qua cum cartilagine connectitur, quaeque in sceleto durior iterum facta est, reliquis costarum corpore et apophysibus nihil mutatis. Viscera cetera bona fuerunt et integra.

- p. 24. *Obs. 11. Curvitatē spinæ dorsi* describit. In femina, quæ dorso suo gestavit arenae pondera, defuncta serpentinas spinæ huius flexiones, in viua quæ non aparuerunt, detexit sectio. Ita verò contortæ visæ sunt thoracis et lumborum vertebrae, ut summæ duæ thoracis sanæ, tertia; quarta et quinta inferius dextrorsum, superius sinistrorsum flecterentur; sextæ et septimæ corpus totum dextrorsum esset, lateralis par eius antrorsum directæ; binæ ultimæ dorsi et prima lumborum magno emerent tubere solidiori, durissimoque, ex earum corporum ancylosi factæ; secundæ denique et tertiæ lumbaris vertebrae sinistrum latus excavatum insigniter.
- p. 25. *Obs. 12. Hydropem saccatum vel in ipsa pleura* quoque nasci posse confirmat. In hydropici enim thorace, præter aquam in pericardio effusam, totum illius cauum aqua viridi fuit plenum, pulmones nulli visi. Inter musculos nimirum intercostales et pleuram, quæ a costis discessit, saccum formans cauo pectoris æqualem, aqua illa stagnavit; pulmo inde sinister compressus fuit, manus crassitie tenuior; dexter ulcere fere consumptus.
- p. 26. *Obs. 13. Pleuritidis in pulmone sedem* euincit, e Commercio litterario Norico 1735. repetita. Raro vel numquam sola pleurae inflammatio!
- p. 28. *Obs. 14. Peri-pneumoniae ex transudatione sanguinis* exempla tria adfert. In primo fuit febris acutior, sensim aucta, frustra vena secta, frustra adhibito aceti vapore. aeger moritur. Pulsus mollis, parvus et celer. Dissecti in pulmone non ulcus, nec inflammatio, sed sanguinis in cellulas sese obtulit effusio; magna pars visceris nigerrima in aquam missa subsedit. Alterum exemplum puer erat, cuius pulmo, sinister cruore plenus, cor sinistrum inane, dextrum



dextrum contra cum aure distentum sanguine, aortae ostium polypo obsessum, pleura inflammata, idemque sudor sanguinis. Vnde colligit Noster, sanguinem non in solis vasis haerere peripneumonicorum, sed verum omnino fieri errorem loci, ut vaporis loco ille exhalet in cellulas aereas. Porro et pueros immunes ab hoc malo non esse inde patescit. Tandem vir quinquaginta annorum, febre acuta cum dolore et oppressione pectoris, singultu perpetuo, pulsu intermittente, periit, accedente deglutitione difficili, delirio et sudore. Cuius viscera sana fuerunt; pulmones leuiter adhaeserunt, scirrhi notati initiis; diaphragma illaesum; Ventriculus autem inflammatus, sanguine in cellulosa secundam effuso, circa cardiam atro inde imbutus fuit colore. Singultus adeoque illius sedes latuit in ventriculo.

*Obs. 15. Phthisin* etiam ab infantia minime ex- p. 33.  
cludi, variis exemplis confirmat, quibus pulmones  
ulcere et abscessibus consumptos fuisse constitit.

*Obs. 16. Adhaesionem pulmonis cum pleura in-* p. 35.  
noxiam monstrat exemplis, quam ipsi recordamur  
saepius obseruasse in sanis etiam post mortem.

*Obs. 17. Vasa magna thoracis aperta* exhibet.  
Post lapsum languoremque inde diuturnum defuncti  
in cadauere pulmo sinister totus euanuerat, viscida  
foetidaque in thorace relicta aqua; aspera arteria et  
vasa maiora quasi resecta hiabant; dexter pulmo oli-  
dus erosus; pericardium adnatum sterni. Dirissi-  
mos aliquando fert homo morbos, vita superstita!

*Obs. 18. et 19. Aneurysma aortae et carotidem ar-* p. 36.  
*teriam venamque iugularem excoecatas* describit et ico-  
ne illustrat, Philos. transact. n. 483. et n. 492. olim  
iam inserta.

p. 42. *Obs. 20. Venam cauam coecam exhibet inter iliacas et renales concretam, caui loco carnem polyposam fibrosam. Vena spermatica dextra solito amplior, in uretericam venam simili modo dilatatam reduxit sanguinem. Causa compressionis in cadauere detecta nulla fuit.*

p. 44. *Obs. 21 ad 24. Ventriculi mala quaedam grauiora recensent. Situs et figura insolita neglecta sunt ut vulgaria. Obesi hominis, ex longo acidorum, forte mineralium etiam, usu non sanati, sed contabefacti, ventriculus scirrhusus erat circa oesophagum duo pollices crassus, albus, ex laminis sibi instratis compositus. En! noxam abusus acidorum in corpore! In femina hydropica, praeter mala plura, in ventriculo circa pylorum decem tumores sese obtulerunt hemisphaerici, papillarum instar, quorum apex niger, perforatus, plena pure cauitas, moles varia. An a vermibus, an ab obstructis cryptis, dubium. Alio in exemplo peritonaeum, ventriculus, colon, duodenum, hepar atque cystis fellea in unam massam concreta fuerunt, fibris albis undique excurrentibus; coli vacui ulcus in ventriculum apertum; ventriculus scirrhis et abscessibus plenus. Tandem inedia enecati ventriculum vidit Noster cum intestinis vacuum, absque ullo fecum vestigio; bilis autem, replebat intestina. Omenti, mesenterii, multa adhuc erat pinguedo atque crassities. Ventriculi glandularum oscula rara, prope pylorum plura et maiora eadem. Adipem ergo non statim consumi in inedia; et bilem absque tumore ventriculi posse exprimi manifestum est.*

p. 49. *Obs. 25. Omentum scirrhusum, conuolutum, sesquipollicem crassum, ventriculo et hepati adnatum, pure plenum foetidissimo describit; Pancreas etiam scirrhusum.*



scirrhofum fuit; renes compacti, solidi. Causa fuit ictus calcis abdomini illatus.

*Obs. 26. Tympanitidis legitur descriptio. Aerp. 50.*  
nullus in abdomine; intestina aere distenta enormiter; bullae huius inter muscularem et externam tunicam in cellulosa multae; foetor teterrimus.

*Obs. 27. Intestinorum introsusceptionem innoxiam p. 51.*  
adserit variis adductis exemplis. Intestini solius et cum mesenterii portione inuaginationem, in puero aequae, ac in adulto, Noster vidit absque inflammatione, flatuque facile deletam; quin et genesin eius idem observauit in viuo cuniculo, itemque in ranis crebrius, qua nimirum intestini pars constricta, vi longitudinalium fibrarum, in vicinam sese immisit, tactaque veneno sponte iterum se expediit. Quae quum igitur adeo mobilis atque solubilis, absque omni inflammatione et ciborum in adfecto loco collectione a Nostro observata fuerit frequentius, eam ilei morbi causam non esse idem inde colligit.

*Obs. 28. 29. 30. Herniarum leguntur historiae. p. 53.*  
Secundam de exomphalo connato ex Commenc. litter. Noric. 1736. repetitam, et tertiam, varias quae describit hernias vulgares, non tangimus, primae modo in praesens exposituri argumentum. Herniam enim in ipso fetu non raro iam natam illa demonstrat, vacuam quidem, sed quam ex minimis causis intestino repleri oporteat. Multum huc facit testiculorum alius in fetu, ac in adulto situs. Bis in semestri abortu apparuerunt testes in suprema parte ossis ilium sub renibus ita positi in ostio tunicae suae vaginalis, cylindricae, vacuae, peritoneae continuae, ut in cauo peritoneae ipsiusque abdominis continerentur cum intestinis. In maturioribus fetibus federunt in summo inguine testes retro peritoneum,

naeum, mox descensuri in vaginam suam adhuc inane. Quando igitur vi respirationis et musculorum abdominalium testes in patulum peritonaei processum, vaginalem puta tunicam, descendunt, intestina quoque simul cum ipsis facile huc detrudi possunt, eodem peritonaei contenta cauo. Vnde herniae etiam congenitae. Dubius vero adhuc Noster, morbosus ne hic esset testium situs vaginaeque apertum ostium, an in omni fetu naturalis haec sit partium conditio, duobus tandem exemplis hanc ultimam confirmavit sententiam. In recens nato enim utroque fuit testium in superiori parte inguinis sedes; tunica vaginalis caua, patula suo ostio adscendit in abdomen per verum peritonaei foramen; cremaster cum vasis spermaticis per idem ostium adscenderunt, scrotum inane fuit.

p. 67. *Obs. 31. Prolapsum ani aliquando funestum visum tradit, qua intestinum rectum ad pedis longitudinem exciderat, villosa eius tunica exteriore facta ruberrima.*

*Obs. 32. Abscessus hepatis erroresque circa eum morbum refert. In homine pro empyematico curato, post operationem defuncto, hepatis ulcus visum est in superficie, diaphragmati vicinius, ut hepar tumidum sursum repulerit hoc, medicosque fecellerit in diagnosi. In alio hepatis abscessum dolor et tumor, sub scapula ad decimam fere expansus costam, manibusque cedens, febris lenta et icterica facies indicarunt. Incisum tumorem haemorrhagia maxima sequuta est et mors. Causa mali fuit saccus coecus, cruore grumoso plenus, ex arteriarum intercostalium ramo cutaneo natus aneurysma spurium. In puella denique hepatis abscessus pure plenus fuit et cum colo ieiunoque intestino ope cellulosae concretio, ut diuulsis iisdem intestini muscularis tunica sequeretur.*

Omen-



Omentum euanuerat, abdomen pure plenum.  
Phthisica inde perierat.

*Obs. 33. Calculos felleos exhibet.* Rarior vesicae p. 70.  
urinariae calculus Gottingae observatus fuit, frequentior omnino felleus. Historiae leguntur quatuordecim. E quibus notamus adultis frequentem hunc esse morbum, pueris numquam; icterum aliquando comitem habere, saepe non; bilem semper effeti esse, saepe nullam; hepatis labem inde crebro nullam; adhaesionem vesiculae ad peritoneum raram; raram quoque ductus choledochi dilatationem; figuram denique calculorum incertam esse, ut angulosi, cubici, sphaerici, irregulares fuerint observati; compositionem e radiis vel glebulis quasi factam; inflammabiles semper, numquam calcareos eosdem fuisse. Vnicam adhuc iuvat huc transtulisse historiam, rariorem omnino visam, qua nimirum duo calculi, alter maiorem vesiculam felleam repleuerat, alter in principio ductus cystici haeserat, qui multa bile flava amaraque abundabat; colligit inde Ill. Auctor constare manifesto, bilem ex hepate pervenire ad cystidem, bilisque amarorem in hepate nasci, esse vero etiam cystidis aliquam vim contractilem, qua se et circa calculum constringat, et ipsum levigare valeat. Tandem vermis etiam, tae-niarum ex genere, uncias tres longus, sesquilineam latus, in muris fellea vesicula observatus fuit, qui adeo non metuerit bilis amarorem.

*Obs. 34. Renum calculi prima stamina detexit,* ma. p. 82.  
teriem nempe in pueri renum ductibus bellinianis flavam, aurantiam, mucosam similem; in adultiore eam albam, duriores, strepentes; denique eandem ad lapideam fabricam proximam.

*Obs. 35. Incontinentia urinae, ex ulcere renum, scirrho vesicae et prostaticae nata describitur, olim Commercio litter. Noric. ann. 1734. p. 187. inserta.*

p. 84. *Obs. 36. Vesicae urinariae morbos quosdam tradit. Feminis in primis, quae saepe pepererunt, vesica utrinque ad latus intestini recti eminet. Inde origo appendicum. Quarum alia etiam causa est, si fibrae musculares vesicae a se inuicem cedant, calculumque eo prementem recipiant; Viri vesica id monstravit, flatu distenta, in cellulosa abiens, fibrarum muscularium undique intumefactis interuallis.*

p. 85. *Obs. 37 ad 43. Morbos naturalium partium in feminis exponunt. Prolapsum aliquando mentita, vaginae uteri columna superior et media pars rubens, post alium depositam evanuit, columella, quam CL. LINDENIUS dixit, visa. Sequuntur aliquot historiae uteri rupturae, quam frequentiores putat Noster prae haemorrhagiis fuisse causam subitae mortis puerperarum. Ex quibus iuuabit adduxisse praecipua momenta sequentia: Latus cervicis uteri aliquoties ruptum visum causam monstrat obliquum fetus in partu situm. Rugae vaginae statim a partu non deletae aut celerrime reparantur, aut non adeo inferuiunt vaginae extendendae facilius, ut vulgo creditur. Chorion lacinae plures utero innexae, amplumque vas arteriosum, quod detexit injectio, late sparsum per amnion, hanc ab utero viam, dubiam adhuc, iam certam demonstrare videntur. Parui placentae villi, ampla contra uteri venarum ostia multas placentae arteriolas docent hiare in unam venam uteri. Tubarum in graviditate parum mutatur situs, uterique parum eminet summa pars, et satis longae adhuc sunt tubae, ut attingere amplectique ovaria, indeque locum dare superfetationi possint. Corpora lutea frequenter quidem vidit Ill. HALLER, num-*



numquam vero duo in una femina, neque extra graviditatem, et puerperium, neque ante pubertatem, neque consumi ab iis ouula omnia, sed plura eorum superesse idem observavit, nulla vero umquam ante pubertatem. Sanguis, in ore puerperarum in primis defunctorum saepe inuentus, dedit originem fabulae illius de vampyris. Destructio uteri et vaginae in fila et flocculos, aliquoties observata, declarat utriusque fabricam ex tela cellulosa factam. Nulla enim certa filorum istorum directio, neque longitudo. Sinus uteri sunt venae. Venis enim continui, ramosi sunt membranaque tenera inuestiti; magnitudo, extensilis et inaequalis diameter, ostiorum amplitudo, tandem injectio eodem, licet falso, demonstrasse videntur. Attenuatio orificii uteri interni in partu ita explicanda est, ut, quo maior eius tunc fiat hiatus, eo magis plana et foramini in imo utero similis euadat eminens alias in vaginam pars uteri, omnisque tandem evanescat huius prominentia simul et annularis inter vaginam atque uterum vallis. Muscularium fibrarum uteri parallelas in primis laminas, varia directione sibi impositas, plurimis interpositis intervallis irregularibus, observavit Noster vesicae urinae fibris valde similes. Fibras musculares eas, an musculus dixeris, perinde ipsi est. Quibus tamen committi non potest reliquiarum placentae euacuatio, quum liberi etiam sanguinis grumi temporis tractu adhaesisse, et chorion longo a partu tempore adnatum fuisse doceat observatio. Ceterum adhaerentem dubitat Noster, liberam affirmat eas posse expellere placentam. Scirrhi porro rarioris in pelvi et ulcerum uteri missa historia, mentio adhuc iniicienda est placentae vesicularis, quam Noster vidit in discum congestam, subrubram, ex eadem exsurgentes plures petiolos unciales, iisque innexas vesiculas albas, aliis in ipsa placenta dispersis rubris, intus gelatinam viscidam. Coecas tubas tandem,

tandem, ut rariorem observationem, breuissimis adduxisse sufficiat. Steatomatis ouarii descriptio et icon, Philos. Transact. n. 472. alias inserta, hic iterum exhibetur.

p. 109. *Obs. 43. Inflammationis naturam* inuestigat. Saepius visa sunt intestina flatu distenta, totaque inflammata, cruor vero non in vasis stagnans, sed in cellulosa telam effusus, arbuscularum in modum: id, quod imitatur saepius etiam iniectio. In viuo, febre miliari laborante, similes adparuerunt maculae extrauasi humoris late confluentes. Porro in iuvene, febre acuta internique incendii sensu extincto, hepar et lien integra; intestina tenuia atque colon flatu distenta; maculae in iis et ventriculo et mesenterio subnigrae gangraenosae obseruatae sunt; ventriculo aperto, cruor in cellulosa eius secundam effusus occurrit. Similis saepe in aortae tunica externa supra cor sese obtulit quasi sugillatio. Simples tandem inflammationes, in oculis frequentes, non ab errore loci, sed quod plures globuli sanguinis in vasa, unum tantum quae vehant, impellantur, melius explicari posse arbitratur Ill. HALLER, fusio-rem phaenomenorum in physiologia maiori daturus expositionem.

p. III. *Obs. 44. Historia constitutionis variolosae anni* 1735, in *Commerc. litter. Noric.* anni 1736. p. 73. exhibita, hic repetita legitur.

p. 122. *Obs. 45. Glandulas* conglobatas mesenterii, ad aortam, ad arterias iliacas, in inguine, alias, intumefactas scirrhasque saepe obseruauit Nosler, quin et ipsum thymum simili laborantem vitio vidit, ut inde eius cum conglobatis glandulis, appareat analogia.

*Obs.*



*Obs. 50. Telam cellulosam duriores, 46. eam non naturalem* describunt. Dura adeo et tendinea haec in crure occurrit, ut illud in flexus situ maneret immobile; In vetula chordae tres tendineae abdomen distinxerunt, linea alba et semilunaris non ossea, sed dura valde, arteriae variae in os mutatae, aliquoties observatae fuerunt. Praeter varias autem viscerum p. 123. concretiones, aliquando visae sunt membranulae latae, flavae, pellucidae, omentum cum peritoneo coniungentes. Similis pleurae et pulmonum occurrit nexus. Spinam magnam, vaginae tendinis unius euerforum pollicis manus infixam, multa tela cellulosa obuoluit. Tuta ergo vaginalium eius modi perforatio. Vbicumque inflammatio fuerit, tela quoque e fucco viscido cellularis!

*Obs. 47. 48. 49. 51. 52. 53. Praeternaturalem par-* p. 124.  
*tium variarum corporis nostri in os mutationem* illustrent. Prima modum materiemque disquirat huic mutationi aptam, in *Actis Acad. Scient. Suec. Vol. XI. n. 2. p. 12. exhibita*, et a nobis alio iam tempore exposita uberius.\* Ad alia progredimur. In posteriori thoracis parte callus pleurae sese obtulit, manum latus, undosus, coriaceus, agarico similis. In menyngibus, dura aequae ac pia, in falce, in plexu choroideo inuentae ossificationes raras non sunt. In aorta et eius valvulis squamae osseae, margoque aortae callosus fuit, neque vero clausa inde coronarium ostia. Cartilago in articulo maxillae inferioris interposita, perforata fuit et pene consumpta in uno latere; altera integra. Adeps quoque exhibuit globulos duros, lentiformes, pene cartilagineos, ad ignem liquecentes. Rara vero et inaudita fere est p. 134.  
lapidis in corde iuuenis observatio. Mater palpitationi fuit obnoxia; eadem periit filius. Cuius cadauer incisum in omni superficie pericardii detexit scirrhos

\* vid. *Comment. nostr. Vol. III. Part. II. p. 196. seq.*

hos albos, duros, alios ex iis pure plenos, nexos cum corde. Ventriculi dextri pars inferior semilapidea, iuncta cum pericardio. Sinus aortae callosi, valuulaeque eius materie sabulosa atque osseis refertae squamulis. Valuulae venae pulmonalis totae durissimae, calculosaeque materie ita plenae, ut inter secandum creparent. Sinus pulmonalis caro lapidea. Cor adeoque nec clausum, nec apertum satis, alterna carens requie, perpetuo palpitavit. Similem p. 136. prae se fert lapis in oculo visus raritatem. Retinae loco sese obtulit membrana concentrica, ossea, duplex, perforata; ubi nervus alias transit; vitreus humor nullus, sed cylinder albus, cum membrana ista ossea aequae ac antierius cum iride, ciliorum processibus corneaue connatus firmiter. Ipsa retina igitur in os mutata. Nulla ergo pars corporis nostri, quae non simili possit indurari modo!

p. 137. *Obs. 54. Ossis emolliti exemplum dedit crus ob cariam amputatum. Fibula enim carnea pene et cartilagini similis, scissilis, tumens, ulcere erosa erat; periosteum adhuc integrum et illaesum, ut adeoque Cl. D V HAMEL hypothesis, os induratum esse periosteum, valde dubia reddatur. Id, quod etiam monstrat a rubiae tinctorum pastu ruber ossium color, persistente candore periostei.*

p. 138. *Obs. 55. 56. 57. 58. Monstrosas fabricas exhibent, fetum capite deformi, agnum cyclopem; pullum tripedem, agnum carentem ore, quarum aliquae omnino natiuae fuisse visae sunt.*

p. 146. *Obs. 59. Renes coalitos bis visos describit et icone illustrat.*

*Obs. 60. Virgo duabus vaginis, rene simplici proponitur. Ren unicus, dexter, subrotundus; pelvis eius*



eius urina nimium distenta; caro solida, scirrhusa, ut corticalis distingui non potuerit. Viscera reliqua, et intestina in primis, in sinistro latere posita. Duo uteri duaeque vaginae. Singulo utero unicum ovarium vasorumque spermaticorum fasciculus. Reliquae partes a naturali statu non recesserunt. Furtim ablatae a chirurgo quum fuissent partes istae, hymenis natura, quod ille reliquerat in corpore, observari non potuit.

*Obs. 61. Vulvam falso monstruosam offert. Labia, p. 155.* instar duorum collum, ad anum usque producta erant; nymphae solito longiores, maximae; ceterae partes a naturali fabrica non abludebant.

*Obs. 62. De submersis agit. Quorum mortis p. 156.* causam veteres statuerunt esse aquae in pulmones il-lapsum, aerisque inde exclusionem subitam. Aquam contra Cl. BECKER negat ullam et in pulmones et in ventriculum penetrare posse; clausa fortius obmetum irruentis aquae glottide, in expiratione perire homines, inspirationem non ausos: Si qua forte observata fuerit aquae copia, illam pluribus a morte horis vel diebus demum penetrasse, relaxato tunc musculorum tono, atque hiantē larynge; statim a morte posse intrare omnino nullam. Enim vero Ill. HALLER in femina submersa regurgitantem e pulmone aequae ac ventriculo aquam; pulmonem nigrum, cor exsangue; vasa lactea chylo plenissima, rubris vasis parallela; thoracicum ductum lymphā plenum observavit. Serius a morte haec sese obtulerunt; hinc nova in canibus felibusque instituit Noster repetiitque tentamina, experturus certius, adsitne aqua perpetuo, atque an aliqua supersit resurrectionis spes. Multa in pulmonibus et trachea horum animalium fuit spuma; glottis aperta, sanguis ater crassus in vena caua et pulmonali in sinistri cordis vasis

vasis nullus; aqua multa in ventriculo; mors cita; in iis, quae mortua submersa sunt, nec in pulmone, nec in ventriculo ulla aquae copia. Quum adeoque spuma illa, inter ultimos animalis nixus ex aqua resorpta et cum aere mixta, aerem sua elasticitate orbauerit, ipsa vero se pulmonesque non potuerit expandere, atque hinc cito enecauerit durioris licet vitae animalia, nullaue, qua reiici iterum ea possit e pulmonibus, excogitari queat ars; spem resuscitandi submersos homines valde inde minui colligit Noster, et si quos umquam suscitatos fuisse credat, eos forte aliquibus interuallis, quibus super aquam emerferint, hausisse aquam suspicatus.

- p. 168. Iam ad experimenta de respiratione progredimur. Quorum quidem in quatuor partes facta est distributio; tres priores, opusculis anatomicis iam insertae, hic repetuntur; quarta vero addita est ab Ill. Auctore, noua comprehendens tentamina, circa costarum inferiorum interualla in primis facta. Confirmant eadem nullum prorsus esse in pectoris cauo aerem; musculos intercostales et externos et internos una agere eleuando costas; costarum superiorum et inferiorum interualla in inspiratione valde, illa mediarum parum imminui, idque apparuisse in viuis canibus euidentius, obscurius in strangulatis; diaphragmatis denique carnem tunc totam alterne abbreuiari, conuexam versus abdomen turgescere, non vero palleferi, viscera omnia thoracis simul descendere, quae in expiratione iterum adscendunt. Illud simul Noster adnotauit, se vidisse oesophagum carnosam parte diaphragmatis valde constrictum, id, quod in viuo adeoque magis, quam cui thorax et abdomen patent, euenire idem iudicat. Venam cauam quoque in felibus et deprimi et constringi a septi transuersi carne, ventriculum autem premendo felleam vesiculam, expressisse bilem obseruauit.
- Aperto



Aperto licet thorace, clamasse adhuc animalia, ut paradoxon idem ipse profitetur.

Tandem catalogum scriptorum Cl. Auctoris sub finem additum quod spectat, nihil omnino occurrit, quod huc referre possemus, praeter quam opera eius adfecta. Quae nimirum pollicentur physiologiae corporis humani elementa, voluminibus duobus comprehensa; synopsin enumerationis methodicae stirpium Helueticarum; bibliothecam anatomicam, botanicam, chirurgicam, practicam et historiae naturalis; orchidis genus constitutum cum iconibus; disputationum chirurgicarum continuatam, nouamque practicarum collectionem. Quibus vero absoluendis vires vitamque Ill. Auctoris diuina clementia tueatur, exoptamus ex animo.

## VII.

Differtatio medico - botanica exhibens plantas officinales. Praeside CAROLO LINNAEO, Respondente *Nicolao Gabn.* Vpsal. 1753. 4. pl. 4.

**I**nter alia, quae a Sueciae eruditis ad incrementum medicae artis hucdum praeclare acta fuerunt, illi de eo quoque cogitarunt, ut pharmacopolia maiori attentione instruerentur, et in iis, omni inutilium medicamentorum farragine reiecta, ea tantum, quibus in medicina facienda medicus neutiquam carere potest, asseruarentur pharmaca. Solliciti igitur fuerunt de norma quadam, ad quam pharmacopoei et simplicia sibi comparare et composita conficere debeant. Quod quidem officium impositum fuit Ill. BAECKIO, qui huiusce rei momentum sat magnum perspiciens, non solum pharmacopoeis iniunxit, ut de emendandis officinis cogitata sua ingenue

indicent, sed et omnes rerum pharmaceuticarum medicarumque gnaros excitauit, ut ad hoc negotium perficiendum symbolam suam conferant. Quid in hac re praestiterit eruditorum opera, luculenter factis demonstrant et hic et sequentes, quorum breuem recensioem exhibituri erimus, ad disputandum propositi libelli.

- Ab initio iamiam indicatae dissertationis monet Cl. Auctor plantas earumque partes a quolibet medico accurate cognosci debere, ne in praescribendis remediis errorem facile committat, aliaque ex officinis accipiat, quam ipse postulat. Exempli loco adfert, saepius in Suecia Hypochaerim maculatam pro Arnica, Centauream scabiosam pro vera Scabiosa fuisse a pharmacopoeis exhibitam. Amplum post ea et longum earum, quae in officinis asservantur, plantarum indicem exhibet, eo seruatō ordine, ut nomina officinalia primum, nomina vero botanica ex Praesidis Ill. plantarum speciebus desumpta secundum obtineant locum, et tertio tandem partes plantae, quae in usum medicum conuertuntur, indicet. Minutioribus literarum characteribus ea consignauit simplicia, quibus, ob virium defectum, optime cārere potest Medicus. Tradit porro regulas, quas in pharmacis colligendis obseruandas commendat. Radices, ut hoc utar, sub veris initium, herbas, cum florere incipiant, folia, postquam defloruerint, sed antequam maturuerint plantae, decerpi iubet. Cum etiam ille nostrorum temporum mos sit, ut pharmacopoei ipsi officinales plantas colant in hortis, varia ipsis suppeditat, quae simplicium culturam concernunt. Refert his peractis catalogum earum, quas Suecia ut indigenas profert, adiecta enarratione culinarium; quae ab incolis coluntur. Hortum pharmaceuticum in Scania posse instrui existimat. Varia hac de re et de situ loci et de iis, quibus, quod denegauit natura, emendari possit, artibus disputat, et indi-



indicem plantarum, quae in isto horto colendae sint, apponit. Tandem eas recenset vegetabilium species, quae vel ob climatis rationem vel aliis de causis in patria ali nequeunt; hinc vel ex aliis Europae regionibus, vel ex Asia, Africa et America sunt appor-  
tandae.

## VIII.

Censura medicamentorum simplicium vegetabilium, Praeside CAROLO LINNAEO, Respondente *Gustavo Iacobo Carlbohm*. Holm. 1753. 4. pl. 3.

**I**n duo distribuit suam dissertationem CL. Auctor capita, in quorum priori breuissimis errorum, circa medicaminum cognitionem, ortum ex variis deducit causis. Optime iudicat veteres historiae naturalis scriptores non satis de eo fuisse sollicitos, ut  
essentiales plantarum aliorumque corporum naturalium adferrent characteres, quo factum est, ut nunc eorum mentem vix possimus perspicere. Quamuis enim plures nostrae aetatis eruditi id egerint, ut ex prisca aevi scriptis simplicium historiam eruerent ulteriusque explicarent, ob insignem tamen obscuritatem maximam partem frustranea fuit opera. Adfert deinde ea, quae ex praeconceptis multorum ridiculis et absonis opinionibus, v. c. de signatura plantarum externa, de siderum in vegetabilia influxu, medicae artis incremento hucdum officere atque obstare videntur. Exigit tandem ab omnibus, qui medicinam  
exercent, ut, speciebus morborum rite cognitis, simplicibus tantum iisque in iusta dosi utantur: sic enim fieri posse iure coniicit, ut varia, quin imo ipsa, quae ut venenata abhorremus, pharmaca, in hominum commoda cedere possint. Addit his peractis catalogum eorum vegetabilium, quae ut superflua et inu-  
tilia

- tilia in officinis asseruantur, quem tamen, cum breuitatis sit ratio habenda, adducere hic non licet. In
- p. 16. posteriori capite paucis ad ea, quae contra plantas, quas mox in pharmacopolia recipiendas esse affirmavit, moneri queant, partim ob difficultatem eas obtinendi, partim ob incertam et experientia nondum satis comprobata earum energiam, respondet, et
- p. 17. indicem medicamentorum vegetabilium, huc usque in officinalium numerum nondum receptorum, ordine, quem vocant, alphabetico apponit, simulque quibusnam medeantur morbis, additis virorum in arte medica versatissimorum experientiis, explicat.

## IX.

Idea pharmacopoeae reformatae. Praeside NICOLAO ROSEN, Respondente *Ioanne Haartman*. Vpsal. 1754. 4. pl. 5.

**V**arias, quas in simplicium remediorum comparisonem observatu necessarias putat Cl. Auctor, regulas proponere annisus est, quas singulas hic adducere operae erit pretium, omissis maximam partem iis, quae in subiectis notis ad ulteriorem illustrationem et explicationem addere ipsi placuit.

- p. 4. Reg. I. *Videndum, ne inter simplicia inutilia et superflua adsint, efficacia vero desint.* Cum iamiam a Cll., quorum asserta supra recensuimus, antecessoribus satis superque esse de eo disputatum perspiceret, quod ad stabiliendam hanc regulam pertinet, brevibus tantum monet ad septem potissimum classes referri posse omnem inutilium pharmacorum copiam. Alia enim sunt insipida et inodora, abominanda alia et superstitiosa, alia obsoleta et inefficacia, alia suspecta nec sincera; alia exsiccata omnem vim medicam perdunt; extranea quorum succedanea in patria inveniuntur, una cum illis, quorum vires latent, iure exulant.



exulant. Taxat ex hoc capite Edinburgensium aliorumque dispensatoria, cum ita sint instructa, ut tertia fere aut quarta pars superflua retineatur. Londinense vero non adeo frequenter contra hanc regulam peccare affirmat.

Reg. II. *Sedulo excutiendum, an vis simplicium per p. 5.*  
*praeparationes simplices artificiales corrigi, conseruari,*  
*vel etiam in minori dosi et aucta vi obtineri possit; ex*  
*quibus tum praeparationibus, quae optimae sunt, eligan-*  
*tur; sin minus, melius est eadem simplicia in substantia*  
*propinari.* Varia ex hac regula deducit, quae in  
 pharmacorum usu prodesse, et medicum de remedio-  
 rum efficacia certum reddere possunt. Iure ergo  
 sine ulla praeparatione scillam, moschum et alia propi-  
 nanda suadet. Cum vero quorundam medicaminum  
 vis in parte tantum quadam haereat, praeparationes  
 ita iubet institui, ut isti parti extrahendae conue-  
 niant. Sic v. c. si gummosae vel resinosae partes  
 pharmaci efficiunt energiam, eius infuso vel aquoso  
 vel vinoso esse utendum adfirmat. Examinatis, ad-  
 ductum huius regulae, simplicibus, quae asseruantur  
 in Holmensi pharmacopoea, multa ipsi inesse demon-  
 strat, quibus carere medicus in facienda medicina  
 queat. Adfert eorum catalogum, quae improbanda  
 ipsi visa sunt, addito monito, non nulla, quamuis  
 inutilia nominari non possint, superfluis tamen esse  
 annumeranda. Pauca tantum ex longo illo indice al-  
 legasse sufficiat. Reiciuntur *Conseruae* Absinthii et p. 6.  
 veri et pontici, florum anthos, centaurii minoris,  
 melissae, *Succus* cydoniorum, *Syrupi* absinthii, ace-  
 tosellae, cardui benedicti, capilli veneris, *Extracta*  
 absinthii, cascarillae, fumariae, *Essentiae et tincturae*  
 cinnamomi, moschi, hyperici, *Aquae* anisi, corti-  
 cum aurantiorum, calami aromatici, cumini, omni-  
 um florum, sabinae, *Spiritus* angelicae, liliorum  
 conuallium, sulphuris, *Olea destillata* aurantiorum,  
 citri, lauri, melissae, rosarum, *Olea cocta* formica-  
 rum,

rum, foenu graeci, lumbricorum terrestrium, *Olea expressa*, amygdalorum amarorum, papaveris, *Axungiae* apri, caponis, hominis, *Balsama* caryophyllorum, maioranae, ligni rhodii, cinnamomi, *Salia* Cardui benedicti, centaurii minoris, fabarum, *Praeparata*, cornu cerui philosophice, cranii humani, lapidum pretiosorum, matris perlarum, et alia plura. Retinenda tunc indicat, ex quibus exempli loco sequentia nominabimus; *conseruam* acetosae, *Syrupos* rhei, spinae ceruinae, *Succum* rhamni, *Extracta* centaurii minoris, croci, hellebori nigri aquosum. *Essentias* et *tincturas* ambrae, tartari Harueyanam, opii SYDENHAMII, *Aquas* cinnamomi sine et cum vino, lauendulae, poeoniae, ranunculi, *Olea destillata* origani, petroselini, sabinae, baccarum iuniperi, cerae, fuliginis, philosophorum, *Sal* tartari, *Cineres* iuniperi, cornu cerui ustum, oculos cancerorum.

His expositis monstrat, quae in Londinensium et Edinburgensium pharmacopoeiis huic regulae contrariari putat: respuit ideo Londinensium *praeparationes* chelarum cancerorum, aeruginis, cretae, tutiae, *Conseruam* maluae, *Extractum* sabinae, *resnam* aloës, scillam coctam, rheum tostum, *Aquam* raphani, *tincturas* veratri, rhei et id genus alia. Edinburgenses vituperat, cum apes et millepedes praeparatas, *aquas* florum foeniculi, cardui benedicti, elixirium vitrioli ex oleis destillatis, non ex speciebus paratum, decoctum diascordii, aliaque nullius usus asseruent.

Reg. III. Certe in eo magnum momentum positum est, ut finem, quem in medicamento composito desideras, semper etiam obtineas, et ne per copiam simplicium minus secura vel minus efficacia composita habeas, sic enim digna merces non sequitur operam et impensam. Cum non semper medicus simplicia in usum vocare possit, sed et interdum composita adhibere cogatur, opus omnino est formulis, officinales quas dicunt, ad quarum



quarum normam istae compositiones a pharmaco-  
poeis effici ac praeparari debeant. In conficiendis  
igitur eiusmodi formulis medicum debere esse sollici-  
tum monet Noster, ut 1) omnia simplicia indicationi p. 13.  
respondeant, 2) quantitas ingredientium et ad se in-  
uicem et ad sua menstrua sit proportionata, 3) id,  
quod simplex debet mutare, vel minuendo vel au-  
gendo vim medicam, rite diiudicetur, 4) compo-  
sitiones principiis chemicis sint accommodatae, 5) at-  
tente curet, ut interne sumta in ventriculo soluantur,  
nec cum grauent. Taxat ex ultimo medicorum  
consuetudinem aegris propinandi absorbentia, imo  
cremoris tartari, arcani duplicati et tartari vitriolati  
usum iudicat noxium. Annectit huic regulae for- p. 22.  
mularum copiam, et multa adducit, quae a Londi-  
nensibus et Edinburgensibus contra hanc regulam  
committi solent.

Reg. IV. *Modus praeparandi quo simplicior, quo p. 28.  
magis determinatus, eo simul erit perfectior.* Iure exi-  
git Cl. Auctor spiritus salis et nitri dulces ex GLAV-  
BERI spiritibus esse conficiendos, ad lapidem inferna-  
lem purissimum argentum esse adhibendum etc.  
Londinenses tartarum solubilem cum tartaro tartari-  
fato confundere dicit, et eos ideo, quod spiritum  
vitrioli dulcem ex spiritu vitrioli, non ex eius oleo con-  
ficient, sal volatile ammoniacum cum creta, non cum  
calce viua proliciant, et quae sunt alia, taxat.

Reg. V. *Composita gratiora ingratis et nauseosis p. 32.  
praeferenda, si idem obtineri possit finis, et quae pluri-  
mis grata, ab omnibus tamen ferre nequeunt, in composito  
omittantur.* Hinc ambra, anisum, camphora, naphtha  
etc. non ingrediantur formulas officinales, sed, co-  
gnita aegri idiosyncrasia, illico et in magistrali formula  
a medico praescribantur.

Reg. VI. *Medicamenta, quae facile per moram cor- p. 33.  
rumpuntur et inefficacia redduntur, eliminantur.* Ad  
horum numerum refert, quae 1) vim exhalando per-  
dunt,  
G 4

dunt, 2) cito rancescunt, 3) mucore obducuntur, 4) fermentationem subeunt et 5) deliquescent et formam mutant.

Reg. VII. *Praeparata composita minus necessaria eliminanda, neque composita eiusdem virtutis plus iusto multiplicanda, sed magis necessaria eis potius substituenda.* Amplum eorum recenset catalogum, quae in Holmensi, Londinensi et Edinburgensi abundare videntur pharmacopoeiis, additis eis compositionibus, quas ob vim efficacem in officinas recipi posse existimat. Sub finem adiicit observationem de hel-lebori nigri extracto perperam in usum vocato, ita ut nec purgandi nec diaphoreticam vim exeruerit.

# X.

Censurae circa praeparationem medicamento-  
rum chemicorum, Praeside IO ANNE GOT-  
TSCHALCK WALLERIO, Respondente *Fri-*  
*derico Falck.* Vpsal. 1754. 4. pl. 3.

**P. 3.** Quae de comparatione ac asseruatione simplicium erant monenda, cum iam ab antecessoribus praeclare tractata viderit Cl. Auctor, eam sibi ad disputandum elegit materiam, quae de mechanica pharmacorum praeparatione in officinis praestanda agit. Adfert hac de re primum quaedam de quorundam stricte sic dicta praeparatione, et laeuigationem, utut laboriosam et minus necessariam, reiicit, cum sola puluerisatione idem obtineatur scopus. Si tamen eam reseruare libuerit, perfici illam iubet supra porphyritam, adpersa aqua tantum simplice. Specialiora tunc in medium profert praeparata officinarum spectantia, et omnia, exceptis antimonio crudo, coralliis rubris, oculis cancerorum, limatura martis, inutilia ac reiicienda existimat. Progreditur ad aquarum et spirituum destillationem, et quos in illa com-mittere



mittere solent errores pharmacopoei, enumerat. Taxat eos, qui triplum aut quadruplum aquae plantis affundunt, et in aquis eo modo confectis vim medicam desiderant. Regulas deinde apponit ad aquarum destillationem observatu necessarias, et, quae de aquis monita fuerunt, quoque in spiritibus stillatitiis esse attendenda suadet. Spiritus per fermentationem paratos faciliori negotio, ex plantarum oleis in spiritu vini solutis parari posse asserit; spiritibus vero abstractis, cum in iis conficiendis tantum volatile plantarum spiritui iunctum alembicum transcendat, in quibusdam indicationibus praeferendas esse essentias censet. Olea expressa, non ignis vi extorqueri, nec in magna copia confici iubet, simulque improbat ac flocci pendet olea, quae dicuntur cocta. In oleorum essentialium productione varia monet observanda, et empyreumatica sine taediosa rectificatione, cautelis quibusdam observatis, pura prolicere docet. Ad salia accedit, et vehementer illos reprehendit, qui salium plantarum indolem unam eandemque esse sibi persuadent. Differre igitur ea, quae TACHENII ad mentem parantur, ab iis, quae consueta obtinentur incineratione, in eo dicit, quod illa saponacea potius, haec vero prorsus sint alcalina. Methodum recenset, qua plantarum salia alba ac in crystallis sisti possent. Duplex dari Sodae genus, quorum unum alcali minerale contineat, et in crystallos cogi queat, alterum vero vegetabili gaudeat alcali crystallorumque formas respuat. Salia volatilia per se rectificanda censet, cum iis, quae addi solent, plerumque deteriora euadant ac inquinantur. Acidus spiritus semper GLAUBERI methodo praeparari debere iure prohibet, et acetum frigore concentratum, isti, quod euaporando conficitur, praestare adfirmat. Ex salium mediorum numero, ut minus utiles, reiicit tartarum vitriolatum et arcanum duplicatum, cum sibi persuadeat, hosce sales in corporis humoribus solui

- p. 15. et subigi neutiquam posse. Nitidam et accuratam post haec exhibet naphtham vitrioli et nitri praeparandi modum, et ingenue fatetur ad naphthae salis conficiendi methodum adhuc latere. Spiritum nitri dulcem, si sola digestionem paratur, efficaciorē esse eo, qui destillando obtinetur, asserit, cum existimet naphtham nitri destillatione dissipari, ac mixtionem haud ingredi. Nunc ad ea, quae ex metallicis parantur concretis, examinanda properat, et multa eaque solida de iis adfert. In primis mercurialia in censum vocat, ex quibus, ne iusto longiores simus, unum illud allegasse sufficiat, quod adfirmet, aethiopem mineralem ex anatica utriusque ingredientis portione, frigide sola trituratione confectum, longe praefendum esse omnibus aliis, quibus utuntur, compositionibus. De antimonio, zinco et ferro tunc egregie disputat et sub finem coniecturam addit, qua putat lapidem causticum maiori corrodingi vi esse instructum, si ex argento, cupri portione inquinato, conficiatur\*.

\* Inflammatio quidem a lapidis caustici applicatione produci debet, sed nos, ab eo, cupro inquinato, peiores inflammationes motas fuisse, experientia docuit.





XI.

De superfoetatione vera in utero simplici. Diff.  
inaug. AVGVSTIN. MEINRAD. LACHAVS-  
SE. Argentorati 1755. 4. pl. 2.

Quam in duplici quidem utero docent obseruatio-  
nes, superfoetationem etiam in simplici, Cl.  
LACHAVSSE sibi persuasit rationibus confirmasse ac  
experientia. Praemissa igitur breuissimis organorum  
et viri et feminae naturalium descriptione, exposita-  
que tribus modo verbis conceptus naturalis ratione,  
quae quidem sunt notissima, ipsam propius adgressus  
superfoetationis considerationem, diuisionem eius  
proponit in *fictam*, qua gemelli aliquot horis vel die-  
bus alter alterum antecedit; in *falsam*, qua duo foe-  
tus, unus in utero, alter in tubis concipitur vel oua-  
rio; in *impropriam*, quae in duplici utero contingit;  
tandemque in *veram* et *exquisitam*, quae est in simpli-  
ci utero. Quam iam confirmat historia singularis,  
quam Cl. LERICHE aliquando fecerat, et Cl. EI-  
SENMANN in tabulis anatomicis uteri duplicis enar-  
rauerat, a nobis etiam indicata\*, ut repetere eam  
opus non sit.

Cui

\* vid. Comment. nostr. Vol. II. P. I. p. 27. seq. Quam-  
quam ex relatione Cl. EISENMANN, tum expo-  
suerimus, eam tamquam valde singularem obserua-  
tionem admirati, ceterum Cl. Viro fidem non dene-  
gauimus. Iam vero fateri non pudet, iuxta illum et  
nos deceptos fuisse veri quadam specie. Sollertior  
etenim in rem adeo miram inquisitio detexit frau-  
dem feminae istius, quae, ob sterilitatem mariti sibi  
concitato odio, obstetricem quandam hac in re con-  
sultuit, atque foetum ab hac, quae ex alia femina  
eum acceperat, traditum domum redux marito suo  
obtulit filium, ipsique se eum enixam fuisse persua-  
sit; inter ea vero ipsa vere grauida facta, alteram  
suo tempore peperit filiam. Ex qua historia patet,  
quam

- Cui addidit Noster uterum feminae illius, tribus ab ipsa superfoetatione annis defunctae, in cadauere inuentum omnino simplicem, adhuc seruari in spiritu a Cl. LERICHE. Cur autem post primum partum sanguis et lochia et lac desiderata fuerint, in altero vero copiosius fluxerint haec, in nutritione foetus alterius tum necessaria posita Nostro videtur esse ratio. Adductis post haec, qui superfoetationem vel negarunt, vel affirmarunt, auctoribus praecipuis, ipse eam adfirmans, C. LITTRIVM in primis
- p. 14.** refutare adgreditur. Orificium etenim uteri non adeo semper claudi a conceptu, ut sperma non admitteret, quin aperiri illud magis, quo foetus magis increuerit, idemque in menstruatis fieri demonstrat Cl. LACHAYSSÉ, collum vero uteri grauidi versus intestinum rectum reuerti concedit, ex musculari sua fabrica, nouo facto coitu, sese relaxare posse arbitratus. Tandem placentam tubas claudere posse prorsus negat Noster, quum volumen eius minus sit et non semper etiam fundo adhaereat.
- p. 16.** Quando itaque orificium uteri non bene clausum sit; vel foetus trimestris fortior illud dilatauerit pondere; vel femina nouo percita veneris oestro; vel menstrua fuerit, in simplici etiam utero fieri posse superfoetationem concludit idem.

quam caute versari quemque deceat in colligendis obseruationibus. Siquidem et huius dissertationis mentionem non iniecissemus, quae nihil noui continet, nec rei dignitati respondet, nisi ad veritatem confirmandam, obseruationis imperfectionem ostendere consultum habuissemus.





XII.

Opere postume del Conte GIVSEPPE GINANNI Ravennate. Tomo primo nel quale si contengono cento quattordici piante che vegetano nel Mare Adriatico da lui osservate e descritte. in Venezia 1755 dalle Stampe di Giorgio Fossati. Fol. Alph. 1. Tab. aen. 55.

i. e.

Opera posthuma Comitum IOSEPHI GINANNI. Tom. I. quo centum et quatuordecim plantae maris Adriatici comprehenduntur.

**I**OSEPHVS GINANNI anno nonagesimo secundo seculi praecedentis Rauennae ex illustri familia oriundus, in tenera aetate parentibus priuatus a FRANCISCO BARBERINI Purpurato educationi patrum societatis Iesu traditus fuit, paulo post morbo hypochondriaco affectus ab ANTONIO VALISNERIO consilia et auxilia recuperandae sanitatis obtinuit, qui et suaserat, ut praeter medicamenta, tales eligeret labores, quibus animus eius reficeretur: mechanicas ideo tractauit artes, paulo post vero amore florum captus hortum coluit, in quo studio apte addiscendo et perficiendo praeter alios IULIUM PONTEDERAM et PETRUM ANTONIUM MICHELLIUM praestantissimos botanicos consiliarios elegit atque amicos. Ipse tamen et ad alia historiae naturalis capita pertractanda se contulit, cicadas enim, nec non oua et nidos auium collegit, in ordinem redegit et descripsit, id, quod libri de his argumentis anno trigesimo septimo huius seculi Venetiis editi et a quibusdam viris eruditis cum applausu excepti testantur. Sub his laboribus museum rerum naturalium exquisitissimum collegit, in quo etiam plantae marinae haud paucae deprehenduntur. Quanti vero aestima-

aestimatus fuerit Noster, imago eius ab *A. Seluo* ex metallo efficta, nec non moneta in eius memoriam cusa ostendunt: societati etiam literariae anno quinquagesimo secundo huius seculi Rauennae stabilitae, et ex duodecim tantum membris constanti adscriptus fuit, et cum praecipuis viris eruditis commercium literarium coluit. Anno quinquagesimo tertio huius seculi haemorrhagia narium saepius tentatus fuit Noster, quae, cum ab infarctu viscerum dependeret, eum in hydropicum statum deduxit, in quo debellando remedia frustra tentata fuerunt, die enim vigesimo tertio octobris dicti anni obiit. Rerum naturalium ab ipso collectos thesauros, post mortem fratris huiusque filiorum in Collegium nobilem, Rauennae florens, reponere iussit, ex manuscriptis vero schedis, hunc, quem nunc indicamus, tomum et alterum, quem proxime expectamus de plantis marinis, iunctis quibusdam observationibus de testaceis et insectis tantum prelo dignos iudicauit, eosque *Georgio Fossato* Architecto tradidit, qui licet splendidam curauerit hanc editionem, monet tamen non omnibus numeris absolutum opus esse, neque icones semper descriptioni respondere, cum ad siccas illae factae sint, hae vero ex recentibus plantis desumptae multas etiam icones ad varietates referendas omissas fuisse, ne numerus tabularum nimium cresceret.

Postquam itaque vitae rationes Ill. Auctoris paucis indicauimus, non nulla ex eius epistola ad Marchionem *SCIPIONEM MAFFEVM* data et operi praefixa repetamus, antequam dispositionem operis ipsius describamus. Monet quidem Ill. *GINANNI* se tantum partem maris Adriatici, Rauennae vicinam, perlustrasse, multas tamen plantas in arcto hoc spatio inuenisse alibi quoque prouenientes, quae itaque sufficiens fundamentum constituendis quatuor classibus postea a nobis recensendis exhibuerunt, numerum tamen se augere potuisse asserit, nisi a *Cl. MONTIO*  
monitus



monitus varietates euitasset, quarum tamen plures, ut nunc monuimus, ipse Editor expunxit. Tangit porro et Noster recentiorum assertum, qui multas sic dictas plantas marinas non effectus vegetationis sed opus polyporum, domicilia sua struentium, dici debere contendunt, et asserit domicilia haec longe aliter structa esse, quam plantas, quae ex trunco in ramos et porro in ramulos extenduntur et ita vere per *intrasusceptionem* succi nutritii, minime vero per *iuxta positionem* crescunt. In fine tandem circa observationes per microscopia factas dubium mouet, an non saepius ingenium fingat, quae oculi non conspiciunt, quam dubitationem ad opus VITALIANI DONATI \* extendere videtur.

Dum nunc ad plantas ab Ill. Auctore expositas accedimus, in genere monemus eum non proposuisse methodum observationibus recentiorum conformem, sed MARSIGLIUM aliosque sequutum esse, qui in his plantis, quas ex floris et fructus consideratione definire non poterant, ad substantiam ipsam respexerunt, genera itaque certis limitibus circumscripta et aptis characteribus definita hic non deprehendimus.

*Classis prima* de plantis ex lapidea vel interdum p. I. friabili materia compositis agit, *ordo primus* itaque lapideas plantas cortice obductas scilicet corallium rubrum continet. Hoc a veteribus ut planta consideratum, a Cl. BOCCONE inter lapides relatum fuit, donec Ill. MARSIGLIUS non tantum succum lacteum sub cortice, sed et veros flores, in planta recenti visos, describeret: nostris vero temporibus a Cl. VITALIANO DONATI aliisque ut naturae productum inter plantas et animalia medio loco reponendum, assumitur. Huic tamen sententiae Noster non subscribit, dubitat enim an accuratae tales observationes sub undis institui queant, et quomodo corpuscu-  
la

\* vid. Comment. nostr. Vol. I. Part. III. p. 475.

la illa rubicunda, quibus corallium incrementum suum debet, a polypo formari vel ad oua eius referri possit: concedit itaque polypos corticem corallii ita inhabitare, uti alia insecta plantas terrestres laedunt, et oua sua, ad incrementum et nutrimentum acquirendum, intra corticem deponunt, et concludit ipsum corallium a succo sub cortice moto crescere.

p. 8. *Ordo secundus* plantas lapidasas continet cortice carentes, substantiae tribulosae, quorsum madreporae, frondiporae et reteporae spectant: *ordo tertius* fungum sistit fungo terrestri similem, praeterea vix descriptum: *ordo quartus* lapideis analogas quasdam plantas in non nullis corallinis proponit: *ordo quintus* plantas continet pori nomine insignitos, ceruinum scilicet et anguinum ab IMPERATO descriptum: *ordo sextus* poris analogas sistit plantas et corallinas quasdam articulatas proponit.

Ex breui hac primae classis recensione patet Ill. Auctorem nec in ordinibus, nec in generibus, nec speciebus disponendis eas leges obseruasse, quas historiae naturalis scriptoribus praescriptas esse cognoscimus: descriptiones etiam non ita comparatas esse perspicimus, ut iis inferuire possint, qui in hoc studio perficiendo ulterius progredi cupiunt. Optimum nobis visum fuit, quod Noster alios scriptores, qui de his plantis scripserunt ALDROVANDVM, MERCATVM, IMPERATVM, MARSIGLIVM aliosque accurate citauerit, ita ut ex iis saepius iconum propositarum descriptiones uberiores repeti queant. Neque icones ita elaboratae sunt, ut attentioni recentiorum satis faciant, nos igitur, quae in reliquis classibus continentur, breuiter tantum indicabimus.

p. 14. *Classis secunda* complectitur plantas substantiae corneae vel mediae inter corneam et lignosam annexis lignosis foliis ornatis, et aliis his destitutis, ex quibus ordinum ratio iam patet. Lithophyta, miriophyllum, abies marina, et fuci varii hic recensentur.

*Classis*



*Classis tertia* coriaceas plantas, inter coriaceas et p. 21. herbaceas medias, spongiosas et vesiculares completitur, scilicet quercum marinam, coralloides, latucam et opuntiam marinas, algas, spongas, fucos varias et fauagines.

*Classis quarta* plantas ex filamentis congregatas et p. 39. glutinoso humore cinctas, scilicet Alcionia sistit, quibus porro subiunguntur fungosae, lichenosae et membranosae variae.

### XIII.

Observations d'Histoire Naturelle faites avec le Microscope; sur un grand nombre d'Insectes et sur les Animalcules, qui se trouvent dans les liqueurs préparées, et dans celles, qui ne le sont pas etc. avec la Description et les usages des différens microscopes etc. Partie déjà publiées par feu Mr. IOBLOT, Professeur en Mathématiques de l'Académie de Peinture et de Sculpture: partie rédigées sur ses Observations postérieures. Avec un grand nombre de Figures. To. I. à Paris. Chez Briasson. 1754. 4. maj. pl. 22 $\frac{1}{2}$ . Tab. aen. 29. To. II. 1755. pl. 14 $\frac{1}{2}$ . Tab. aen. 24. i. e.

Observationes, ad historiam naturalem pertinentes, cum microscopiis factae in magno insectorum numero et in iis animalculis, quae infusis variorum corporum aliisque liquidis inesse deprehenduntur, cum descriptione et utilitate variorum microscopiorum etc. Pars earum iam olim edita fuit per Cl. IOBLOT, altera vero addita ex observationibus eius relictis. To. I et II.

Tom. V. Pars I.

H

Magnus

**M**agnus est obseruationum, per microscopia factarum, numerus, quarum descriptiones a variis nostri seculi viris exhibitae prostant. Rerum enim naturalium studioso quid ab HOOKIO, deinde nostris temporibus a NEEDHAMO, HILLIO, BAKERO inter alios praestitum fuerit, incognitum esse nulli arbitramur, quum de posteriorum potissimum scriptis alibi iam a nobis actum sit \*. Hinc veniam penes aequos lectores nos inuenturos esse speramus, si de Cl. IOBLOTI libro pauca iam referamus, partim quod totus nouus non est, partim etiam, quod magna obseruationum pars ab aliis repetita, et aliqua etiam ex aliis desumpta fuit. Sic enim icones pediculi, pulicis, fungorum ex seminibus enatorum, atque descriptiones ex adducti Cl. HOOKII Micrographia, quae de plantarum radicibus et aliis partibus per lentem detecta sunt, ex GREWII Anatome plantarum huc translata fuisse videmus, quorum opera etiam se usum fuisse Cl. Auctor ait. In variis vero plantarum infusionibus, quid microscopium docuerit, multis confirmauit experimentis Cl. BAKERVS.

Ediderat iam anno huius seculi decimo sexto Cl. IOBLOT librum Parisiis, cui inscriptio : *Description de plusieurs nouveaux microscopes, avec des obseruations sur une grande multitude d'Insectes, qui naissent dans ces liqueurs etc.* A quo tempore nihil intermisit eorum, quae ad locupletanda sua obseruata pertinere possent, sed quicquid adnotauerat, morte interueniente inter schedas relictum, nunc demum a Cl. Editore, qui nomen suum latere voluit, publici iuris factum est. Omnis autem tractatio in duas partes diuisa est, quarum singula in duas iterum sectiones abit. In *prima parte* itaque ex consilio Cl. Editoris eius-

\* Nempe de Cl. HILLIO diximus Comment. nostr. P. II. Vol. IV. p. 664. sqq. de Cl. BAKERO Ibid. P. III. Vol. II. p. 218.



eiusque *prima sectione* collectae sunt observationes ex historia naturali et in primis insectorum eorum, quae magnitudine reliquis antecellunt, v. c. Pediculus, pulex, musca, curculionis species, vermiculi, qui caseos rodunt, nec non radices partesque vegetabilium: *Altera sectio* minutiora continet, quae *animalcula microscopica* dicuntur, et armato tantum oculo in conspectum veniunt. Sunt autem illa in infusis ex vegetabilibus reperiunda animalcula, quorum adeo magnam copiam proposuit Cl. Auctor, ut iure quodam videantur multa pro varietatibus habenda esse, quam aliorum quoque suspicionem esse scimus. Saliū inter haec formae diuersae exponuntur, et animalcula, aquis stagnantibus inhaerentia. Inter has autem observationes pleraeque ex manuscriptis relictis a Cl. Editore insertae sunt, quas tamen, quum prior editio ad manus non sit, cum ea conferre non licuit. *Altera* deinde *pars* microscopiorum disquisitioni destinata est, quorum partes constituentes et praerogativae praecipue recensentur, nec non additis, sine quibus perfectior eorum notitia reddi nequit, figuris illustrantur, inter quae unum praecipue laudat, quod uniuersale vocat. Quem ad modum vero non accurato tantum ad detegenda naturae abscondita opus est studio, sed reiterata quoque experientia: ita iudicamus et hanc minutissimarum rerum, quae summam creatoris sapientiam produnt, sollicitam peruestigationem, cui maior semper adhibetur opera, tandem naturali historiae perfectionis maiorem gradum esse daturam.



XIV.

D. IOHANN LVDW. LEBERECHE LÖSEKE,  
*Abhandlung der auserlesenen Arzeney-Mittel, nach derselben Ursprung, Güte, Bestandtheilen, Maasse und Art zu wirken, ingleichen wie dieselben aus der Apotheke zu verschreiben sind. Zum Nutzen seiner Zuhörer abgefaßt. Berlin, bey Christoph Gottlieb Nicolai. 1755. 8. 1 Alph. 22 pl.*

i. c.

De selectissimis remediis pharmaceuticis, eorum origine, bonitatis signis, diuersis, e quibus constant, partibus, dosi, modo agendi, eorumque ex pharmacopolio praescribendorum ratione tractatus, in auditorum usum conscriptus a IOANNE LVDOVICO LEBERECHE LOESEKE.

Quam dedimus nuper comprobatae Cl. Auctoris industriam\*, eiusdem et nunc nouum is edidit documentum iam iam indicato libro, quo numerum compendiorum, quae de sic dicta materie medica iam habemus satis numerosa, auxit quidem; ideo tamen haud inutilem suscepit laborem, quum ille non in tironum tantum, sed in eorum quoque usum conscriptus censi queat, quorum cognitio rerum medicarum paulo magis est prouecta. Omnibus interea numeris, prout in praesenti historiae naturalis statu fieri posset. hoc opus nondum esse absolutum ipse fatetur, id, quod ita praestari posse arbitratur, ut utiles seduloque exaratae rerum naturalium huc spectantium icones ex vastis illis saepiusque valde pretiosis, doctorum virorum academiarumque operibus collectae, optimaque ac per accuratam stabilitae experien-

\* Comment. nostr. Vol. IV. Part. III. p. 531.



perientiam medicorum obseruationes de medicamentorum viribus captae, adiungerentur. Interim plura huicce tractationi immiscuit, ac quis forte quaeratur. Therapiam enim generalem fere omnem et practicas, quae dicuntur haud paucas suis locis addidit cautelas, tum ex aliis auctoribus depromtas, tum per propriam acquisitas experientiam, ita, ut tirones artis ab initio nimis saepe timidi eo tutiores in praescribendis esse queant formulis, regulasque therapeuticas in adhibendis remediis scitu obseruatuque necessarias menti suae imprimant eo firmitus et ipsi de suscipienda morborum cura iudicare discant. Prae multis etiam aliis ideo meretur laudem, quod indigenas res naturales pro diuersa earum crescendi indole aliisque dotibus, pro diuerso, quo colliguntur, tempore diuersis, ipse inuestigauerit, in reliquis autem, omnium optimis et ex iis quoque recentissimis, qui de illis scripserunt, prudenter usus auctoribus.

Eum vero in toto hoc conscribendo opere adhibuit ordinem, ut, praemissa quadam generali introductione, scriptorum materiae medicae exhibeat notitiam; praecipuas, quae in pharmacopolio obueniunt, medicamentorum praeparationes et chemicas et pharmaceuticas breuiter explicet, tandemque de materie medica in genere agendo, de fontibus, qui suppeditant remedia, modoque eorum indolem inuestigandi, differat, et ordinem, quo ea proponuntur, indicet, nominibus variis mensurisque pharmacopoeo usitatis, sub finem expositis. Ipsa deinde eaque specialis de medicamentis sequitur tractatio, ita, ut eorum tria constituat genera: unum, quod euacuantia; alterum, quod nimias euacuationes cohibentia, tertium, quod sic dicta alterantia continet; e quibus illud primum vomitoria, digestiua atque laxantia, purgantia, diaphoretica, diuretica, saluantia, errhina et sternutatoria, carminatiua, anthel-

mintica tandemque emmenagoga complectitur; secundum vero refrigerantia cum incrassantibus, et roborantia cum adstringentibus atque stipticis; ultimum denique emollientia, diluentia, absorbentia, resoluentia, analeptica, antispasmodica, dolorem sedantia cum hypnoticis, atque rubefacientia cum vesicantibus recenset.

Quodlibet autem caput eo modo a Cl. Auctore pertractatur, ut eorum, quae illud exhibet, remedium agendi modum in genere; signa porro, quae eorum usum in aegris indicant vel prohibent, praemittat; tum vero ad ductum trium naturae regnorum, singula indiuidua, quae reliquis esse iudicauit et meliora et tutiora, ita exponat, ut enarret: quae ex historia naturali de iis consent; porro characteres tum externos tum internos; deinde iudicium de eorum indole, per saporis odorisque sensus chemicamque inuestigationem detecta, indeque conuenienti usu viribusque expectandis per experientiam confirmatis, propriaque in corpore humano agendi ratione, ideoque sub quibus conditionibus et qua dosi praescribenda sint, subque finem, quae ex iis praeparata in officinis prostant medicamenta, in medium afferat. Omnia tamen, quae in aliis huius generis compendiis adduci solent, exponere noluit, utiliora tantum seligens. Itaque v. c. in capite primo, quod habet emetica, de lapide lazuli, seminibus ricini, carthami, nuce vomica, helleboro albo e. s. p. nihil dicitur; id, quod nobis tamen mirum esse videtur, quum medicus ea quoque nosse debeat, quorum usus haud satis comprobatus vel quoque noxius esse poterit, adeo, ut ipse Cl. Auctor non nulla passim commemorauerit, de quorum usu recte monet, quo cautissimus. Desideramus quoque varia, quorum usus satis est egregius, et quae in plurimis nunc venduntur pharmacopoliis, v. c. oleum Kajuput, Siree, vitrum antimonii ceratum, e. s. p. Ne quid dicamus de aliis



aliis quam plurimis, quorum usus in primis obuenit in re oeconomica atque domestica, quae ideo se omisisse ait, quod ad doctrinam diaeteticam pertineant, quae suum tamen locum aptius, ni fallimur, in materie medica obtinere debent, et quorum etiam aliqua diuersis in locis adducere coactus fuit.

Vt artis quoque tirones discant, qua ratione medicamina debeant a pharmacopoeo componi, soleantque ex officinis praescribi, addidit tandem libro breuem aliquam institutionem, quae sic dictas formulas ipsos docet exarandas.

Totius itaque libri summa ratione nunc exposita, addamus adhuc aliqua ex eo ipso passim depromta.

Emeticorum usum praeter alios morbos, qui in p. 65. primis viis suam habent sedem, in illis quoque difficilioribus commendare audet Cl. Auctor, quorum causa proxima in remotioribus corporis haeret partibus, v. c. si serum aut sanguis extra vasa stagnans cerebrum premit; porro sub inflammationum, quin et earum, quae tenent pulmones, initium, in cachexia vel et hydrope.

De ipecacuanha notat, quod illa eius radix bru. p. 71. na vel fusca, quae ex Brasilia aduehitur, alteri griseae vel cinereae Peruuianae dictae praeferenda sit; alia vero alba, quae ab impostoribus illi utrique non numquam addi soleat, uti et lutea, prorsus alias habeant vires.

Aquas sic dictas soterias ad classem remediorum p. 79. digestiuorum leniterque laxantium refert, earumque praecipuarum, quae reperiri solent in Germania, quatuor summa constitui posse credit genera: earum quippe primum, quae salis cuiusdam alcalici martisque vitrioli aliquam continent portionem; appellantur illae vel acidulae, vel thermae; illis annumerat Pyrmontanas, Egranas, Selteranas, Antonianas, Swalbacenses, Wildungenses, Carbenses, Buchenses atque Spadanas; his vero, thermis scilicet, Caroli-

nas, Aquisgranenses, Embenses, Hirschbergenſes, Bollenſes atque Wiſbadenſes: ſecundum deinde earum, quae ferrum ſeu eius crocum fouent ideoque martiatae dicuntur, quales ſunt Radebergenſes, Lauchſtadienſes, Freyenwaldenſes, Bebranae atque Weiſſenburgenſes: tertium porro earum, quae, ſtrictiore ſenſu digeſtiuae nuncupandae, ſal amarum mediae indolis, ex terra calcarca acidoque quodam elemento compoſitum, gerunt, uti ſunt aquae Sedlizenſes ſiue Seydſchützenſes quoque appellatae, omnesque fontes reliqui, ex quibus ſal commune coquere ſolemus: quartum denique caput, quod illas recenſet aquas, quae ob leuitatem tantum puritatemque magni aeſtimantur ſcaturiuntque vel calide, uti Toeplizenſes, vel frigidiuſcule, uti Schlangenbadenſes et Schleuſingenſes. Eſto penes huius aquarum medicatarum diuiſionis Auſtorem, eam defendere; interim, ut tironum in gratiam determinatam diuerſarum partium, quas illi fontes ſinguli fouent, doſin et indolem breuibus addidiſſet, non immerito optare nos poſſe credimus.

p. 95. De ſale ammoniaco cuiusque floribus SYLVIIQUE inde praeparato ſale digeſtiuo vel febrifugo dicto, ſi in febris intermiſſentibus una circiter hora ante ingreſſurum paroxyſmum ab uno ſcrupulo ad drachmae uſque pondus dentur, ſingularem contra eas depraedicat virtutem, ita, ut plures aegros ſalis eius, quam ipſius corticis Peruuiani, ope ſe curaffe, quin et quartanam, quae per integrum annum iam duraſſet, unica illius ſaltem drachma ſe pepuliſſe aſſeueret.

p. 109. Notatu digniſſima, quam de pinguium abuſu eorumque diſſicillima digeſtione atque noxis, cenſeri debet obſeruatio, qua virum quendam, propter veruecinam carnem copioſe nimis comeſtam, atroci correptum colica eaque enecatam fuiſſe narrat, in cuius inteſtinorum villis, a Cl. LIEBERKÜHN artiſcioſiſſima methodo praeparatis, adeo inſignis illius pingue-



pinguedinis copia reperta fuit, ut ei prorsus inde turgent. Num vero recte ex hac obseruatione Cl. Auctor colligat, quod pingua ideo fiant laxantia, quoniam, dum vascula minima obstruant, pondere suo neruis molesta sint, ideoque copiosiores tenuiorum humorum profluxum ex illis proliciant ad inimicum illud quasi corpus abstergendum, alii iudicent.

Mirum omnino est, non numquam inueniri p. 119.  
aegros, quorum intestinorum canalis fere nullis moueri queat remediis purgantibus, quale etiam singulare Cl. Auctor adducit exemplum feminae cuiusdam debilis visae, cui per tres continuos dies tantam eorum medicamentorum copiam sine ullo effectu dederat, ut quatuor alii satis robusti homines inde purgari potuissent. In debili forte illorum corporum irritabilitate causam illius effectus latere nos quidem coniicimus. Interim circa fortiorum purgantium p. 120.  
usum cautos esse debere iuniores medicos recte monet Cl. Auctor, alio commotus exemplo hominis agrestis valdeque robusti, qui ab assumpto gummi guttae in asthma flatulentum adeo ferox inciderat, ut erecto tandem corpore in sella dormire cogeretur.

Hellebori nigri radicem inter leniora refert pur- p. 121.  
gantia iisque assentiri videtur, qui nostrum helleborum ab illo veterum diuersum esse existimant; pharmacopoeorum tamen vel errorem vel quoque fraudem indigitat, qua radicem adonidis seu hellebori HIPPOCRATIS dicti, nostro illi veriori substituunt.

Illum, quem medicorum seruant non nulli, mo- p. 147.  
rem, quo fortioribus purgantibus addere solent opiatam, reprehendit Noster eam ob causam, quoniam sibi contrarii inde motus in corpore excitentur, et per longiorem, quae acribus istis remediis concilietur in corpore, moram inflammationibus facile oriundis detur occasio.

Terreis adhuc medicamentis in diaphoreticorum p. 153.  
classe ex hac ratione aliquem assignari posse putat lo-

cum, quod acidum in primis viis obuium absorben-  
do transitum eius in secundas impedian, quo alias  
sanguis fieret spissior; et quod insuper alcalescentes  
sanguinis sales liberiores reddant, eunrque igitur re-  
soluendo attenuent, sudorisque excretioni aptiorem  
reddant,

- p. 162. Arborem camphoriferam ad lauri regiae pertine-  
re genus, ex ipsius floribus comprobatur, quos Berolini  
ante aliquot annos videndi et examinandi habuit oc-  
casionem. Ipsam vero camphoram singularem ali-  
quam autumat esse resinofam volatilem substantiam,  
ab oleosis subtilissimisque acidis particulis ita attem-  
peratam, ut hae non nisi ipsius combustionem prode-  
ant. ideoque inter calida omnino referri debere medi-  
camenta, quum et minima corporis nostri vasa,  
quin et ipsos forte nervos permeare, stimulando  
aperire, putridorum humorum, forsitan ipsius quo-  
que fluidi neruei, acrimoniam corrigere valeat. Ho-  
mini tamen sano, absque aestus excitandi metu, ad  
drachmas usque duas, tutoque pro expellendis flatu-  
bus ad unam drachmam dari poterit. Abusum eius  
in glandularum inflammationibus, erysipellate et ar-  
thritide, summo iure taxat Cl. Auctor. Ad exter-  
num usum oleum eius vel ipsam siccam, adhibere  
inauult, quam spiritum, quoniam in spiritu soluta  
humores nimis facile cogat.
- p. 230. Antimonii crudi, seu tuti remedii, usum in sca-  
bie similibusque serosi systematis morbis vindicat, li-  
cet haud constare simul concedat, quamnam eius  
partem humores nostri in primis viis soluant, quum  
ab aqua illud intactum relinqui constet.
- p. 238. Contra morbos chronicos ab humorum viscidita-  
te ortos fuligini insignes vires tribuit, inque scabie  
retropulsa certum esse remedium, camphoraeque, nisi  
praeferendum, certe aequiparandum asserit.
- p. 265. Recentibus graminis radicibus essentiale aliquod  
saponaceum ideoque leniter resoluens inhaerere sal  
inde



inde confirmat, quod experientissimus Berolinensium chymicus, Cl. MARGGRAF ex illis aequae, ac aliis radicibus similibus, saccharum praeparauerit.

Mirari saepe subiit chymicos, cur pimpinella nigra dicta spiritum vini reddat coeruleum? Causam huius phaenomeni in ipso plantae proprio succo essentiali latere Noster auguratur, quum copiosum eius coloris succum ex illius radice, vernali potissimum tempore discissa, profluere obseruauerit. De chamomilla et millefolio idem valere coniicit.

Pareirae brauae radicem ad unam usque libram sine effectu aegris se dedisse narrat.

Extractum scillae aquosum ab uno ad quinque grana, idem porro ad mellis consistentiam coctum et in aqua corticum aurantium solutum ad quadraginta et sexaginta usque guttulas exhibitum, valde laudat contra omnes affectus hydropicos.

Puellam, quae menstrui fluxus suppressione laborabat, per longum satis tempus insignem salivae copiam singulo die ad mensuram usque exspuere obseruauit.

Mercurium dulcem in excitanda saluatione praefert crudo, quoniam is in longe iam minores globulos diuisus et per adhaerentes particulas salinas efficacior redditus, in minimis corporis canaliculis haud adeo facile in maiores iterum coire globulos queat; qua in primis re in illis hominibus, quorum vascula valde sunt debilia, insignis noxa, eorumque facta ruptura ipsius mercurii effluxus in diuersas cauitates interque ossium lamellas, effici queant. Contra eos igitur quoque disputat, qui singularem aliquam acrimoniam acidam, in qua luis venereae naturam esse positam sibi fingunt, causam esse fabulantur, cur mercurius in quibusdam corporis locis interdum haereat istaque mala grauissima excitet: quum ipsius morbi symptomata de putrida potius, quam acida, humorum diathesi testentur; ipsumque mercurium  
aliis

- aliis liquoribus, v. c. vino, cereuisiae, admistum, acidam ab iis arcere corruptionem, quin et mercurium sublimatum, quem esse constet acidissimae indolis, per admistum illum crudum dulciorem reddi, ex chemia pateat. Ad illum itaque, si quis forte in corpore fuerit relictus, cum BOERHAAVIO mercurii dulcis usum, post peractam salivationem continuatum, et balnea vaporosa ex lacte parata commendat. Quamuis interim omnes in primis causae, quae mercurii per vasa iam rupta vel certe facile rumpenda effluxuri metum faciunt, usum eius impediunt: eum tamen in aegris scorbuto et rheumatismo potissimum affectis inuenire posse locum existimat, dummodo vasa adhuc satis robusta sint. Duos quoque aegros vera phthisi lueque simul laborantes ita curauit, ut capris daret mercurium, quarum lac illis aegris bibendum propinabat; quae omnino methodus, uti in infantibus, sic et in aliis aegrotis debilibus, esse videtur et tutissima et commodissima. Recte tamen censet, mercurium in omnibus prorsus exulare debere aegris, quorum morbi nervis inhaerent. Ad purissimum obtinendum mercurium, cuius in primis aliqua non numquam dari solet copia ad referendam aluum, destillationem cum sale alcalico aut limatura ferri institutam, commendat.
- p. 314. Quum mercurius quoque dulcis, licet ei addantur purgantia, fauces petere in tempestate frigida obseruetur, eum potius cum camphora combinatum aegris suis dedit sine ullius noxae aut salivationis metu, etsi in gelidissima extra domum ambulauerint tempestate.
- p. 334. Frusta lapidis ex marmorum genere, qui ophites vel serpentinus appellatur, si probe fuerint calefacta, abdomini flatibus distento saepius imponere solent mulierculae, quam tamen consuetudinem, quum fortius sese expandendi detur aeri occasio, Noster reprehendit eorumque loco vel cucurbitas siccas, vel



vel multo magis cereum candentem superque cum ollam aliquam minorem imponere iubet umbilico, qua, si ignis vi ad abdominis superficiem valide fuerit applicata, stupendam flatuum multitudinem expelli, inque tympanitide aegris insigne conciliari posse leuamen asserit.

Omnem attentionem mereri videtur observatio p. 389.

Cl. COTHENII cum Auctore nostro communicata. Quum enim aliquo abhinc tempore Postampii a canibus rabidis morderentur haud pauci homines, miseros hos iuuit celeberrimus ille medicus rasura cupri, panis frustulo, cui butyrum erat illinitum, inspersa et per tres continuos dies ipsis data, dummodo laesio nondum ante sex horas accidisset. Effectus illius remedii, alias iure reformidandi, per aluum, urinam atque saliuam, fuere conspicui sine noxiis aliquibus symptomatibus, nec in debilibus aegris obuenire visis; quorum quatuordecim illud adhibuerunt prophylactice, neque aliquam a morfu experti noxam; duo post morsum conualuere illius ope; in multis vero aliis sero nimis illud datum fuit. Ut dosin, qua heroicum hocce remedium porrigi queat, addere placuisset Cl. Auctori, iure omnino optamus.

Quod de oleo camphorae supra dixerat, illud et p. 404. iam de oleo myrrhae per deliquium siue eius liquamine monet, illud, uti et eius extractum aquosum, melius conuenire vulneribus, quam inde paratam essentiam, quum et resinosa et spirituosissima illorum oris atque fundo nocuum afferant callum. Eidem quoque extracto aquoso multas cum HOFFMANNO laudes tribuit, in suomet ipse expertus corpore phthisi olim affecto, si una nimirum illius drachma teratur cum sacchari uncia. Mensium quoque et lochiorum fluxum eo remedio et auxit et restituit, quare illud, ceu tutum, putredini resistens alimentorumque digestionem adiuuans, valde commendat remedium, praesertim si cum extracto corticis peruuiiani lactisque saccharo combinetur. Granu-

p.416. Granulis illis, Sagou dictis, in phthisi proficuis, parem viribus iure ponere videtur nostram farinam grossiorem ex zea et gramine mannae paratam; pul-tes autem farinaceas, quas aegris talibus commenda-re solent mulierculae, ut alimentum digestu difficile recte interdicat.

p.420. Viscum ab aliis vehementer laudatum, ab aliis vero prorsus contemptum, in sua praxi feliciter adhi-buit, eiusque pulueris drachmam semis omni triho-rio porrigendo ipsiusque decoctum simul adhibendo, duos miseros epilepticos a suo malo, cuius causam detegere non poterat, liberauit. Quatuor unciiis visci in puluerem redacti florumque poconiae mani-pulo uni sexaginta uncias feruentis aquae iubet infun-dere, admistis deinde huic decocto unciiis duabus sy-rupi poconiae.

p.436. Egregias, quas millefolium possidet, deprae-di-cando vires, decocti alicuius iniicit mentionem, cu-ius virtutem et ipse in suo corpore, quum vera olim laborasset haemoptysi subsecutaque pulmonum sup-puratione, et in aliis similibus aegris expertus fuit: Decoctum scilicet radicis graminis recentis valde sa-turatum infunditur feruens summitatum millefolii copiae; huius decocti depurati libris duabus corticis Peruuiani electi uncia additur una vel altera; postea-quam per duodecim horas steterit, decantatur, ad-ditoque syrupo myrtino simplici, aut melle, aut oxymeli simplici, dulcius redditur.

p.440. Ex corticis Peruuiani optimi libris duabus per frigidam cum aqua factam solutionem tres uncias se-mis extracti, ex illius autem uncia una per coctionem drachmas duas et viginti quatuor grana extracti ob-tinuit. Admodum eximias eius virtutes, quibus non elasticae tantum solidarum corporis partium vi, sed et alteri vitali dictae et a nervis oriundae, opitu-latur, extollit usumque determinat. Inter alia de puero quodam, cuius aluum alii medici nullis sol-  
uere



uere potuerant auxiliis, narrat, huius corticis usu  
eum quotidie nactum fuisse aluum apertam, quum  
proxima morbi causa in sola corporis debilitate posita  
esset. Eundem effectum in semet ipso et alui ob-  
structione et haemorrhoidibus laborante habuit.  
Tantam igitur apud ipsum meruit ille cortex gratiam  
fiduciamque, ut eo, propter pulmonum potissimum  
debilitatem, satis copiose usus fuerit, plus, quam  
duodecim eius libras assumerit indeque adeo con-  
ualuerit, ut nunc ex tribus integris annis nec pus ne-  
que sanguinem expuerit. In colicis quoque affecti-  
bus, tussi hypochondriaca et tympanitide clysteres  
cum eo coctos insigni cum leuamine applicandos cu-  
rauit. In gangraena virtutem eius ab Anglis vehe-  
menter laudatam, et ipse saepius cum fructu expe-  
riundi habuit occasionem; quo in casu singulis horis  
duos scrupulos deuorare partemque affectam solo  
eius decocto fouere iubet.

De agarico, cui validam sistendi sanguinem vim p. 457.  
in vulneribus artubusque potissimum amputatis tri-  
buunt recentiores, dubitat, num is per se illa gau-  
deat virtute, an sola compressione hunc edat effe-  
ctum? Ipsam autem fauciatorum vasorum diame-  
trum fieri breuiorem, contentumque sanguinem in  
verum cogi solere thrombum, a nobis nuper addu-  
ctum fuit\*.

Internum aluminis crudi usum reformidare vi- p. 479.  
detur, quem tamen contra colicam pictonum, ubi  
motus intestinorum peristalticus forte deficiens, vel  
nimis debilis, fortiori aliquo adstringenti remedio  
opus habere credi potest, a Cl. GRASHVUS feliciter  
fuisse adhibitum commemorauimus\*\*.

Flori-

\* Comment. nostr. Vol. III. Part. I. p. 59. et Vol. IV. P.  
IV. p. 630.

\*\* ibid. Vol. IV. P. IV. p. 632.

- p. 497. Floribus meliloti cum camphora durissimos et mammarum et testiculorum se resoluisse tumores narrat, praesertim si in posteriore casu, applicato suspensorio motuque corporis, quin et equitando, curam hanc adiuverint ipsi aegri.
- p. 515. Saccharum, quo candidius est, eo plus admistum habet calcis eoque minus mucilaginosarum partium, eoque etiam minus in primis viis augebit acrimoniam acidam. Hinc quoque fit, ut cum sale ammoniaco tritum, odorem spiret nullum; alterum vero eius genus album minus atque purum, ob calcem debilius adhaerentem, urinosum spargat foetorem.
- p. 573. Omnes a variis auctoribus susceptae opii correctiones a Nostro censentur inutiles, quum in vino meraciori illud solui facile, tum vero colari, additoque sale volatili cornu cerui, haud inepte sub laudani nomine usui seruari queat; ab illo autem sale, licet volatili, nec in febribus acutis aliquid mali metuendum esse per experimenta Cl. PRINGLE constat.





XV.

Observations sur l'histoire naturelle sur la physique et sur la peinture avec des planches imprimées en couleur année 1752. Tome second, à Paris, chez de la Guette. 4. maj. i Alph. i pl. Tab. aen. 14.

i. e.

Obferuationes ad historiam naturalem, physicam et artem pictoriam pertinentes cum tabulis viuis coloribus expressis. Tom. II.

**D**e tomo primo harum obferuationum et instituto Cl. GAVTIER alibi diximus \*, nunc et huius tomi in tres partes distributi, praecipua capita indicabimus, numeri vero obferuationum cum praecedenti cohaerent.

In parte quarta ad historiam naturalem refertur.

*Obs. 18. Quae descriptionem uteri duplicis a Cl. E I- p. 3.*

SENMANN propositam repetit, tabulam secundam viuis coloribus depictam sistit additis simul conspectariis a citato Auctore expositis, quarum summam iam olim exposuimus \*\*.

*Obs. 19. Proprias Cl. GAVTIERII animaduersiones de ranarum generatione continet. p. 11.*

Ranas plurimas eo tempore, quo genus propagant, dissecut. In feminarum ouis fatetur nihil se reperisse; maris vero abdomen aperiendi narrat vesiculam pellucidam, se obtulisse faciebus diuersimode inclinatis, ut adamantes poliri solent, splendens, (*taillée en facettes*) p. 14. aqua viua crystallinae puritatis plenam, in duos lobos satis distinctos separatam, ossi pubis incumbentem,

\* vid. Comment. nostr. Vol. II. Part. II. p. 254. seqq.

\*\* vid. Comment. nostr. Vol. II. Part. I. p. 24. seqq.

tem, ut adeo locum vesicae urinariae in hominibus occuparet. Circumdatus erat ramis arteriarum, quae per superficiem eius discurrerant, funiculo autem crassiore distincta, quam similis vesiculae feminarum; funiculus hic velut placenta erat embryonum plurimorum, prope cor filis exiguis funiculo huic iunctorum, in aqua illa limpida, de qua modo dictum est, natantium, agitationibus extraordinariis semouentium, caudis se mutuo ferientium; a funiculo vero, qui illos tenebat, seiungere se non poterant. Exsultans gaudio, dum haec videbat, GAVTIERIVS omnes, quos poterat, aduocauit, maluisset terram omnem aduocare, ut de tam nouo, tam incognito, tam extraordinario phaenomeno testimonium ferret, quo omnes conuinci possent, qui de veritate priorum suorum experimentorum dubitarunt, quoniam repetere ea non potuerunt\*. Quid enim ulterius quaerendum est, post embryones viuos, distinctos, et nudo oculo noscendos, in masculo repertos. PYTHAGORAM addit, inuentum hoc alia hecatombe celebraturum fuisse. GAVTIERIVS vero quum quinquaginta ranarum paria disseuissse se scribat, credimus hanc hecatomben ei sufficere posse. Ceterum miramur, cur, qui terram omnem testem inuenti anatomici optauerat, idem, quod poterat tam egregie, arte sua illud oculis omnium hominum non clarius exposuerit. In figuris enim ranarum apertarum, quas addit, non satis distincte haec, quae fidi ex eo transtulimus, comparent. Figura prima fetum ranae microscopio auctum exhibet, embryones autem illos nihil ab illis ranarum laruulis, quas circumnatare in paludibus sub veris initium videmus, differre antea dixerat, neque de hac figura dicit, an natam iam ranulam, an unam

p. 13.

p. 22.

ex

\* Loquitur sine dubio de illis, quae recensuimus in Comment, nostr. Vol. II. P. II. p. 257.



ex illis, ad quas adeo obstupuit, repraesentet. Fetus certe appellat, non embryonem, et filum illud, quo embryones sui funiculo adhaeserant, non depingit. Figura secunda anastomoses venarum et artiarum in fetu exhibet; tertia et quinta intestina quaedam et inter haec vesicam illam aqua plenam, et vesiculas feminales vix conspicuas; quarta et sexta ranas utriusque sexus apertas, et in mare quidem figura sexta vesicam aqueam profunde separatam, ut duae fere vesicae videantur, infra hanc autem ossi pubis adiacentes vesiculas feminales, illas, quas embryonibus plenas vidisse se adserit. Nobis autem volupe fuisset has ipsas vesiculas apertas et embryones in illis, qui tam egregie nudo oculo patent, agitados, illorumque cum funiculo illo nexum spectare; nam ceterum ranis abdomen forfice aperire ipsi pulcre nouimus. Miramur praeter ea tanti momenti obseruationem de unica saltem rana Nostrum referre, et nullibi indicare, quod illam repetierit, qui tamen antea quinquaginta paria immolauerit. Nisi forte sat sanguinis fufum credidit, aut post hoc ranicidium nullae amplius vagantes liberis paludibus fore. Ceterum si Gallus a Germano homine aequo pictore, aut vellet proficere aut posset in obseruationibus circa ranas et alia similia solliciti instituentis, et ita, ut fidem inueniant, enarrandis, ROESSELLII diligentiam GAVTIERIO commendaremus\*.

Inferitur hic iudicium de Cl. EISENMANNI p. 15. coniectariis circa superfoetationem, cum enim hic delineationem foetus in ouo assumat, spurios uteros ex dilatatione partis tubae Fallopianae hunc oui transitum ex ouariis per tubam ad uterum certum reddere affirmat; monet vero Noster delineationem in ouo inde non probari, quoniam embryo humanus, etiam ex utero in tubam adhuc dilatatam ascendere queat. Plura non addimus, cum casus superfoetationis post

\* vid. Comment. nostr. Vol. II. Part. I. p. 85. seqq.

ea diiudicatus, a nobis paulo ante \* ut falsus indicatus fuerit.

- p. 16. Figurae, de quibus diximus, ad observationem vigesimam pertinent, *anatomiam ranae tradentem*. Ex ea, quod ad rem praesentem facit, hoc saltem adducemus, verba ipsa Auctoris vertentes: *Vesica urinaria maris recto intestino adhaeret, et quidem fortiter; cum veneri operam dant animalia haec, aqua limpida, quam observavit, Auctor, plena est, ubi natant embryones, funiculo, ut dictum est, adhaerentes*. Atqui in Fig. 4. lit. M. *vesiculas seminales* depingit, unde exeunt embryones et ubi adnexi sunt, qua autem via ex his vesiculis in aqueam illam aut aqueas, nam duas Fig. 4. lit. L. nominat, perveniant, et quo modo vesiculis seminalibus adnexi sint, quos funiculo, qui crassior, maris vesiculam magis separaret feminae vesicula, adnexos dixerat, nos non intelligimus, ut picturae, quae lucem mutuari sermoni debebant, obscurare illum videantur.
- p. 23. *Obs. 21. Bombyces quo modo per naturam multiplicari et opera hominum carere possint docet, si scilicet moris ipsis imponantur, mori autem rete quodam obducendi sunt, tum ut tutiores ab auibus sint vermes, tum ut delapsi adscendere rursus possint; nam ex quingentis bombycibus, quos ex ouis mille in moros repositis, exire vidit Noster, quinque tantum sericum in papiliones abituri texuerunt, reliqui omnes perierunt, nulla alia causa, quam quia delapsi adsurgere rursus non potuerunt.*
- p. 25. *Obs. 22. Descriptio plantae Ginseng legitur, qualis iam 1718 in commentario, a Cl. LAFITAV, P. Soc. Jesu, missionario, edita fuerat. Planta vero vivis coloribus depicta additur: GAVTIERIVS enim illam aliquoties in Hispania pinxit, ubi botanophili can-*

\* pag. 107.



eandem colunt; in horto regio Parisino educari nondum potuit \*.

Observationes hae ad historiam naturalem pertinent; sequuntur physicae et harum numerus prioribus physicis additur.

Quarta observatio *philosophiam veterem et novam* p. 34. eo potissimum fine, ut locum suum inter patres philosophiae recentioris, proxime post NEWTONVM et LEIBNITIVM, GAVTIERIVS sibi vindicet.

Quinta *electricitatis causam ex radiorum solarium* p. 48. *impulsione* explicat, simul *remedium fulminum auertendorum* examinat. Credit, etiam si duci per baculum ferreum et catenam fulmen in puteum forte quendam posset, tamen resiliendo hinc plus damni dare posse, quam si in aere libero fuisset explosum.

Sexta observatio Cl. RICAUD *de visione sententiam* p. 52. refellit; crediderat obiecta in fundo oculi erecta apparere, quia camera obscura, nudo foramine instructa, euertit obiecta, lens autem idem facit, ut sic humor crystallinus inuersum rursus inuertat. Sed de his an opus est plura intelligentibus dicere?

Iam ad disceptationes philosophorum et artificum p. 57. recentiorum delabitur. Primo auctoribus diarii Verdunensis respondet, quem articulum huius quidem capitis *sexturn* appellat. Septimo GUYOTI eius, qui p. 59. de floribus variegatis commentatus fuerat \*\*, epistolam ad se exhibet etiam defensoriam.

Vltima sectio est, *de artium secretis et nouis re-* p. 60. *pertis*. Docet hic vitra coloribus picta, ignire, fur-

I 3

norum

\* Plantae, in horto Collinsoniano florentis, iconem egregie pictam, exhibuit I. L. TREW, in plantis selectis, ab EHRET pictis, Dec. I. tab. V. ubi et varietas additur. Vid. Comment. nostr. Vol. I. Part. II. p. 332.

\*\* vid. Comment. nostr. Vol. II. P. II. p. 262.

norum constructionem et ignis regimen dilucide explicans, deinde chartae coloribus variegandae (*marbrer*) methodum exhibet.

- p. 63. In quinta parte ad historiam naturalem spectat
- p. 65. *Obs. 23.* Quae *structuram muscoli* exponit. Opus posthumum est Cl. DUVERNEY Anat. Prof. Parisini. Tradit ille descriptionem fibrae muscularis, porro musculos ex fibris compositos considerat, et cum in fibra musculari partem mediam carneam cum tendineis extremis non in linea recta decurrentem, sed in utroque fine ad angulos alternos appositam statuatur, in collectis musculis idem attendi debere monet, ideoque mechanismum actionis in variis musculis in primis in deltoideo describit, et de differentiis motus muscularis non nulla addit. Praeter musculares massas ossibus affixas etiam fibras passim in visceribus deprehendendas assumit, has vero in arteriis non concedit, sed easdem ab impulsu sanguinis a corde, et renisu fibrarum mere elasticarum moveri asserit.
- p. 73. *Obs. 24.* Ab eodem Auctore est et in *vim musculorum* inquit, quatenus ea a dispositione in variis partibus augetur, quamobrem mechanismus in non nullis musculis in primis cubiti et maxillae sigillatim declaratur, et ex vectis theoria exponitur.
- p. 75. *Obs. 25.* De *motu musculorum* idem Auctor agit, et quatenus vel fluidum nervicum tantum vel sanguis simul in hoc motu praestando concurrant disquirat. Recenset ideo WILLISII et MAYOVII sententiam et ex hypothesei BERNOVILLII declarat, quo modo fluidum nervicum in moleculas sanguinis agat, et aërem conclusum liberet, quo se extendere et musculi caua minutissima implere queat. Cum vero haec ipsa explicatio ei non omni ex parte satisfaciat, alteram sententiam de spiritibus animalibus in vesiculas musculi introductis proponit, quoniam vero contractiones musculi cum chorda humectata pondus trahente



hente comparat, illas simili quidem modo, sed celerius longe fieri posse asserit. Vti itaque musculo nutritionem praebet sanguis, sic motum nervus praestat. Pergit inde Cl. DUVERNEY in hac re magis euoluenda atque declaranda, et cerebrum quidem ut fontem fluidi nervos mouentis considerat, animae vero directorium motuum in antagonismo musculorum tribuit. Lassitudinis causas duas exponit, scilicet defectum fluidi in cerebro, vel, si adhuc adesset fluidum, pororum per quos transit, et sensim sensimque euaporat dilatatio, unde fiat, ut ad motum continuandum plus fluidi requiratur. Prior causa debilitati conuenit, altera tamen lassitudini magis propria est. Ex paucis hic indicatis cognoscimus tractationem iam olim elaboratam cum inuentis et obseruatis recentiorum collatam non fuisse, ipseque Auctor in fine difficultatem explicationis agnoscit.

*Obs. 26. De circulatione spirituum animalium, et p. 86.*  
*de particulari cerebri et cerebelli anatome agit Auctore*  
 Cl. GAVTIER. Pedunculos cerebri ab anatomicis dictos radices trunci medullaris, medullam oblongatam truncum medullarem, nervos ramos medullares et medullam spinalem ramos coniunctos trunci medullaris dici debere noster asserit, et inde fictam quandam comparationem cum plantis instituit. Hanc tamen ad explicandum suum assertum non urget, sed postquam variis argumentis declarare annisus fuit, materiam ignis et electricam inter se conuenire et fluidum nerueum idem esse, nunc fluidum hoc ex cerebello per nervos ad actionem musculorum praestandam progredi, in reactione vero per easdem in nervis regredi, et tunc non in cerebellum, sed in cerebrum reuehi, cuius quidem medullares fibras crassiores, illas autem cerebelli tenuiores assumit. Vere itaque Auctor, ut ipse urget, nouam produxit sententiam, sed ex aliis, iam dudum per vera phaenomena confutatis, inter se iunctis, minus forte probabilem

bilem redditam, ut ex iis, quae breviter a nobis indicata fuerunt, et magis adhuc ex attenta totius tractationis peruestigatione patebit. Ne vero quis credat, nos durius iusto iudicium tulisse, transcribamus tantum unicam et ultimam tractationis particulam. *Addere possum, inquit Noster, cerebrum post ea in cerebellum per plexum choroideum particulas ignis remittere, quas a distensione nervorum receperat. Et porro: Assumi omnino potest animam regressum spirituum e musculis in cerebrum, qui alias continuus est, in uno vel altero musculo contrahendo, cohibere, et eo momento quoque eos spiritus, qui ex cerebello ad musculum abeunt, vehementius impellere.*

p. 91. *Obs. 27. De venaesedione et aneurysmate inde oriundo agit. Hac igitur occasione curationis aneurysmatis per eam causam inducti, et a Cl. FAGER curati, breviter exponit Cl. GAVTIERIVS; curationis enim rationes in scriptis Academiae Chirurgorum parisiensis expectamus; in duabus tabulis autem et vasa arteriosa et venosa brachii, et tumorem aneurysmaticum, et machinas in curatione adhibitas delineatas conspiciamus.*

p. 94. *Phyfica observatio VII. de mundi creatione et diluvio agit, simul Cl. DE MAILLET librum, qui nomine Auctoris anagrammate Telliamed celato prodiit, examinat, et additur tabula piscem petrificatum exhibens.*

p. 107. *In disceptationibus philosophorum et artificum modernorum declarandis*

*Artic. VIII. De Lithotomia agitur et de apparatu magno et alto differit Cl. CHAIGNEBRUN, ostendere nimirum annititur apparatus magnum praeter laterali habere sua commoda immo et altum apparatus rite administratum non reijci posse.*

Inter



Inter noua inuenta et secreta artium primum lo- p. 111.  
cum

Artic. VIII. occupat, *machina hydraulica* a Cl. VILLENEUVE inuenta, quae aquam in duobus tubis attollit singulis a singulis extremis vectis pendentibus, qui ita se habet, ut homo super eum exspatiari et alterutrum eius extremum deprimere queat, tubi vero pluribus valuulis instructi sunt.

Artic. IX. Epistolam ad Cl. GAVTIERIVM ex- p. 113.  
hibet, qua *methodus musicam artem insigni cum facilitate docendi* promittitur.

Artic. X. Examen *anatomicum cadaueris foeminae* p. 115.  
*Supiot* exhibet, quam Cl. MORAND in scripto quodam publico exposuerat, et varia quidem hunc casum emollitorum ossium illustrantia adiecerat. Licet vero nos iam alia occasione praecipua quaedam momenta indicauerimus \* tamen non nulla ibi non exposita hic addere necessarium esse deprehendimus. Ossa tibiae et alia cylindrica ossa emollita, ex parte destructa et facile comprimenda erant, cartilagines autem nullam passae erant mutationem. Ossa humeri et reliqua extremitatis superioris volumine multum imminuta erant, et licet in longitudinem distendi possent, post distensionem tamen iterum contrahebantur. Phalangae digitorum vix mutatae videbantur, tactui tamen cedebant et flecti quasi poterant. Peluis angustatus ossaque ileum contracta erant; spina dorsii rite quidem conformata, sed mollis reperiiebatur. Sternum et alia ossa spongiosa v. c. patella densa satis videbantur, facile tamen in partes scindi poterant. Ossa cranii multum quidem emollita et scalpello facile

I 5

discin-

\* Idem casus est, quem ex Transactionibus Anglicis. Vol. XLVIII. Part. I. no. 4. p. 26. nomine *Annae Elisabeth Queriot* indicauimus, mariti enim nomen *Supiot* erat. vid. Comment. nostr. Vol. IV. Part. III. p. 384.

discindenda erant, licet duplo crassiora apparerent: ex iis compressis succus aquosus stillabat.

p. 118. Adduntur porro Cl. MORAND animadversiones de natura et causa huius morbi. Ab aliis iam observatoribus in scorbuticis et venereis ossa mollia deprehensa fuerunt. In nostra aegra nulla venerei morbi erant indicia, suspicio tamen medicamentorum mercurialium assumptorum, cum vero morbus nec rachitis nec venerea lues dici queat, ad scorbuti quandam speciem omnio referenda erit. Aegra ab infantia congestionibus serosis maxime obnoxia, cephalalgiam, ophthalmiam humidam, surditatem, dentium dolores, gingivarum tumores, fauces aphthis scatentes, somnum minus tranquillum saepius experta fuerat. Respiratio brevis et anxiosa, asthma convulsivum palpitantes cordis, lipothymiae frequentes, appetitus et digestio laesa, colici dolores et borborygmi, urina putrida cum sedimento albo vel cinereo, dolores vagi in toto corpore et praecipue spina dorsali, lassitudines spontaneae, pruritus continuus cutis, pedes oedematosi, scabies a contagio, et hac sanata, ulcera crurum, fluor albus et alia symptomata crebrius in hac aegra observata fuerunt, ex quibus omnibus cacochymiam scorbuticam colligere possumus. Assumit itaque Noster ad ossium mollitiem morbosam explicandam assertum Cl. COVRTIAL, qui in succo nutritio ossium morbofo causam quaerit, et dissolutionem nimiam sanguinis eo facere contendit variaque de acrimonia sanguinis et humorum proponit. Nullus quoque dubitat Noster, grauissimum hunc morbum curari posse, dummodo signa detegantur, quibus initium morbi definiri queat, in augmento enim et summo gradu morbi vix medela affertur. Balnea ex alumine sulphure et vitriolo \* vel usus etiam

\* Mollitiem ossium a PETRO ASSELINAEObseruatam, et balneo frigido ex sulphure, alumine, vitriolo



etiam internus horum medicamentorum forte suaderi possent, usum quoque herbae vermicularis, quae sedi species est, non incongruum fore, Noster asserit.

Cl. GAVTIERIUS in nota addita monet aegram nostram abusu salis communis haec incommoda sibi contraxisse, quam rem tamen in posterum se explicaturum esse promittit.

Artic. XI. A Cl. VILLENEUVE noua machina p. 123. semini proiiciendo apta describitur et icone illustratur.

In parte sexta ad historiam naturalem referuntur.

Obs. 27. In qua de principio motus in foetu differit p. 129.

Cl. GAVTIER, num cerebrum, an cor prima motus causa existat? Videtur Noster cerebro partes tribuere, licet hoc non citius agere possit, quam omnia ad circulationem in embryone incipiendam disposita sint. Ab his ad differentiam viuiparorum et ouiparorum animalium declarandum ducitur, et cordis fabricam methodo satis nota describit.

Obs. 28. De pulmonis humani fabrica et usu idem p. 133.

differit, et ad lobulos et vesiculas huius visceris potissimum respicit, MALPIGHII et HELVETII asserta prae reliquis recensens. Ipse vero his praemissis suas de anatome minimarum partium huius visceris obseruationes exponit et inde usum definire tentat. In diuisionibus bronchiorum usque ad lobulos continuatis, glandulas detexit coerulescentes, sensim magnitudine decrescentes, orificiis suis in cauum bronchiorum hiantes, has ita cum capillaribus vasis pulmonum communicare asserit, ut separatio partis pituitosae ex sanguine per pulmones transeunte, illis adscribi queat. Hinc sputum viscidum ex pulmonibus

triolo et sale gemmae curatam adducit. G. H. WELSHIUS Obs. Med. Epifagmata centum. Obs. 82. p. 53. exstat cum M. A. SEVERINI Seilo-phlebotome castigata. Hanouiae 1654. 4to.

bus massam sanguinis in venis reducendi imminuit eiusque colorem mutat. Porro arterias pulmonales tunicis tenuioribus praeditas inuenit quam venas, cum quibus anastomosi iunguntur, hinc aër et ignis ad calorem et fluiditatem sanguinis praestandam ingredientes non nisi arterias penetrant. Ad considerationem aeris post ea progreditur, et varias conclusiones respirationem spectantes elicit. v. c. Crassum aerem impulsu suo dilatationem pulmonum efficere, simulque vehiculum esse aeris subtilioris in lobulos ducendi, in quibus compressio pulmonum tenuissimas aëris et ignis particulas in arterias capillares impellit, reliquis crassioribus per expirationem sub vaporis forma diffatis, cum vero arteriae capillares ampliores sint, quam venae, cum quibus anastomosi iunguntur, in ipso motu circulationis serosae particulae expelluntur, ideoque sanguis in gratè rubrum colorem mutatur. Volumen itaque sanguinis per secessum crassiorum particularum imminuitur, licet particulae magis dilatatae in venis capillaribus regrediantur et aere et igne accedente magis agiles reddantur. Quousque hae experientiae et asserta vera sint, et an conclusiones inde fluant aliis diiudicandum relinquimus.

p. 138. *Obs. 29. Usus vasorum lymphaticorum in mesenterio, et porro eundem venae portae proponit. Prior tractatio nihil noui continere videtur, altera igitur breuissimis indicanda est, licet praeuideamus, nos obscuras Auctoris ideas non assequi posse. Ratione enim usus venae portae non consentit cum iis, qui sanguinem ex visceribus abdominalibus refluxum ad bilis secretionem praestandam necessarium esseasserunt; assumit potius glandulas biliaras ex sua fabrica bilem secernere, cuiuscunque indolis sanguis eo deferatur. Nouam itaque proponit sententiam. Mesenterium, nimirum, pancreas, lienem et epiploon quatuor liquores diuersos praeparare, ad mitigandum chylum in intestinis elaborandum dispositos. Naturam et*  
vias



vias horum liquorum non tangit Noster, sed pergit, ex fermentatione diuersi sanguinis resoluti incommoda orirentur varia, nisi quatuor illi liquores in venam portae deducerentur, sed primo impetu et sine praeuia praeparatione in venam cauam immitterentur. Vena portae potius hos liquores in hepate diffundit, cum sanguine arterioso miscet, in glandulis hepaticis et biliaris praeparat et sub apta hac modificatione per venam cauam ad cor reducit.

Obs. 30. De auibus carniuoris agit: Sperare iubet p. 140. Cl. GAVTIER auium seriem pictam, cui fini, quas collegit Ill. DE REAUMUR, ipsi commodabuntur; iam imagines coloratas edit Buteonis, Buteonis apriuari, Milui aeruginosi, Lani minoris Molucarum, Franci Galbuli masculi; ita enim nomina illorum exhibet, non citatis, qui hoc modo nominarint. Breuem singulorum descriptionem subiungit.

Addit Ille, esse sibi methodum, animalium et p. 144. plantarum figuras, partibus, quae componi et se- iungi possunt, ut typi, quibus ad libros utimur, imprimendi. Hanc methodum parum impensarum postulare, elegantia vero et exactitudine nihil reli- quis methodis cedere.

Physica obseruatio octaua ostendere conatur resisten- p. 145. tiam fluidorum calculo non subiacere, quo fine propo- sitiones quasdam libri Ill. D' ALEMBERT, *Essay sur la resistance des fluides*, sub censuram vocat, non fe- licius, quam NEWTONI optice, adgressus est.

Obs. 9. de causis graduum diuersorum caloris in p. 151. atmosphaera nostra est Cl. DE V\*\*. Summa eo re- dit, ab aere ipso lentis causticae modo radios solares uniri, diuersis gradibus pro diuerso solis ad hanc vel illam atmosphaerae partem situ.

Picturae obseruatio quinta est in librum quendam p. 159. Marchionis D' ARGENS, *Reflexions critiques sur les*  
disse-

*differentes ecoles de Peinture*, contra quem Noster praestantiam antiquorum, non sculptorum saltem, sed et pictorum tuetur, multaque ad has artes egregie facientia adducit.

p. 170. Alia observatio, quae etiam *quinta* dicitur, est Cl. PAPILLON, *historiam artis figuras ligno incidendi* tradens, simul multa ad typographiae historiam pertinentia continens.

p. 183. *Philosophorum et artificum disceptationes* unicum articulum continent, neque illum integrum; animadversiones in Cl. FREZIER *hypothesin de terrae motibus*, qui illos a circulo aquarum subterraneo deducit. Adducuntur variae observationes motuum terrae.

## XVI.

De senio eiusque gradibus et morbis, nec non de eiusdem acquisitione tractatus, auctore IOAN. BERNHARDO DE FISCHER, Med. Doct. et quondam Russiarum Imperatricis Annae gloriosae memoriae personae medico, et per Russias res medicas dirigente Archiatro. ut et Acad. Imper. Natur. Curios. Collega. Praemissa praefatione ANDRAE ELIAE BÜCHNERI, Imperial. Acad. Nat. Curios. Praesidis. Erford. impensis Io. Frid. Weberi, 1754. 8. pl. 17½.

Qui ab Ill. Auctore eum in finem conscriptus fuerat, praesens, quem indicamus, tractatus, ut academiae naturae curiosorum, cui socius erat adscriptus, legibus suoque fieret officio satis, cum Cl. BÜCHNERI opera editum fuisse sciendum est, siquidem ampla eius, notatu autem digna pertractatio, maius, quam quod disquisitionibus dictae academiae destina-



destinatum est, expleret spatium, nec in partes distributum commode edi poterat, quae est prodeuntis integri tractatus ratio.

In praefatione, quam ipse Ill. Auctor suae pro-p. 7. posuit explicationi recte quidem affirmat: *Quicquid vivit cum corporis vigore et incolimitate diu vivere optat, mortem enim, corporis destructionem odit, quicquid vivit, natura ita iubente*: multa tamen sunt, quae huic vitae continuationi aduersantur, quum et ipsum summum numen non omnem singulis animantibus aequae longam esse vitam voluerit. Narrantur quidem longaeuorum prae hominibus animantium varia exempla, quae vero ex parte certioribus confirmanda esse observationibus arbitramur, in primis, quum morborum in illis absentiam ex fibrarum et sanguinis p. 8. firmiore compage non absque exceptione, quod Cl. Auctor vult, deducendam esse putemus, cum nos in plerisque animalibus horum natura, integritas, vita sana, morbi et mors, lateant. Firmiori forte veritatis fundamento superstructum est illud, quod inter homines feminae frequentius annis antecedant mares; hoc ipsum tamen auctor magis de annis grandaeuitatis, quam longaeuitatis verum esse adseuerat, et ex ephemeridibus demortuorum, ubi exempla longaeuorum enarrantur, euincere studet, unam tantum feminam centenariam demortuam ibi indicari, ubi decem mares, eiusdem, vel prouectioris etiam aetatis, obiisse feruntur. Corpora feminarum p. 9. firmius esse constructa ac virorum, non solum ex externa femorum forma, sed ex ipsa interiori fibrarum structura, quae, licet sint tenuiores, firmiore tamen connexionem et maiore multiplicatione, subtilitatem hanc egregie compensare contendit auctor: recte autem simul innuit, tale robur machinae feminae non de omnibus generatim, sed de iis tantum intelligendum esse mulieribus, quae laboribus improbis et aliis exercitiorum generibus corpus in iuuentute

p. 10.

tute firmarunt. Vt graue quoddam testimonium  
 sententiae suae addat, prouocat porro ad motus istos  
 vehementes, quos conuulsuos vocat, quibus femi-  
 nae prae viris frequentius mire et misere torquentur,  
 horumque causas in differente sanguinis crasi et  
 fibrarum structura haerere credit. Huic adserto an-  
 nectit aliam adhuc rationem, pro comprobanda ma-  
 iore elasticitate fibrarum corporum mulierum, quia  
 negotium catameniorum ex massa sanguinea, sub  
 qualibet excretionem exaestuante, oriri sibi persuadet;  
 et ex grauiditate, in qua etiam omnimoda vasorum  
 uterinorum repletio contingit, neque tamen disten-  
 sione hac, et facta deinde euacuatione, fibrae mo-  
 trices uteri in tono naturali ullo modo debilitari, sed  
 exerceri potius hac vicissitudine alterna, et fortius  
 roborari. Non autem partes solidae feminarum hoc  
 singulare robur tantum habent, sed sanguis earum  
 magis compactus et oleosus ab Ill. Auctore creditur,  
 ideo, quod cadauera demortuarum si comburuntur,  
 lucidiore igne flammam alant, ob humores, quibus  
 gaudere debent, pinguiore. Ponamus, hanc opi-  
 nionem, quam iam recensuimus, esse veram: certo  
 exinde subsumi posset, prout fecit Noster, hanc tem-  
 periem sanguinis feminarum oleosam, multum eos  
 iuuare ad declinandos morbos seniles praecoces, ubi  
 fibrae nimis rigidae et exsuccae, resistunt nutritioni  
 sufficienti. Porro experientiam testem citat, non  
 tam frequenter laborare feminas morbis senilibus, ac  
 potior sexus, si tantum modo annos istos, qui se-  
 quuntur proxime post fluxum mensium interceptum,  
 sine grauioribus incommodis superauerint feliciter.  
 Omnis autem hominum aetas, prae primis senium,  
 variis expositum est molestiis atque aerumnis, quibus  
 decrepiti consumerentur certissime, nisi subueniret  
 illis sedula honorum cura atque prouidentia benigna.  
 Aequum est senes impotentes fouere et nutrire, praes-  
 fertim eos, qui honesto vitae genere transacto, cani-  
 tiem



tiem venerandam gerunt. Sed quinam sunt, quos senibus annumerare debemus? utrum isti tantum, qui per multos annos integra sanitate nec imminutis viribus vixerunt, an isti, qui mediocri annorum serie exacta, aerumnas varias, valetudinem aduersam puta et debilitatum corporis sui robur iusto citius sentiunt, cum plenaria impotentia labores hominum perficiendi. RIVERIUS, celebris olim medicus, in institutionibus suis senectutis annos in tres subdivisit partes: nempe in *senectutem primam*, quam ab anno quinquagesimo ad sexagesimum usque extendit, in *aetatem ingrauescentem* ab anno sexagesimo ad septuagesimum, et tandem in *decrepitudinem* a septuagesimo anno ad vitae finem. Non tamen ab annis solum, sed potius a decremento virium, si illud in corpore sentitur, exordiendum esse senii stadium, multi medici statuunt: inter hos, prae reliquis nominandus est FLOYERUS, qui in *medicina Gerocomica* illud post annum quinquagesimum utplurimum fieri, experientia consentiente, comprobat. Nec illum annorum decursum, secundum quem, imminutio virium in hominibus post quinquagesimum annum oriri necessario statuitur, ceu perpetuum agnoscit, cum saepius, sexaginta annis exactis, homines hu-  

p. 14.

ius aetatis, non senes, quin potius in iuuenum adhuc vigore constituti conspiciantur, et alii, antequam hunc attingunt annorum numerum, nempe quinquagesimum, fractis viribus et naturali robore deiecto, accensendi sint vetulis. Adsumit Ill. Auctor ipsam senii vocem pro fundamento diuisionis aetatis ingrauescentis, et credit senium, proprie dictum, ab annis decies senis expletis originem trahere. Hi itaque tantum, quibus concessum est a benigno creatore adspirare ad annum sexagesimum, dicendi erunt senes. Tempus illud intermedium, quod effluit inter annum quinquagesimum et sexagesimum vocetur *senescens aetas*, senium porro, ratione durationis

Tom. V. Pars I. K quoque

- quoque variat: aliud est breue, aliud longius extrahitur: hinc enata est triplex senii ipsius, antea definiti, ulterior explanatio. Ad computationem Cl. Auctoris *primum senium* incipit ab anno sexagesimo duratque ad septuagesimum: alterum stadium, quod percurrunt mortales post septuagesimum, compellat *grandaevitatem*, illiusque limites ad nonagesimum usque prorogat; si ulterius, absolutis prioribus, procedit homo viuendo, tunc *longaevitatem* attigit, hancque termino incerto ultra centum annos et amplius
- P. 15. definit. Secundum hanc diuisionem iam propositam in opere ipso primo senes grandaeui et longaevi, et quid in illis singulare obseruatum fuit, ab eo considerantur; progreditur tum ad morbos senii ipsos, hosque historiis fide dignis, ex auctoribus probatis, maxime ex ephemeridibus naturae curiosorum et ex suo enchiridio desumptis, illustrat; et tandem proponit ista, quae ad senium longum acquirendi creduntur profutura. Haec in praefatione habentur.
- P. 18. Disquirat sub initium ipsius tractationis, quae nam regiones in Europa alant longaeuos? Testimonium VERVLAMII, in *historia vitae et mortis* adducit equidem, in quo perhibet iste: Hiberniam et Britanniam cum insulis Orcadibus et Hebridibus continere plures longaeuos, cum vix in Britannia reperiatur villa, in qua non viuat mulier vel vir octogenarius: hi tamen senes, ad mentem Auctoris, non longaevi, sed grandaeui tantum adpellandi sunt, licet non neget, inueniri quoque in Britanniis longaeuos tales, prout is hoc stadium senii definiuit, aequae ac in aliis regionibus conperiuntur. Adducit ex relatione epistolica, quam accepit olim, pro comprobanda veritate senem piscatorem Archangopolitanum centum et quatuor annos natum, alacriter adhuc opus suum perficientem; cui adiungit Lappone, vitam suam pauperrimam ultra centum annos
- P. 19. producentem. Dantur itaque in regionibus frigidissimis



simis quoque longaeui: parciolem tamen eorum esse numerum ibi, ac in Germania et vicinis huic regionibus ex annalibus medico-phylis Vratislauiensibus cognouit. Quis unquam dubitat inter Batauos et Pannones degere longaeuos, cum ante aliquot lustra in Hungaria mortuus est Petrus Czartan, postquam centum et octoginta quinque annos viuendo compleuerat. Vt nostram interponamus hic sententiam, firmiter persuasi sumus, in uniuerso terrarum orbe reperiri longaeuos, cum communis corporum structura et ratio vitam conseruandi data sit omnibus hominibus a natura: deficiunt nobis tantum relationes copiosiores; et ignoraremus etiam longaeuitatem Brasilianorum, nisi PISO et MARGGRAFIUS illam nos docuissent in historia naturali Brasiliae. Paucis tantum verbis, secundum Auctorem, adhuc mentio p. 22. facienda erit Chinenlium et Calmuccorum, quorum vitae genus insimul enarrat, quibus nos adiungimus Cosaccos vagos: inter quos non exiguum numerum longaeuorum conspici, certum est. Specialem quo- p. 25. rumdam obseruationem, cuius meminit Ill. Auctor, hic etiam omittere non possumus, quod illi prae aliis longaeui fiant mares, qui ex temperamento et habitu corporis materno similitudinem habent prae illis, qui habitui patris magis accedunt: sed posterior aetas addet obseruato huic pondus experientia repetita. For- p. 26. mam deinde senum, tam externam, quam internam, et quid in ea immutatum repertum sit, ex dissectionibus horum copiose refert, nec non propriis obseruationibus confirmat. Considerat etiam p. 62. mutationes actionum, tam vitalium, quam sensuallium, nempe respirationem et motum cordis: porro actionem ventriculi et exinde pendentem nutritionem, excretionem omnes, aluinam, renalem, atque cutaneam. Qualis sit differentia inter somnum senilem et iuuenum, itidemque inter vires generandi diuersarum aetatum prolixè satis exponit. Deuenit, p. 78. postquam

- postquam haec excussit, ad mutationem sensuum internorum et externorum; et singulas partes, per quas sentimus, quibus mutationibus tangantur, ordine commemorat. Si curatius perpendimus actiones et consuetudines senum, confiteri saepius cogimur, illos repuerascere: hinc etiam occasionem arripuit Ill. Auctor, comparandi utrorumque mores, et probatum dedit postea, senes bis pueros fieri, ob similes adfectus animi et morbos, utrique aetati fere communes. Regimen senum, quod tenuere boni, antequam ad id fastigium aetatis adscenderent, nunc explanat, una cum pessimis moribus eorum, qui, p. 88. spretis omnibus regulis et cautelis, ad longaeuitatem acquirendam alias necessariis, nihilo secius tamen senium impetrarunt. Annorum climactericorum considerationem, an ad aetatem senilem, vel augendam, vel praescindendam aliquid valeant, dispicit, et commento huic antiquorum ex ratione nihil tribuit. p. 93. p. 102. p. 108.
- p. 109. Ex his fluunt, quae capite secundo proponuntur, regulae therapeuticae. Diuisionem senii, superius a nobis indicatam, retinuit et hic in enumerandis morbis, quibus premuntur decrepiti, et eos, in morbos capitis, thoracis, infimi ventris et morbos artuum et superficiei corporis dispescuit. Domicilium sensuum externorum et internorum caput nempe, priuatur ut plurimum visu et auditu, et quidem, vel ex toto, vel ex parte. Omnis perit videndi facultas ex gutta serena et cataracta, Priorem morbum, apoplexiae ut plurimum prodromum esse vult, hinc de eo, ubi de apoplexia ipsa aget, simul copiosius exponere decreuit. Cataractam in corporibus habitus spongiosi crebrius oriri ac in iis, quae firmitioris sunt constructionis putat ideo, quod vasa in illis sint tenuiora et angustiora et obstructioni magis exposita, qua facta, etiam lens crystallina pelluciditatem amittat ipsaque generetur cataracta. Remedia huic morbo, quae opponuntur, sunt varia. Laudant



dant non nulli salivationem mercurialem, quam ta-  
 men, ob finistram euentum in plurimis, reiicit Cl.  
 Auctor. Tutiora et magis efficacia, sic dictante ratio-  
 ne, suadet, nempe errhina, praeprimis ex cubebis  
 paratum puluerem sternutatorium, et efficaciam il-  
 lius remedii, adposita quadam curatione notabili vin-  
 dicauit. Eundem effectum salutarem procurant  
 olea destillata, anisi nempe, foeniculi, et quae  
 omnia superat, croci, ad guttas decem, mane et  
 vesperi frustulo sacchari instillata, praesertim si adiun-  
 gitur potus infusi calidi, ligni sassafras, vel etiam  
 theae communis. His ad latus ponit internum usum  
 camphorae, ad aliquot grana si adsumitur, non ne-  
 glectis auxiliis externis, linimentis scilicet, (ex axun-  
 gia viperarum et asciae piscis paratis. Saepius iam  
 enarrata remedia auertunt orientem cataractam: si  
 vero caecitas quotidie augetur, et plenaria visus ob-  
 scuratio tandem corpori inhaeret, sola operatio chi-  
 rurgica, qua lens ex sede sua deprimitur, locum ha-  
 bet. A plenaria hac visus abolitione transit ad ea in-  
 commoda annosorum, quibus isti adfliguntur, nem-  
 pe inflammationem oculorum, epiphoram, humo-  
 rum desiccationem, retinae vitia, tunicae albugineae  
 rugas, corneae siccitatem et plenariam obscuratio-  
 nem. Contra inflammationem et epiphoram collau-  
 dat purgationes per epicrasin, venaesectiones repe-  
 titas, scarificationes in superciliis et temporibus, lo-  
 tionem faciei, in primis superciliarum, cum sapone  
 in spiritu vini camphorato soluto, capitis frictionem,  
 vesicatoria temporibus imposita, fots, vel humi-  
 dos, vel siccos, et humidos quidem ex herbis emol-  
 lientibus cum aceto paratos, quibus dolorem leuari  
 confirmat; et his, iam enarratis, si frustra adplicata  
 fuerunt, superaddit tandem sopientia antiquorum  
 fortiora, quale est Sief cum opio in aqua solani so-  
 lutum. Contra atoniam retinae medetur iis, quae  
 suaserat superius in fiente cataracta, masticatione

- nempe camphorae, oleo anisi, foeniculi, croci, tam externe, quam interne, usurpatis, cubebis et radice valerianae, tam in puluere errhino, quam in masticatorio auxilio usurpatis. In tunicae corneae obscuritate, ceu perspectum et exploratum a se extollit remedium, piscium pinguedines, insolatione liquefactas, vel puras, vel puluere zingiberis mixtas, si de eo, guttula una vel altera, cubitum euntis corneae vel cantho oculi maiori illinitur, cum pelluciditatem restituit: Nocet tamen, ubi albuginea est inflammata. Huic morbo, tenebras causanti, alio praeter ea remedio obuiam it, collyrio sicco, ex tutia, cerussa lota et aequali portione nitri confecto, quod corneae inspergit. Cilia inuersa et rigida, si laedunt corneam, morbus trichialis vocatur, ut euellantur, praecipit, et locus iste tangi debet lapide sic dicto infernali, quo impediatur aliorum ciliorum prouentus, quam curationem praecisioni palpebrarum praefert. Venam secare in imminuto senum visu inconsultum esse, partim ex ephemeridibus naturae curiosorum, quae, saepius in libello suo citat, partim ex eo, quod omnis nimia sanguinis euacuatio hunc sensum debilitet, euietum dat. Quae de reliquis sensibus porro consignata dedit medendi praecepta, ea conciso ser-
- p. 122. mone porro explanabimus. Obauditio oritur, vel ex retento cerumine aurium, vel ex vitio tympani et ossium auditus, vel ipsius nerui acustici debilitate. Contra atoniam tympani extollit oleum succini album, ad guttas duas auri immissum, illudque insimul quoque vertici ad aliquot guttulas inungere praecipit, si antea sapone nigro, ex oleo balaenarum confecto, indicatus locus, pro faciliiori via oleo paranda, illinitus fuit. Similem effectum in hac aegritudine castoreo, camphorae, croco et balsamo
- p. 123. peruiano genuino et oleo croci tribuit. Tinnitus aurium, cum vertigine si iunctus est, apoplexiam saepius minatur. Ad auertendam hanc suadet oleis destilla-



destillatis e. g. galbani, anthos, lauendulae, succini inungere verticem, nucham et spinam dorsi; interne autem porrigere adfecto camphoram, liquorem C. C. succinatum, spiritum C. C. et alia spiritus excitantia medicamenta. Vrgente plethora, quae ut plurimum in senibus vegetis praesens est, sanguis emissione e vena minuendus est. Adficiuntur in grandaevis quoque sensus interni; et memoriae debilitas, et phantasia remissior, de eo testantur. Caput porro male adficiunt cephalalgia et hemierania, p. 130. et molestias caussantur insignes, haemorrhagia narium et vertigo, syncope et lipothymia, paralytis, hemiplexia, apoplexia, qui ultimus morbus prae reliquis aliis aetate prouectioribus est familiaris. Concinno autem ordine tradit, quibus modis subuenien- p. 162. dum sit apoplexia tactis, variaque proponit auxilia: Sed cum illa nemini non medentium cognita esse debeant, neque singulare, vel forte etiam nouum additum sit remedium; illis enarrandis superfedemus. Diu multumque iam cogitatum fuit de auertenda apoplexia, et praua lucri cupido imposuit credulis specificis sic dictis antapoplecticis, prout sunt sacculi famosi berolinensium. Hos gestare in praecordiis p. 164. non dissuadet Ill. Auctor, cum ad mentem eius, eo in loco concurrat centrum aliquod neruorum, quorum resectio ipsam mortem subitanam fugat. Ignoramus nos, qualis sit iste locus thoracis, ubi nerui plures distributi, medicamento, exterius adpenso, roborari possent, ita quidem, ne ullam patiantur sui umquam alterationem: Veriora tamen insimul et experientia magis confirmata, ibi recenset quoque remedia.

De reliquis tandem capitis vitiis fatetur, non de iis tantum se agere, quae forte solis decrepitis alias accidunt, sed omni aetati hominum, et quae ab aliis auctoribus huic parti, tamquam idiopathica, non annumerantur; cum nemo therapeutarum salinae ex-

- cretionem, dentium vitia, inter morbos capitis proprie exponat. Ultimo tandem de vigiliis nimis et sopore senum non nulla differit, et causas plures adducit efficientes, ut uterque adfectus, vel cieatur, vel sustentetur. Inter remedia, quae sanguinis impetum a parte hac nobili capite nempe auertunt, sunt
- p. 168. p. 175. medicamenta aluum subducentia primaria. Prae ceteris laudat aloem hepaticam, ad aliquod grana cum tartaro vitriolato et magnesia alba remixtam, exhibitam, et myriade exemplorum hoc medicamentum comprobatum, titulo pulveris polychresti laxatui exhibuit olim, et numquam non speratum, et sanguinem corrigendi, et aluum soluendi, impetrauit effectum. Simili ratione et colli pathemata, deglutationem difficilem ex relaxatione et debilitate oesophagi, una cum angina expendit; quare et hic uberimam, de difficilibus his morbis differendi et auxilia varia suggerendi, nactus est occasionem.
- p. 184. Morbos thoracis, quibus senes ex mente Ill. Auctoris anguntur, nominare tantum volumus. Sunt isti tussis, phthisis, asthma, catharrus suffocativus, polypus, hydrops pectoris, haemoptysis, pleuropneumonia; quibus subiungimus infimi ventris valetudinis aduersae vitia, nempe anorexiam, vomitum, flatulentiam, colicam, alui obstructionem, diarrhoeam, nephritidem, mistum cruentum, haemorrhoides, menstruationem vetularum, cachexiam, hydropem, icterum, vesicae vitia. Aegrotationes artuum, dum indicat, illis adnumerat erysipelas, sphacelum pedum, arthritidem, podagram, scabiem.
- p. 239. p. 255. In fine huius capitis, senes etiam a quibusdam morbis immunes esse, monet, prout illud observatum est de peste, de variolis et scorbuto; itidemque eos non succumbere facile febribus petechialibus acutis, vel intermittentibus.

Ordo dicendorum, quem haecenus tenuit Ill. Auctor, et quem presso pede secuti sumus, nos ducit nunc



nunc ad caput tertium, inscriptum: *de methodo sal-* p. 256.

*uam longaeuitatem acquirendi.* Si perpendimus hominum ortum, de quo C I C E R O recte pronuntiat: nos ea lege natos esse, ut vita nostra variis exposita sit difficultatibus atque periculis, quibus se adiungunt praeter ea varii morbi: tunc mirari non satis possumus, cur non nulli tam solliciti sint, de protrahenda et extendenda hac misera vita, quoniam lubrica atque fallax est plurimorum spes, summam adipiscendi senectutem. Congenitus nobiscum equidem est amor vitam conseruandi quam diutissime: sed cum non in potestate nostra positum sit, debile a genitoribus traditum corpus, ad omnimodam firmitudinem immutandi: expleuimus iam illud naturae desiderium honestum, si naturae et structurae natiuae conformes viuimus. Faciunt hoc multi, qui recta rationis usu adiuti, corpus, alias sanum visum, quam maxime curant, in medio tamen vitae termino, quem alii attingunt, priuantur vita et sanitate, tam anxie expetita: cum contra ea alii, spretis et neglectis omnibus sanitatis praeceptis, saepius cum eorum repugnantia et indignatione fiant seniores. Num ergo leges istae, quas sanxere et proposuere ad obseruandum artis nostrae doctores, erunt superfluae? Minime. Valebunt in multis, non in omnibus, cum in ipsis euentibus, ad sanitatem hominum relatis, nihil perpetuum sit. Quis ignorat V E R V L A M I I, p. 258.  
H O F F M A N N I, Z W I N G E R I ad longaeuitatem consequendam propositas leges, quas paucis et summatim denuo adducit Ill. Auctor? Fundamentum omne plurium horum praeceptorum, ex obseruatis in longaeuis desumptum est: sed ii forte ipsi non valerent, si ab iis postularetur, genuinas indicandi prouectioris aetatis causas, cum consuetudines non nullorum, et modus viuendi, quibusdam familiaris, omnibus pro norma esse non possit. Non tamen negligenda erit obseruatio rerum sic dictarum non naturalium, si

- etiam non tanta certitudine corroborantur, quanta de iis spondent multi. Sint immixta multa dubia: non tamen erunt omnia falsa atque erronea. Quia itaque haecenus nullum, omni exceptione maius, excogitatum est, longaeuitatem adsequendi, auxili-  
um; inquirendum erit, annon existant aliae occultae causae essentiales grandaeuitatis et longaeuitatis, in machina nostra haerentes, quibus praesentibus sum-  
p. 265. mum senium consequi possit homo? Latent, secun-  
dum Ill. Auctorem, illae essentiales et verae causae gran-  
daeuitatis et longaeuitatis *in perfecta firmaque confor-*  
*matione omnium partium solidarum corporis, et in per-*  
*fecta mixtura partium constitutiuarum sanguinis, quae*  
*causae oui materni et seminis paterni optimam constitu-*  
*tionem, nullis cautelis fulciendam, simul comprehendunt.*  
Talem proportionem partium, ac iam indicauit No-  
ster, rarius reperiri inter homines, nemo negabit,  
et bene exinde ad exiguum numerum longaeuorum  
prouocat, cum pauci inueniantur, qui ea instructi  
p. 266. nascuntur. Quodsi itaque hac aequali syncrasia par-  
tium a natiuitate quis coagmentatus est, sequitur,  
ut fiat longaeuus, neque opus habet, ut curet anxie,  
quae reliquis ad prorogandam vitam imponuntur va-  
letudinis praecepta. Concedamus, sententiam hanc  
non omni carere probabilitate; erronea tamen ideo  
dicenda erit, quod decipiat incautos, nimium tri-  
buentes firmae et adaequatae partium suarum consti-  
tutioni. Restrigit ipse Ill. Auctor adsertum ad  
quosdam tantum, dum suadet debilibus, ut ideo,  
quia non tali eximia corporis habitu a natura facti  
sunt, subueniant debilitati et infirmitati corporis mo-  
p. 269. deratione. Tangit obiter spinosissimam quaestio-  
nem, quinam vere valens et sanus dicendus sit?  
Olim iam disceptatum est de hac re multum inter  
eruditos medicos, prout exstant scripta non nulla in  
ephemeridibus naturae curiosorum, quae allegauit.  
p. 267. Is status hominum viuentium erit optimus et sanus,  
prout



prout vult Ill. Auctor, qui non impedit nutritionem corporis, nec ullam functionum, tam vitalium, quam animalium: haec habenda est pro adaequata partibus solidis et uniuersae corporis structurae, et haec promittit, fruentibus ea, senectutem, imo longaeuitatem. Illustrat theorema illud variis exemplis, dum diuersos homines, in comparatione cum aliis morbosos visos, pro sua tamen idiosyncrasia bene valentes, non solum, sed et senescentes, sistit. Respicit primario ad habitum corporum, et statuit, habitum corporis strictum, perfecte valentem, esse habitum strictum robustum in singulis fibris solidioribus; et habitum corporis laxum perfecte valentem, esse habitum laxum robustum in congerie solida et densa fibrarum unitarum tenuium. Corpora imperfectae sanitatis tali ratione quoque depingit. *Habitus corporis strictus imperfecte valens, inquit, est habitus strictus tener ex fibris debilibus; et laxus imperfecte valens est habitus laxus ex fibris debilibus, laxo congestis.* Sanguinis mixtionem, pro diuersitate habitus, admodum quoque esse diuersam, insimul monet. Non reiiciendam esse hanc diuisionem corporum, quam veteres iam proposuerunt, per se patet, cum necesse sit ad illam semper respicere, tam in praescribendis regulis diaeteticis, unicuique habitui proficuis, quam in adplicandis etiam aliis auxiliis therapeuticis. Transit tandem ad auxilia longaeuitatem efficientia et regulas generales, ab omnibus hominibus obseruandas, promulgat, cuilibet habitui ad senectutem acquirendam necessarias: nempe 1) ut ex instinctu naturae, iam designato, vitae regimen instituant et victum sibi seligant experientia domestica probatum: 2) excretionum corporis iustam habeant curam: 3) animi serenitatem et hilaritatem, vel ad minimum eius aequilibrium seruent. Illustrat haec praeepta uberius, dum rectum usum rerum sic dictarum non naturalium, pro more suo erudite et copiose

p. 270.

p. 271.

p. 273.

copiose tradit, et sedulam et curatiorem obseruationem omnibus, cuiuscunque sint temperiei humorum et fibrarum, commendat. Nonne autem inter omnes hos morbos et pertractandi eosdem propositas regulas marasmus senilis eiusque peruestigatio locum sibi iure vendicare potuisset?

## XVII.

CHRIST. EVERH. DE LILLE, Med. Doct.  
Tractatus de Palpitatione Cordis, quem praecedit praecisa cordis historia physiologica, cuique pro coronide addita sunt monita quaedam generalia de arteriarum pulsus intermissione. Zwollae, apud Andr. Voyer, 1755. 8. pl. 19 $\frac{1}{2}$ .

**I**ntegri omnino sanique corporis naturam prius cognoscat, quemque oportet, quam in aegri sustineat idem inquirere morbos. Atque hinc etiam Cl. Auctor, principis corporis nostri partis, cordis, morbum contemplaturus, eius sani praemittendam sibi esse recte censuit tractationem, quo huic ipsi tamquam fundamento suo superstrui melius possit uberior palpitationis historia. Primum igitur ad physiologicam cordis historiam quod attinet, tribus illa absolvitur capitibus, quorum primum quidem in cordis ipsius partiumque, quibus constat, fabricam inquirat, alterum vero motum eiusdem et usum, quem et sibi et uniuerso corpori praestaret, declarare curatius sustinet, tertium denique de situ cordis eiusque cum aliis partibus connexionem exponit. Sequitur iam ipsius palpitationis tractatio, sequenti absoluta ordine, ut nimirum data sub initium eiusdem definitione, cum distinctio eius in varias species, tum differentia ab aliis cordis affectibus similibus, tandemque generalis exhibita fuerit prognosis. Quibus expositis,



expositis, brevis eaque generalis causarum morbi nostri tradita est recensio, atque in suas classes facta divisio; post haec autem accuratior singularum harum causarum disquisitio, modique, quo unaquaeque hunc morbum concitat, expositio, observationibus multis tum aliorum, tum suis confirmata, specialis tandem cuilibet causae subnectitur curandi methodus, generali illa ob variam morbi pro causarum differentia indolem hic neglecta. Sub finem tractationis, uti iam indicat libri inscriptio, de intermittentis pulsus natura, causarumque huius cum illis palpitationis vel convenientia vel discrimine non nulla addita a Nostro fuerunt monita. Haec igitur generalis est totius de palpitatione cordis tractatus sciagraphia; iam singula eius nobis perlustranda forent capita, enumerandaque uberius, quae vel nova Noster hac in re praestiterit, vel accuratiora, quam alii, docuerit. Enim vero plura, in hoc tractatu, quae traduntur, satis iam nota, ab aliorum adsertis quum sese vix distinguant, nouaque plane non sint, missa fusiore contentorum eius expositione, pauca sufficiant inde huc retulisse notatu digniora momenta.

Ne itaque omnem cordis historiam physiologi-  
cam neglexisse videamur, illud in primis iuuabit No-  
stri adduxisse adsertum, quod adhuc cum WILLEISIO  
circa neruos cordis eorumque originem et usum affir-  
mauit. Alios etenim cor neruos habet, inter arte-  
riam aortam et pulmonalem decurrentes, paris vagi  
propagines; alios vero ab utroque magis latere in-  
tercostalis cordi porrigit. Illorum origo in cerebello  
est; atque hinc, quum e cerebello fluidum nerueum  
aduehant, motui cordis vitali in primis inseruiunt:  
Hi e cerebro orti, sensui cordis dicati esse perhiben-  
tur. Est etiam in influxu fluidi neruorum, cerebelli  
fabrica elaborati, posita systoles cordis causa effici-  
ens; quin ipsa palpitationis causa ab illo impedito  
potissimum deriuata fuit. Id, quod ipsius palpita-  
tionis

p. 31.

p. 35.

p. 68.

tionis monstrat definitio. Est ea nimirum *praeter naturam violenta et perquam molesta muscoli cordis contractio*, una cum magna *resistentia cruoris a corde puls*i, ab *inordinato et impetuosiori spirituum vitalium per nervos in fibras cordis influxu*, et *cruore iusto maiori copia in eius ventriculos impulso*, ita, ut manu super *imposita pectori ipsa se impelli valide et pectus extrorsum trudi*

p. 72. *sentiat*. Atque inde etiam huius a tremore cordis in primis adnotari meretur distinctio: tremor enim est vacillatio muscoli cordis inter tonum et laxationem, interque causas tendentes et laxantes, breui et inuoluntarie sibi mutuo succedentes; causa vero ponitur in influxuum nervosorum, siue prae debilitate siue alterna aliqua irritatione, nunc praesentia, nunc absentia. Palpitatio contra nimiam sistit violentamque cordis contractionem, atque causam etiam habet influxum spirituum impetuosiores. Praeter hanc differentiam aliae ipsius mali occurrunt distinctiones, in idiopathicum et sympathicum, in haereditarium, connatum et acquisitum, quas vero fusius hic describere non licet. Progredimur ad causarum considerationem, quarum aliae intra et circa cor ipsum haerent, aliae remotis in partibus resident. Illis adnumerantur polypi, in cordis cauis vel vasis eius maioribus nati, calculi, pili, vermes, excrecentiae carnosae vel osseae, iisdem in locis repertae omnes. Hae vero sunt animi pathemata, nimiae meditationes, passio hysterica et hypochondriaca, atonia ven-

p. 263. triculi, obstructio viscerum cet. Praeter has causas recensitas aliae adhuc occurrunt in malo siue ipsius cordis vel pericardii, siue totius corporis habitu posita: nimirum cordis et pericardii inflammatio, vulnera, aneurysmata cordis, hydrops pericardii vel liquidi eius defectus; thorax contractior, rigiditas vasorum et viscerum, plethora vera, siue ad vasa, siue sit ad vires, crassities sanguinis, cacochymiae omnes species.

Tandem



Tandem pulsum intermittentem conuenit confi- p. 288.  
derasse breuissimis. Est idem familiaris admodum  
palpitationi ipsi morbus. Quum vero et sanus ille  
illaesusque ab integra cordis dependeat in primis sy-  
stole siue contractione; hac laesa, fieri non potest,  
quin laedatur et ipse. Hinc etiam fere easdem, ac  
palpitatio, habet causas, binas si exceperis; nimi-  
rum defectum spirituum cerebelli vitalium vel penu-  
riam sanguinis, quae quidem intermissionem pulsus  
arteriarum, numquam tamen palpitationem cordis  
efficere poterunt.

### XVIII.

*Kurtzer Entwurf der Königlichen Naturalien-  
kammer zu Dreßden. Description du Cabi-  
net royal de Dresde touchant l'histoire na-  
turelle. Dresden und Leipzig in der Walth-  
erischen Buchhandlung. 1755. 4. mai. c. fig.  
pagg. 102.*

i. e.

Breuis descriptio musei regii Dresdensis thesau-  
ros naturae recondentis.

**T**antae sunt tamque immensae naturae diuitiae, ut  
qui aliquas earum colligere tentat, omni adhibi-  
ta opera non tamen nisi imperfectum aliquod opus  
relinquat, ex quo illius laboris facile dignoscitur dif-  
ficultas, omnium et diuersissimorum corporum, pru-  
dentem suscipiendi collectionem et dispositionem.  
Hoc soli, qui auctoritate et potestate reliquos ante-  
cellit, datum est principi, quippe cuius nutu confi-  
liisque adiuti earum rerum studiosi omne suscipiunt  
in exequendo attingendoque fine negotium. Quan-  
ta autem in nostris terris historiae naturalis studium  
cum laude fuerit perfectum, quantaque cum sollici-  
tudine

tudine sapientissima AVGVSTORVM, quicquid ad eam exornandam perficiendamque pertinet, conqui-  
rendi clementia vigilauerit, loquitur descriptionis re-  
gii splendidissimique musei prodromus. Exteri qui-  
dem illorum thesaurorum admiratores variis iam spe-  
ciminibus incitati sunt ad eos penitus noscendos,  
quum Cl. NATHANAEL SENDELIVS anno huius  
seculi quadragesimo secundo hic Lipsiae *Historiam suc-  
cinorum, corpora aliena inuolentium et naturae opere  
pictorum et caelatorum ex regis Augustorum cimeliis  
Dresdae conditis, aeri insculptorum* conscriptam ede-  
ret: quum porro paullo post, anno scilicet quadragesi-  
mo octauo Cl. CHRISTIAN. GOTTLIEB LUDWIG  
*Terras musei regii Dresdensis* illustraret: nunc tamen  
ex mandato Illustrissimi Comitis DE BRÜHL, prima-  
rii REGIS ministri, generalis quaedam data descriptio  
omnes, quibus vel cimelia videre contigit esse tam  
felicibus, vel qui hunc tantum perlegerint librum,  
obstupescere faciet certissime. Debemus autem illum  
indefessae industriae Cl. EILENBURGII, cui rerum  
naturalium cura commissa est, cuius etiam scientiae  
in digerendis iisdem manifesta nunc extant documen-  
ta. Prius autem ad eam, quae a nobis, quantum  
rei dignitas permittit, dari potest delineationem,  
quam accedimus, praemonendum esse ducimus, du-  
plici idiomate, vernacula nimirum et gallica lingua  
conscriptum fuisse opus, ita tamen, ut vel simul, vel  
separatim utriusque linguae haberi possint exempla.

Mox in fronte libri magnifici aedificii, in quo  
reconditi hi thesauri adseruantur, exterior facies de-  
lineata occurrit, cuius etiam ichnographia duabus  
tabulis proponitur: qualia autem ex INDVLGEN-  
TISSIMI REGIS sensim ceperit incrementa, ad  
eam, qua nunc superbit perfectionem ut deuenerit,  
in praefamine declaratur.

Sed, quod Cl. Editori diuersorum, pro eo, quo  
se inuicem suscipiunt, ordine, museorum historiam  
suppedi-



suppeditare libuit, nos eius sequentes normam breuiter aliquam eorum dabimus adumbrationem. Praeteribimus autem, quae ad internae conformationis rationem pertinent, quum totidem quibus factum est a solertissimo Auctore verbis essent tradenda, de dispositione rerum, quae singulis continentur, naturalium tantum relaturi.

Primum ex his museum *Mineralia* complectitur, p. 6. cuius parietes mineris terrisque exornantur, lapidum autem dispositione fenestrae coruscant. Omnia ita digesta deprehenduntur, ut ob duplex, quo aditus patet, atrium, possit cuique, qui vel ab ignobilioribus fossilibus ad nobiliora transeundum esse arbitrat, vel contra, fieri satis. In mediis itaque post ingressum conspiciendis, pilis fossilia, quibus ars splendorem dedit, vel arte composita corpora et quae ad fusionem metallorum pertinent, in oculos incurunt, id quod adductis comprobatur exemplis. Ab his ad mineralia ipsa accedimus, inter quae minerae auri compotes primo conspiciuntur loco. Singulorum quidem pleniores descriptiones suppeditabit specialior eorum expositio, hic tamen pretiosior eius modi rerum naturalium collectio per specimina demonstratur. Auri natiui et purissimi magnae moles, nec non arenae, auro diuites, et deinde minerarum quibus aurum admixtum est, quantitas varia occurrit, ex quibus aurum albi coloris notatu est dignissimum, p. 10. nec non auri natiui exempla, in plantis inuenti. Ultimo etiam loco aurum, arte paratum et ab *adeptis* sic dictis, praeparatum ponitur, cui adiungitur argentum, ex cupro factum et a Lib. Barone DE BOETTGER in praesentia diui *Regis* |transmutatum.

Longe uberior porro est collectio minerarum ar- p. 12. genti. Ditissimam et feracissimam eius nostram esse Saxoniam nulli mineralogo est incognitum. Nihil monemus de argenti natiui compactis crassioribusque

crustis: occurrit enim et hic argentem filiforme, aurei coloris. Exterarum regionum minerae argenti, seorsim collocatae, non minoris momenti sunt.

His ex ordine succedunt reliquorum metallorum minerae, cupri nempe, stanni, plumbi, ferri, et sic porro, quae variis ornamentis additis animum intuentis egregie alliciunt atque delectant, a quibus ad semimetalla progressus fit, ad cobaltum nempe, bismuthum, antimonium, arsenicum et alia, quibus pyrites, sulphura et marcasitae adiunguntur, quae salia et terrae deinde excipiunt, tum crudeae, tum sigillatae. Ex his terra sic dicta miraculosa Saxoniae, tanquam marmoris rudimentum, in horum etiam dispositione primordium facit. Hi lapides a mollibus incipiendo ad duriores progrediuntur. *Fluores metallici*, crystalli spathaceae et quarzofae sequuntur et post haec singularis indolis lapides, ut odoriferi, aetitae, tandemque lapides durissimi nec non pretiosi. In medio huius musei aedificia, ex quorum compositione, quicquid in subterraneis cryptis peragitur, intelligi potest, disponuntur.

p. 21. Alterum, quod patet, museum petrefactorum plenissimum conspicitur, nitidissime praeter ea exornatum. Stalactites reliquis praecedunt, adduntur tophi, corpora crusta lapidea obducta, dendritae, et quorum forma corpora naturalia imitatur. Pone haec locantur vera in lapidem conuersa corpora, et primo quidem loco vegetabilia. Ligna lapidefacta, cortices, rami et radices arborum, utpote maiori copia praesentes, primario adducuntur loco, inter quos arboris ingentem molem consideratione digniorem, olim iam a nobis adductam, obseruamus\*. Sequuntur reliqua ordine dicto et in primis corallia plantaeque sic dictae marinae, subiunguntur porro his corpora, de quibus, num vere in lapidem fuerint conuersa, an vero faciem eorum prae se ferant, an

\* vid. Comment. nostr. Vol. I. Part. III. p. 522.



an potius animalibus magis, quam vegetabilibus sint annumeranda, ambigitur. Optime cum his petrefacta regni animalis iunguntur, ex quibus animalia, in aquis degentia in varias classes subdivisa notamus. Sic enim pisces petrefacti, haud pauci ex nostris terris et rariores adsunt, ad quorum dispositionem adduntur hammites, glossopetrae tandemque cancri petrefacti, et conchyliorum largissima quantitas, ad methodum digestorum. Collectiones specialiores, variorum eiusmodi corporum compositionem monstrantes, rei illustrandae causa adpositae nouo sunt ornamento, rarissimis iterum speciminibus superbientes, quorum descriptiones hic a Cl. Editore proponuntur. Finem tandem imponunt partes animalium variae, tum etiam hominis, quorum vita non in aqua sed in terra peragitur, quo praecipue pertinet p. 28. sceleton crocodili fere integrum, nec omisae sunt per artem factae petrificationes, quibus olim, ut veras aestimarit, se inducere passus est Cl. BERINGERVS, publici iuris factas Virceburgi 1726. fol. sub titulo *Lithographiae Virceburgensis*.

Tertium deinde *musaeum vegetabilis regni* thesaurus p. 29. complectitur, inter quos herbarium plantarum exsiccatarum et pictarum, simul cum aliis, conformatione sua, varietate et raritate notabilibus vegetabilibus, deprehenditur. Occurrit in primis collectio lignorum tum indigenorum, tum exoticorum, in tabulas sectorum, quibus partim cortex adhaeret, ut interiorum partium configuratio melius appareat, partim ille ablatus est.

Ex hoc autem aditus patet in *musaeum nouum anatomicum* dictum, quod post annum huius seculi quadagesimum sextum, quum, quae ex anatomie collectae fuerunt partes, regio iussu in academiam Vitebergensem fuerant traducta, demum institutum est, et ex variis, per solertem Cl. RVYSCHII artem praeparatis, partibus singularem indeptum est splen-

dorem. Aliae ex his in spiritu asservantur, aliae siccatæ. Sceleta ossium, per artem composita et monstrorum varii generis exempla non deficiunt, ut ex permultis quarundam rerum faciamus mentionem: siquidem ex singulis aliqua iam degustare tantum cogimur. Elegans instrumentorum anatomicorum et chirurgicorum apparatus, nec non Bibliotheca optimorum scriptorum B. HEVCHERI, regia munificentia huc delata, non satis extollendæ indulgentiæ manifesta exhibet documenta.

p. 40.     Obstupescit denuo animus, ad *musæum animale*, quod duplex est, dum progredimur. Ex cuius longitudine, quæ septuaginta sex ulnarum est, ubique animalibus eorundemque partibus repleta, de collectionis magnificentia iudicari potest. Quantum spatium permisit, cuncta ad methodi ordinem digesta fuerunt; collocantur autem primo loco partes quadrupedum, et deinde integra animalia quadrupeda, vel detracta et facta cute, vel in spiritu vini conservata, inter quæ alibi vix videnda. Iuncta his sunt varia monstra animalium. Relictis reliquis, adnotamus calculorum, in animalibus genitorum, vel in corpora eorum ingestorum, numerosam seriem. Lapides bezoardici veri, ægagropilæ, deglutiti varietateque mutati lapilli et alia, copia varietateque delectantia similia corpora, hic reponuntur, simul cum rebus, quarum aliqua creditur esse affinitas, ut cerebrum petrefactum sic vocatum et arachnolithi, et arte facti alii. Alteram hic obuiorum animalium classem non immerito constituunt crocodili, lacertæ, bufones et animalia congenera, nempe, qui annectitur numerosissimus rarissimorum ex parte serpentum apparatus, quorum descriptionem, nondum editam, composuit sæpe nominatus B. HEVCHERVS, ex qua varia notatu dignissima, referuntur.

p. 56.     Cum his iunguntur porro insecta, in duas classes diuisa, nempe in ea, quæ pedibus destituuntur, et  
ea,



ea, quae illis instructa incedunt. Papiliones, scarabaei et cicadae Surinamenses atque exoticæ variae copiosae adsunt, nec non nostrarum terrarum completa collectio, ut de reliquis insectis, quorum per saepe domicilia adseruantur cum iisdem, nunc taceamus. Alatis insectis a latere adponuntur aues, quarum itidem exoticæ et indigenae plures sunt, hisque nidorum auium, nec non ouorum diuerforum collectio adnectitur, finemque iisdem scelela diuersa imponunt.

Alterum animalium *museum* theatrum est *anima-* p. 62.  
*lium aquatiliu*, in quo praecipuam merentur attentionem pisces integri, nulla ex parte mutilati, v. c. Unicornu f. Narhwal, canis carcharias, delphinus, cet. Inter minores pisces torpedo est, pisces alati, remora, et permulti alii, ad methodum omnes dispositi, quibus monstra et excrescentiae variae, in piscibus deprehensae adduntur. Hos pisces etiam excipiunt stellae marinae, quibus Linckianum de illis opus augeri potest, in testis ostrearum deprehensae stellae itidem occurrunt. Proximo ab his loco constituuntur animalia exsanguia incrustata, conchylia et astaci. Posteriores praecedunt reliquis, ex illis quos Gammaros, germani *Hummer* vocant, species minor describitur studiosius, quae ad insulam *Heilgeland* inuenitur. p. 72.

Separato deinde loco digestum extat *museum con-* p. 73.  
*chyliorum*, ad methodum Cl. KLEINII dispositum, variisque artificiose, per corpora haec naturalia, colore et forma multum discrepantia, congestis ornamentis splendidius redditum. Opus non est, ut de singulis quaedam notemus, quum rarissimorum etiam specimina hic non desint, post uniuersalia vero sequuntur biualuia. Fila ex pinnis marinis, byssifamilia hic videntur et margaritarum cuiuscunque generis copia, siquidem earum haud parca quantitas ex Elystro in Variscia penes nos colligitur. Irregu-

laris formae conchylia tandem et hic simul exposita habentur.

p. 78. Properamus ad sequens *Coralliorum et plantarum marinarum muscum*, quae in lapidescentes, flexiles et molles diuiduntur. Coralliorum varii generis ut ingens numerus est, ita recte quidem Cl. Editor nigrum a veris distinguit et rubri albique mentionem iniicit, prioris aliquod exemplum adest, quod flores et semina ostendit, quas partes recentiores physici polypos esse demonstrarunt, ab Ill. naturae scrutatore Com. DE MARSIGLI transmissum. Ceratophyta vel distincta, vel aliis plantis marinis inhaerentia, copiosius pariter conspiciuntur, quae terrestres plantas quandoque exacte imitantur, inter molles spongiae eminent, quarum aliqua prope Lipsiam inuenta in aqua palustri non indigna est attentione, plantarum vero similium marinarum haud exiguus est numerus, in quarum descriptione studiosus naturae indagator suam adhuc utiliter collocare posset operam.

p. 88. Marinae maximam partem originis est succinum, quod peculiari museo parando ansam praebuit, cuius diuitias iam Cl. SENDELIVS exposuit, hic autem paucis, quanti aestimanda sit pretiosa eorum collectio, adductis exemplis depingitur. Subiungitur simul collectio ambrae gryseae.

Multitudo rerum congestarum, quae sui similem vix inuentura est, tandem aeque ac conueniens illis digerendis constituendum spatium, nouo museo ingerere coegit Cl. Editorem *animalia quadrupeda*, hoc nonaginta quinque ulnas longum tribus ordinibus animalium exuias farctas sistit, atque iuxta posita eorum sceleta: ferae bestiae primo, deinde animalia sequuntur domestica. Ex rarioribus etiam talia obseruantur archetypa, quae naturae scrutatores, quibus illa videre non licuit, de variis facile admissis, euitandis erroribus instruere poterunt. Tigris et Leo-



Leopardus quatenus differant, brevis docet notarum diuersarum expositio. Prout enim hic magnitudine discrepat, ita ex luteo fuscum corpus transuersis nigris striis insignitur, quae rotundas nigrasque in illo maculas sistunt. Similium rariorum animalium omnis generis fere extant exempla. Inter arte facta et cum summo aequae studio ac impensis exstructa opera non innominatum relinquimus templum Salomonis. Neminem autem esse remur, quin horum thesaurorum, quorum meram ichnographiam supeditauimus, auide sit descriptionem ulteriorem promissam expectaturus, verbis ut videtur pro dignitate non pingenda.

### XIX.

Exercitium Academicum deiectionem corroborantem, et simul nexum purgationis aluinae cum sudore cutisque cum ventriculo et intestinis exhibens, Praeside IONA BOECKMAN, Med. Prof. Reg. et Ordin. Facult. Med. h. t. Decano. Respondent. *Petro Bet-tander*. Gryphiae, 4. 1755. 5 pl.

**I**n hac dissertatione academica demonstrandum sibi sumit Cl. Auctor *purgando corroborari* ventriculum, intestina, et per haec totum quoque corpus. Sine p. 1. iugi enim purificatione miseram esse corporis animalis vitam, euanescere omne robur, nullam esse sanitatem. Quid? quod fieri omnino non posse, existimat, quin ab interitu vindicetur fragilis haec machina, nisi vitae exitiali continuo liberetur spurcitie, quam ipsa illi ingenerat vitae actio. Haec praefatus triplici tractatione totum absoluit laborem. *Prima* morborum p. 4. ex plenitudine ortum, eisque exhauriendo et depurgando medentem naturam, generatim considerans, perniciosas, siue amussi huic renitentes curatio-  

L 4
nes,

- nes, tanquam praemissis repugnantes consequentias  
p. 5. paucis illustrat. Facile enim quemque deprehendere putat Cl. Auctor, neminem fore morbis diu perstiturum immunem, cui maior est nutritio, quam debita purgatio, seu, ut loqui solent, qui plus ingerit, quam egerit; strenuoque corporis labore egestorum portionem ingestis adaequatam, firmissimamque obtineri valetudinem: hanc vero negligentes regulam constanti sanitate parum uti, viriumque labore premi. Quare sanabilem quemvis morbum, intra limites nostri corporis natum largiter excernendo optime superari asserit, simulque addit copiosas, easque tempestive promotas purgationes omnis solidae curationis apicem quasi, centrumue et verum efficere fundamentum. Hac occasione grauitur inuehitur in hos, qui regulam hanc, summis, ut ait, medendi scientiae antistitibus, et prudenti cuius practico commendatissimam negligunt, quin aspernantur.
- p. 14. Pergit deinde ad *alteram* tractationem, qua corroborantem et morbis auerruncandis necessariam catharsin, ex principiis medicinae et observationibus pathologico-therapeuticis, ostendere contendit. Iustam igitur toni, seu roboris et purificationum corporis nostri proportionem, firmissimum, quin unicum, esse fundamentum, ipsa docere medicinae elementa, affirmat. Ipsum autem optime compositum motum progressuum, et tonicam humorum in aequalem ambitum distributionem, vitam et statum corporis nostri perficientem, iugi particularum attritu, pessimas gignere sordes, toti exitiosas machinae,  
p. 18. hinc e corpore eliminandas, docet. Saluberrimam autem hanc corporis depurationem in primis per aluum, vias urinarias et poros extremae cutis, qua totum corpus humanum includitur, in plurimis recte valentium quotidie fieri, nemo ignorat. Colligit inde Cl. Auctor: catharsin seu purgationem aluinae,  
nam,



nam, tum ad rite promouendas reliquas principes excretionē, quam ad vires corporis nostri confirmandas, summe esse necessariam. Constare enim p. 21. dicit: motus se et excretorios ad vitam tuendam nistendere continuo, moliente imminutionem perniciofae abundantiae. Hinc quamcunque largam catharsin a natura, vel fideli quodam prudentique ministro eius suscitata viribus minime inimicam, sed potius firmandis hisce quam maxime iudicat proficuum. Tantum enim abesset, ut eius modi exinanitione vires consumerentur, ut noua indies caperent incrementa, et opinione citius status naturalis rediret. Quae omnia ceteris paribus accipienda esse quilibet perspiciet.

In *tertia* denique tractatione amicam illius excretionis cum ea, quae per cutem fieri debet, hinc cuticulari, *peripherica* Cl. Auctori dicta, perspirationem sudoremque putes, consensionem e corporis nostri structura et praxi *clinica*, quod aiunt, seu medicorum euincere conatur experientia. Quia enim constringendo et relaxando operari dicitur tonus corporis nostri, sudorem et deiectionem modum sibi inuicem ac normam praefinire censet. Quibus praemissis, sequentem inde cogit conclusionem: *Ergo*, p. 30. inquit, *quicumque spasmos tam interiorum, quam exteriorum partium, v. gr. hypochondriaco-hystericos, podagricos aliosue arthriticos remedia alium soluentia exigere negat, ipsa artis medicae elementa, ut pote doctrinam de circulo et vitali tono, adeoque totum profunde ignorat corporis nostri mechanismum.* Praecedentem cautelam et hic valere medicorum facile negabit nemo. Dari autem remedia alium corroborando ducentia praxin medicam iam pridem comprobauisse arguit Cl. Auctor. Inter haec in primis nominat Rhabarbarum, huic addit pilulas laxantes balsamicas amaras, quibus multum laudis tribuit, easque reliquis anteposit remediis laxantibus. In vitiis enim motus to-

nici balsamicorum laxantium usum toti peripheriae et generi neruoso salutarem esse, ex b. HOFFMANNO. probat, quippe persuasissimum sibi habet, virtute earum balsamica impuros humores nostri corporis ad peripheriam duci, et varias hinc haerentes noxas, exanthemata vocant, aluum et diapnoen simul mouendo, feliciter expelli. Quod reliquum est, arctissimum peripheriae cum primis viis connubium, amicissimamque conspirationem, non solum praxin clinicam, sed et anatomicam ad oculum demonstrare affirmat: in cuius fidem VIEVSSENIUM, WINSLOWIUM et HALLERUM adducit, qui neruos, integumentis corporis nostri partibusque periphericis sensum conciliantes motumque, cum pari octauo, seu *vago*, et cum neruo, qui dicitur intercostalis, communicare docuerunt.

## XX.

FRIDERICI AVGVSTI CARTHEVSE, Med.  
D. Acad. Elect. Mogunt. Scient. util. Socii  
Ordin. Rudimenta Oryctographiae Viadrino-  
Francofurtanae. Francofurti ad Viadrum,  
apud I. C. Kleyb. 1755. 8. pl. 6.

Egregie omnino in mineralium scientia versatum esse Cl. Auctorem, et elementa mineralogiae, quae ipse superiori anno edidit, quaeque et nos indicauimus\*, et iam a nobis recensenda eius rudimenta oryctographiae Viadrino - francofurtanae confirmant uberrime. Generalem enim eamque systematicam mineralium corporum dispositionem ante quum exhibuerit, eorum idem nunc tradit enumerationem, quae raro vel frequentius in agro patrio intra duorum vel sex ab urbe milliarium spatium occurrunt. Ordinem eundem nominaque eadem specierum, quae in

\*. vid. Comment. nostr. Vol. IV. Part. III. p. 545.



in elementis mineralogiae dedit, retinuit Noster. Rariorum non nullorum notitiam ipsum sibi comparasse fatetur ex amplissimo Cl. CAROLI HENRICI MÜLLERI, Senatoris in patria urbe, gazophylacio. Pauca vero de agri Francofurtani situ et conditionibus ceteris praefatus, ad ipsam progreditur fossilium hic occurrentium recensitionem. Ex qua pauca sufficiant adduxisse. Inter terras notanda nobis visa est argillae species, quae coloribus ex albo in rubellum vel luteum vel griseum variat, politurae ope splendet, usibusque tinctoriis et pictoriis apta, circa pagum Lichtenberg ante annum circiter effossa. Lapidum classis, praeter spati eam speciem, quam glaciem maria vocant, copiose hic occurrentem, offert etiam micam aliam lamellis parvis, opacis, rigidis, dispersis, nunc aureo, nunc cupreo, nunc argenteo imbutam colore: in illa aurei vel cuprei coloris ferrum latet, per experimenta chemica extrahendum; in hac argentea non aequae. Alia etiam mica argentea, splendens, instar vitri russici flexilis, variis adhaeret lapidibus. In vulgari filice interdum reperitur massa quaedam, ex tuberculis hemisphaericis, teneris, subdiaphanis, nebuloso griseis composita, unum cum ipso filice efficiens corpus. Vulgaris quidem lapis calcareus vix occurrit, similis tamen effoditur materia alba, friabilis, iisdem usibus, ac calx viua, apta reperta: copiose vero calcarei rudiusculi, nitorem adsumentis, vagi fragmenta offert ager Francofurtanus, petrefactis variis frequentius scatentia. Referri huc etiam posse visus est lapis quidam oblongus, hinc laevis, planus, niger, illinc conuexus, asper, griseus, cultro si radatur, stercoreis suilli fere instar foetens, saxique suilli nomine imbutus. Calcareos denique ex aqua generatos siue tophos saepe in ripam eiicit viadrus, vel post inundationem in agris relinquit. Praeter nitrum embryonatum, terrae hinc inde immixtum et aluminis mineram, fissili inhaerentem, prope oppidum

- dum Koenigswalde et Freyenwalde effodiendam, nul-
- p. 26. la salina corpora hic inueniuntur. Neque ulla hic sunt inflammabilium vestigia; succini vero duo frustra bis reperta sunt; alterum flauum, pellucidum, aequè durum, ac Prussicum, prope pagum Schaumburg ex viadro extractum fuit; alterum in agro Lichtenbergensi inter arandum a ruricola effossium est: Quo modo vero huc illa deuenerint, dubium relinquitur.
- p. 30. Praeter binas species ochrae martialis nulla quoque metalla habet ager Cl. Auctoris patrius. Magnus vero mineralium heteromorphorum occurrit numerus, petrefacta omnis generis in se comprehendentium, quae tamen diffusum nimis foret, huc referre.
- p. 68. Appendicis loco fontis cuiusdam martialis consideratio additur, in horto quodam suburbii Lebusiensis, haud longe a propugnaculo urbis Francofurti qui scatet, a nemine haëtenus descriptus. Quem per experimenta patuit in se continere principium aliquod vitriolico-martiale, tenerius, et partes terreo-alcalinas, calcareas, indeque viribus in primis praeditum roborantibus. Externus eius datur usus et internus; frequentior in posterum virtutem magis forte declarabit.

## XXI.

### Noua physico - medica.

Doctores et Professores, qui *Romae in Archigymnasio* dicto medicas iam habent praelectiones\*:

M. SIGISMUNDVS TONCIVS, Senensis, in Institutt. Medic. theoreticae.

M. FRAN-

\* Desumimus hic loci citatos medicos Romanos ex catalogo praelectionum, quae publica lege atque auctoritate haberi debuerunt per annum, quem iamiam transegimus, huius seculi quinquagesimum quintum: hinc omnino dubii sumus, num eodem etiam ordine,



M. FRANCISCUS AVRELIVS GINANNESCHI,  
Senensis, in Elementa Botan. et Chirurg.

R. P. M. FRANCISCUS IACQUIER, Gallus, Or-  
din. Minimor. in Physicam experimentalem.

M. PETRVS ANGELVS ROTVNDVS, Romanus,  
in Medic. theoret. et practicam.

M. NATALIS SALICETVS, e Nebio in Corsica,  
in Institutt. Anatom. et Chirurg.

M. IOHANNES LAVRENTIVS GVARNIERI,  
Senensis, in Medic. pract.

M. COSMVS GRILLI, Messanensis, in Med.  
pract.

M. ALOYSIVS PHILIPPVS GIRALDI, Ferrari-  
ensis, in Elementa Chemiae.

Diebus vacantibus et festiuis:

M. NATALIS SALICETVS, e Nebio in Corsica,  
Anat. et Chirurg. Professor.

R. P. IOANNES BAPTISTA MARATTI, Roma-  
nus, Abbas Congreg. Vallis Umbrosae, Profess.  
Botan.

M. IOSEPH. CANDIDI, Romanus.

M. ALEXANDER PASCOLVS, Perusinus, in Me-  
dic. pract.

M. NICOLAUS MICHELANGEIVS, de Rocca  
Contrada Senogalliensis Dioecesis, in Medic.  
pract.

Membra *Instituti Litterarii* dicti, quod *Bononiae* flo-  
ret, quae per annum 1755 lectiones phyncas  
medicasque habuerunt \*:

V. Cl. DOMINICVS GVSMAVNVS GALEATIVS,  
Physicus.

V. Cl.

ne, quo scholas habere iussi sunt, in ipso sese exci-  
pian collegio, anque simul aliis fungantur muneribus?

\* Quae paulo antea diximus de medicis Romanis, haec

V.Cl. IACOBVS BARTHOLOMAEVS BECCARIUS,  
Chymicus.

IOSEPH. MONTI, Naturae Historicus.

PETRVS PAVLVS MOLINELLI, Chirurgiae  
Professor.

*Madriti* Potentiss. Hispaniarum Regem Collegio medicorum ibidem florenti hortum donasse botanicum, in eiusque culturam quoque sufficientem reddituum copiam, duosque rei herbariae constituendos professores decreuisse, earumque omnium rerum gerendarum curam primo ipsius archiatro, Ill. IOSEPHO ZVGNOL, dedisse legimus.

Ferro praecidendam esse, quae seruari nequit, vitiatam corporis partem, sincera ne trahatur, ad unum omnes huc usque affirmarunt chirurgiae cultores. Ista hinc inde quam maxime ardua enata fuit de amputatione doctrina, quae nostris quoque temporibus, uti reliquae artis partes, Gallorum in primis chirurgorum studio atque sagacitate insignia cepit incrementa. Quo factum quoque fuit, ut dextrissimi olim viri, b. LE DRAN, experimentum, quo totum humerum, inciso articuli ligamento, ex hoc ipso eximi posse docuit, omnium moueret attentionem atque admirationem. Grauior tamen difficiliorque multo, si umquam forte praestari possit, non nullorum ex recentissimis videtur esse opinio, qua fieri posse sibi persuadere velint, ut et totum femur ex ipso tolli queat acetabulo \*. Ea interim a Regia  
Chirur-

omnia quoque monenda sunt de hisce Bononiensibus, quippe quos itidem secundum lectionum catalogum citamus.

- \* Ad manus nobis iam est *Quaestio medico-chirurgica*, Praeside M. PETRO LALOVETTE, Doctore Medico, Parisiis anno 1748 defensa: *An femur in cavitate Cotyloideâ aliquandò amputandum?* qua in dissertatione



Chirurgorum, quae *Parisiis* fundata est, Academia digna iudicata fuit, quae a viris doctis earumque rerum intelligentibus atque peritis ulterius inuestigaretur. Quam ob rem praemio, a b. LA PEYRONIE legato, ad annum proxime futurum, 1757, distribuendo, hancce proposuit quaestionem illud collegium: Determinare eos casus, ubi excisio femoris ex ipso articulo unicum vitae aegrorum conseruandae videri possit auxilium; numque haec ipsa vere suscipi operatio, quaque demum methodo optime praestari queat? Conditiones ab iis, qui commentarios super propositis ab Academia quaestionibus conscriptos ad eam mittere velint, obseruandae, sunt adhuc eadem, ac olim a nobis expositae. Cl. MORAND, perpetuus Academiae illius Secretarius, ad exitum usque huius, quem agimus, anni 1756 oblatas ipsi accipiet indicati iam argumenti dissertationes.

Insuper iam *dicta* Academia, confirmandae artis suae amplificandaeque semper intenta, ex iisdem, quos beati LA PEYRONIE legatum ipsi suppeditat, redditibus, nummum aureum ducenta pondo gallica aequantem, quouis anno illi offert ex chirurgis, ii vel extranei sint, vel in ipso regno degant, (*Regnicoles*,) modo non sint Academiae membra, qui tractatu quodam cuiuscunque demum argumenti, quod cuius Auctori enucleare libuerit, illum prae reliquis mereri visus ipsi fuerit.

Vt *eadem* porro quoque laudabilem quandam pro stabiliendis magis magisque utilissimae artis fundamentis

tatione docte satis exarata, Cl. Auctor asserit, in carie capitis ossis femoris vel cavitatis cotyloideae, hancce et debere atque posse suscipi operationem, modumque ideo docet, quo ea perfici queat, solutis sub finem obiectionibus, quae contra istam moueri possint.

mentis eiusque ulterius extendendis limitibus excitet aemulationem inter chirurgos, quouis anno illorum quinque, ii siue sint academici, liberorum, qui dicuntur, ordini adscripti, siue tantum in regno uiuant, qui vel commentarium de aliqua re chirurgica conscriptum, vel tres modo obseruationes utiles notatuque dignas ipsi exhibebunt, singulo ex iis quinque dabit aureum nummum centum *francorum*, (*francs*, ) pretii.

*Burdigalensem* scientiarum Academiam praemio iam proxime elapso anno, 1755, effectuum, quos atmosphaera habeat in vegetabilium prouentum, explicationem designasse, iam olim \* enarrauimus. Quum experimenta in primis, quae ideo caperent viri docti, expectasset Academia, a nemine vero ipsius voluntati satis factum sit: eandem thesin anno futuro 1757 iterum praefigendam voluit, optans; ut vel iam cognitis, vel nouis potius eum in finem institutis, eruditi declarent experimentis: Quo modo succorum, quos vegetabilia continent, motus atque transpiratio se habeat ratione diuersarum aeris qualitatum diuersique solis aequae ac lunae cursus vel positionis, (*différens aspects du Soleil et de la Lune.*)

Eidem anno 1757 ab *eadem* assignatao \*\* quaestionis solutio: quaenam deputandae vineae optima sit ratio, tum quoad diuersa vitis genera, tum diuersum, quo ea colitur, solum? expectabitur, uti et alterius theseos huicce, quem agimus, anno 1756 praefixae de optimo vina reddendi clara modo.

Nouum denique *Ill. illa Academia* proposuit problema, cuius discussionem anno 1758 dicauit: Quaeenam optima nimirum sint adminicula in locis siccis efficien-

\* vid. Comment. nostr. Vol. IV. Part. I. p. 168.

\*\* loc. cit.



efficiendi prata, et quaenam in illis facillime crescere queant plantae, quibus armenta cum pecoribus pasci possint? (*à y nourrir le gros et le menu betail.*) Commentarii ideo Academiae exhibendi vel ad eius Secretarium, Ill. Praesidem BARBOT, vel ad librariam viduae b. BRVN officinam transmittendi sunt. Reliqua, ut satis nota, cur repetamus, non esse arbitramur.

Quae nuper etiam diximus \* de auditus explicanda theoria, ab Academia scientiarum, quae *Tolosae* floret, pro triplicato praemio, anno 1757 decernendo, proposita, ea nunc quoque ab eadem repetita legimus, praesertim quod roget viros doctos, ut cuiusvis partis, quae ad hoc conformandum organon concurrit, actionem ad soni efficiendi perceptionem necessariam accurate atque solide determinare annitantur.

In ultimo ex illis solemnibus, quos anno quovis celebrat Regia Scientiarum Societas *Gotttingensis*, conventu, nuper die vicesimo secundo mensis novembris habito, dissertationes, quas de variis ab ipsa olim propositis quaestionibus non nulli viri docti ad eam miserant, publico subiecit examini, ex quibus earum, quae physici et oeconomici sunt argumenti, aliquam facere iam lubet mentionem. Quum ad priorem illam de inuestiganda illius terrae utilitate, quae cinerei coloris est et prope Hertzbergam in Ducatu Lüneburgensi effoditur \*\*, soluendam quaestionem commentarii ad Societatem pervenissent nulli; super altera vero, de corio perficiendo, saepe a nobis commemorata \*\*\* conscripti eo plures ad illam missi

\* *ibid.* p. 167.

\*\* *l. c.* Vol. III. P. IV. p. 733.

\*\*\* *l. c.* Vol. III. P. I. p. 165, P. IV. p. 732 et Vol. IV. P. I. p. 166.

missi fuissent: duos ideo ex his ea voluit exornare praemio, quorum unus Virum Cl. ISRAELEM WALTHER, verbi diuini ministrum Westhoffensem prope Wormatiam in Palatinatu inferiore habuit auctorem; alter vero Ill. IOANNEM CHRISTOPHORVM HENNICKE, virum doctum, candidum nobisque amicum, Med. D. Principis Comitumque Hohenloicorum Consiliarium et Archiatrum, Ochringiae in Franconia degentem. Illum priorem, quercuum corticum loco, ad perficiendum corium, genistam in primis, ubiuis fere locorum obuiam, hunc autem posteriorem inter alia, tormentillae potissimum atque symphyti radices, commendasse legimus.

Quod commemorare nuper casu quodam praetermisimus, illud adhucdum cur adducamus, habere nobis videtur, ab eadem nimirum Regia Scientiarum Societate *Gottingensi* Cll. Viros, IOANNEM HENRICVM GOTTLOB DE IVSTI, Potentiss. Magnae Britanniae Regi a consiliis rerum metallicarum, in extraordinariorum, qui praesentes sunt, IOAN. GESNERVM vero, celeberrimum illum physicum et Tiguri in Heluetia Canonicum, in exterorum sociorum numerum, superiore iam anno receptos fuisse.

Vir Cl. IO. ALBERT. SCHLOSSER, Med. D. *Amstelodami* nunc medicinam faciens, quem olim laudandi habuimus occasionem \* in itinere, quod literarum causa abhinc aliquo tempore per quasdam Galliae Angliaeque confecerat prouincias, *Londini* commoratus. Observationes suas, per meridionalem Angliae regionem collectas cum Regia Scientiarum Societate ibidem constituta communicauit, ab eadem ideo, in gratiarum significationem, sociorum ipsius numero adscriptus.

Quam

\* l. c. Vol. III. P. I. p. 60.



Quam singulare corpus sit metallicum omnique et chemicorum et medicorum inuestigatione dignissimum, antimonium, omnes norunt. Quam ob rem factum quoque fuisse constat, ut a multis chemicis illud huc usque variis tentata fuerit et explorata modis. De eo tamen non nulla adhuc sibi suoque studio relictâ fuisse existimavit Cl. IOANNES HVXHAM, Med. D. Plymuthi in Anglia medicinam cum laude faciens, suis potissimum *observationibus de aere et morbis epidemicis* \* inter viros doctos clarus; ideoque in naturam eius indefesso inquisiuit labore, et cuncta, quae in praxi triginta annorum obseruauit, in unum collegit volumen, idque sub forma commentarii Regiae Scientiarum Societati *Londinensi*, cui iam antea adscriptus fuerat socius, obtulit \*\*; qui ab ea quoque tanto cum applausu exceptus fuit, ut in conuentu, die tricesimo mensis nouembris anni praeteriti habito, nummum memorialem, ut palmam, tribueret illius Auctori, quem ex testamento equitis cuiusdam, cui COPLEY nomen fuit, quouis anno dare solet illi, qui vel inuentis, vel observationibus nouis, alios antecellere visus fuit Societati.

Qui *Hamburgi* locum tenet physici dicti illius ciuitatis ordinarii, Cl. FRIDERICVS LVDOVICVS CHRISTIANVS CROPP, Med. D. ab Imperiali Naturae Curiosorum Academia in sociorum numerum receptus nuperrime ideoque CRITONIS tertii cognomine cohonestatus fuit.

M 2

Quan-

\* I. c. Vol. II. P. III. p. 517.

\*\* Infertus ille legitur ultimo, quod superiore anno prodiit, Aëtorum Societatis Scient. Londinensis volumini ad annum 1754 pertinenti, cuius rationem lectoribus nostris proxime exhibituri sumus. Separatim is etiam post recusatus fuit in forma, quam dicunt octauam, additis in eius augmentum aliquot annotationibus.

Quantam ad stabiliendas confirmandasque amicitias vim habeat studiorum similitudo, comprobavit suo huc usque exemplo Cl. IOANNES FRANCISCUS SEGVIERIVS, Instituti Bononiensis Socius et de Regia Scientiarum Academia Parisiensi, Vir, uti doctissimus, sic et integerrimus nobisque amicissimus, sua in primis *bibliotheca botanica, plantisque Veronensibus* inter viros doctos clausus factus, quippe qui singulari quodam amore ductus erga b. SCIPIONEM MAFFEIVM, Virum, dum viueret, inter alia literarum genera, historiae quoque naturalis et amantissimum et studiosissimum, *Nemauso*, quem ipsi locum fortuna dederat patriam, ante plures nunc annos sese contulerat *Veronam*, MAFFEII hospitio omnibusque amicitiae documentis exceptus, ut et huius frueretur familiaritate eoque comite historiae naturali indagandae daret operam. Iucundissimo autem hoc amicitiae vinculo per MAFFEII obitum \* disrupto, nec amplius *Verona* habere visa fuit SEGVIERIO, quo delectaretur. *Nemausum* itaque reuertendi non solum cepit consilium, sed iter quoque eo iam suscepit, exoptatissimum ibidem expectans literarium otium; quo ut diu nec interrupta umquam ratione frui queat Optimus ille Vir, prae ipsius et uniuersae rei literariae amore, ex animo precamur.

*Lipsiam* ad nos qui redierat ex Russia minore dicta ante biennium et quod excurrit, Vir Cl. IOANNES CRISTIANVS HEBENSTREIT, Med. D. Academiae Scientiarum Petropolitanae Socius et Historiae naturalis Professor Honorarius, iterum Petropolin profectus est Lipsia. Is anno 1749 primum in locum GMELINI, nunc beate defuncti, illuc vocabatur; anno 1751 autem ex commendatione b. HERRMANN KAAV BOERHAAVE, Ill. quon-

dam

\* vid. Comment. nostr. Vol. IV. Part, II. p. 358.



dam Potent. Russorum Imperatricis Archiatri, ordinarius constituebatur medicus Praepotentis Russiae minoris *Hetmanni*, qui appellatur illius provinciae praefectus, et Academiae Scient. Petropolitanae Praesidis, Comitis DE RASOVMOWSKY, huncque sequebatur in Ucraniam, postquam ei antea locus inter Academicos Petropolitanos Honorarios cum annuo salario decretus atque datus fuerat. Post obitum b. STEPHANI KRASCHENINNICOWII, Professoris Petropolitani, quem olim habuerat Adiunctum, post Collegam, superiore anno, ut denuo inter Academiae Socios pristinum occuparet locum, et, quo olim functus fuerat, munus iterum susceperet, honorifica nuncupatione ab Academica illa *Cancellaria* dicta inuitatus et singularibus, quae ei insimul oblatae sunt, conditionibus excitatus, hanc provinciam denuo accepit. Scriptis quidem huc usque editis nondum inclaruit; id, quod tamen ideo factum esse scimus, quod partim omne fere tempus rerum naturalium disquisitioni impendit hincque sibi copiosam rerum naturalium cognitionem comparavit; partim medicinam ex voto aegrotorum fecit inter ciues nostros. Interim Illustrissimus Academiae illius Scientiarum Praeses et Cancellariae Academicae Consiliarii, qui eruditionem eius atque merita optime norunt, ideo ad suos eum reuocarunt, quo studium historiae naturalis in amplissimo imperio Russiaco ulterius colat atque perficiat. Relinquit is omnino apud nos, qui integerrima eius fruendi amicitia gausi sumus opportunitate, et desiderium sui, et negotiorum cum fide atque dexteritate peractorum laudem.

*Brunsuiga* nunciatum legimus, quod Vir Illustris, HENRICVS IOANNES DE MEIBOM, Med. D. Sereniss. Brunsuicensis Ducis Consiliarius Aulicus et Archiater, Collegii Medici Decanus et Collegii

Anatomico-Chirurgici Director et Capituli a St. BLASIO dicti Canonicus, acceptam a maioribus dignitatem equestrem publice in posterum se profiteri eaque uti velle declarauerit. Abauus enim ipsius, HENRICVS DE MEIBOM, historiarum peritissimus, a suo Domino, HENRICO IVLIO, Brunsvicensi Duce Episcopoque Halberstadiensi anno 1590 negotiorum gerendorum causa, ad Imperatorem RVDOLPHVM secundum, Pragam missus, ab eo propter insignia sua merita, in equitum ordinem relatus fuerat; quam honorifice partam gloriam proauus, auus paterque Nostri acque, ac hic ipse, suis quoque meritis tuiti fuere.

De operoso illo Viro multaque numquam non moliente, Cl. GAVTIERIO, nouam tabularum suarum anatomicarum ipsum suscepturum esse editionem, ante aliquod tempus ad lectores nostros iam retulimus\*; quam quoque proxime expectari posse nunc accipimus, ita tamen dispositam, ut, quae primum prodibit, illarum edendarum pars supplementi loco inseruiat prioris illius, quae in anatomicorum iam versatur manibus, editionis augmento atque perfectioni. Viginti illa constabit tabulis grandibus, quarum decem repraesentabunt extremitates corporis inferiores, reliquae vero splanchnologiam, angiologiam et neurologiam comprehendent: quam ob rem omnes, qui prius illud opus iam possident, hoc de suo instituto certiores insimulque rogatos cupit, ne hancce ipsis oblatam occasionem, qua absolutum sibi comparare queant opus anatomicum, velint negligere, sed ut nomina sua, quam primum facere possint, vel Auctori ipsi, vel bibliopolae Amstelodamensi, MARCO MICHAELI REY, dare ideoque octoginta quatuor pondo gallica in antecessum soluere haud recusent. Soli enim huic editionis

nouae

\* l.c. Vol. IV. P.I. p. 169.



nouae particulae, omiffa fubfecutura, fubfcribere, uti vocant, licet iis, qui prioris iam fibi compararunt exempla.

Altera, quae iam dictam excipiet huius collectionis, diftributio fex et viginti continebit tabulas, omnes illas icones, quas prior exhibebat editio comprehenfuras. Eos omnes, qui, praemiffa conftituti pretii folutione, editionem operis adiuuant, in duas claffes diuidit Cl. Auctor, unam eorum, qui omnem pro toto opere pecuniam foluent praefentem ante, quam prior eius pars prodierit; quippe qui centum fexaginta octo pondo gallica dabunt; alteram vero eorum, qui, diftributa iam hacce particula priore, accedent, qui ducenta duo numerabunt pondo; ultra haec vero quinquaginta adhuc poftulabuntur ab illis, qui, neglecto prorfus illo tempore, opus illud uniuerfum cupient.

*Monachii* nuperrime, die ianuarii quarto e viuis exceffiffe legimus IOANNEM IOSEPHVM *Nobilem* DE BERGER, Sereniff. Bauariae Principis Electoris Confiliarium et Archiatrum, quatuor et quadraginta annorum aetatem adeptum.



Supplementum alterum indicis scriptorum physico-medidorum, quae anno 1753 prodierunt.

**H**istoire des plantes de l'Europe et des plus usitées qui viennent d'Asie, d'Afrique et d'Amerique, où l'on voit leurs figures, leurs noms, en quel tems elles fleurissent et le lieu où elles croissent, avec un abrégé de leurs qualités et de leurs vertus spécifiques, divisée en deux Tomes et rangée suivant l'ordre du Pinax de GASPARD BAYHIN. à Lyon.

La Chirurgia completa secondo il sistema de Moderni; Tomo I. continente la descrizione breve, ed esatta del corpo umano, la spiegazione della sua meccanica; ed un'idea generale de' suoi disordini; Tomo II. continente la serie delle malattie del corpo umano, i mezzi somministrati dalla Chirurgia per sanarle, i medicamenti, etc. una raccolta delle droghe, etc. traduzione prima dal Francese. In Venezia, 12.

Apologia Anatomica di un Professore di Anatomia, ch'è difesa L. E. D. C. PETRIOLI contra la difesa del S. N. GIRALDI sostenuta del S. BASSANI della dottrina di E. BOERHAAVE nei luoghi confutati da esso PETRIOLI non intesi dal detto Autore e suoi defensori. Roma, 4.

ALEXANDR. AINSLIE, Diss. de vomitu idiopathico. Edimburgi, 4.

Tirocinium botanicum Edinburgense conscriptum a CAROLO ALSTON. Edimburgi, 8.

IO. ARBYTHNOT, specimen effectuum aeris in humano corpore, quod primum gallice interpretatus est Cl. BOYERVS; latine reddidit, additionibus illustravit P. F. F. FELICE. Neapoli, 4. mai.

ION.



- ION. BÖCKMAN, Diff. de sudore corroborante. Resp.  
*Io. Georg. Coliander.* Gryphiswaldae, 4.
- Memoires historiques sur la Louisiane contenant ce  
 qui y est arrivé de remarquable depuis 1687, jusqu'  
 à present avec l'établissement de la Colonie Fran-  
 coise: le climat, la nature et les productions du  
 pais, la religion des Sauvages, leurs moeurs et  
 leurs coutumes composés sur les memoires de Mr.  
 DUMONT. 2 Voll. à Paris, 12.
- Observations sur l'histoire naturelle, sur la physique  
 et sur la peinture, avec des planches imprimées  
 en couleur; par Mr. GAVTIER. Année 1753;  
 septieme, huitieme et neuvieme partie. à Paris,  
 4. mai. c. f.
- NICOL. GIRALDI, Rileffioni anatomiche sopra le  
 censure ultimamente date alla luce contro il dotto  
 Medico E. BOERHAAVE del Sign. GAETANO  
 PETRIOLI. Roma, 8. mai.
- IACOB GRAINGER, Diff. de modo excitandi ptya-  
 lismum et morbis inde pendentibus. Edimburgi,  
 8. mai.
- ROBERT. INNES, Diff. de ileo. Edimburgi, 4.
- GUILIEL. KRAMER, Diff. continens Theoremata  
 physico-medica de lumbricis corporis humani.  
 Viennae Austriae, 4.
- FEHR KALM, Diff. historisk och oeconomisk  
 beskrifning öfwer Sagu-Sokn i Abo laehn. Resp.  
*Christian. Cavander.* Abo.
- Eiusd. Diff. historisk och oeconomisk beskrifning  
 öfwer Siöftaden Nyftad. Resp. *Ephraim Höckert.*  
 ibid.
- Eiusd. Diff. det som bör i åkt tagas vid Belägenhe-  
 ten af en landgord. ibid.
- Guide des accoucheurs de Mr. MENARD. Nouvelle  
 edition. à Paris.
- DONALD MONROO, Diff. inaug. de hydrope.  
 Edimburgi, 8.

Lettre de Mr. MORAND à Mr. LE ROY sur l'histoire de la femme SUPPLOT. à Paris, 8.

GILBERT. STEWART, Diss. de morbis ab actatis mutationibus oriundis. Edimburgi.

PETRI TABARIANI Observationes anatomicae, annotationibus variis, non nullis observatis et novis iconibus ornatae. Editio secunda auctior et completior. Luccae, 4. c. f.

JO. D'VRBAN, Diss. de haemorrhagia uterina. Edimburgi.

EDWARD WRIGHT, Diss. de ferri historia naturali, praeparatis et usu medico. ibid.

### XXIII.

Supplementum indicis scriptorum physico-medidorum, quae anno 1754 prodierunt.

Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Harleem. Erste Deel. Harleem, 8. mai.

Memoires de l'Academie des belles-lettres de Caen. à Caen. 8. (*Argumenti magnam quoque partem physici.*)

Mémoires de Physique pure, sans Mathématiques, de toutes les Academies des Sciences rassemblés en un seul corps et rangés selon l'ordre de leur publication. Tome premier pour les Années 1665, 1666, 1667. à Lausanne, 4. c. f.

Raccolta d'opuscoli scientifici e filologici. Tom 50. Venezia, 12.

Systema Noologiae Medicae more geometrarum conditum. Lemgouiae, 4.

The Scots Gardiner's Director containing instructions to those Gardiners, who make a Kitchen-garden and the culture of flowers, their business etc. particularly adapted to the climate of Scotland, by a Gentleman one of Members of the Royal.



Royal-Society. Edinburgh. 8. (*Auctor esse dicitur*  
Cl. IVSTICE.)

IACOB AINSLIE, Diff. de ictero. Edimburgi.

A dissertation on quik-lime and lime-water by  
CHARLES ALSTON, The second edition. Edin-  
burgh, 8.

Le Microscope à la portée de tout le monde, ou  
Description, calcul et explication de la nature, de  
l'usage, de la force des meilleurs Microscopes;  
traduit de l'Anglois de HENRY BAKER. à Pa-  
ris, 8.

Dissertatio ad Cl. Virum IACOBVM BARTHOLO-  
MAEVM BECCARIVM, qua epidemicae febres in  
Lucensis dominii quibusdam pagis grassantes de-  
scribuntur; nec non mercurii atque corticis Peru-  
uiani usus in earum curatione recto rationis exa-  
mini subiicitur; physicorum tentaminum ope, re-  
medii utriusque viribus exploratis; a IOSEPHO  
BENVENUTO. Accedunt sub finem Cll. Viro-  
rum IOSEPHI XAVERII BERTINI atque IO-  
SEPHI VALDAMBRINI ad auctorem epistolae  
maximae ad rem attinentes. Lucae, 4.

CAROL. AVGVST. DE BERGEN, Diff. inaug. de  
nyctalopia seu caecitate nocturna. Resp. Io. Chri-  
stian. Weise. Francofurti ad Viadr. 4.

IOSEPH BLAK, Diff. de humore acido a cibis orto  
et Magnesia alba. Edimburgi.

Elemens de Chymie par HERMAN BOERHAAVE,  
traduits du Latin. 6 Voll. à Paris, 12.

THEOPHIL. DE BORDEV, Quaest. med. An pro  
temperamentorum diuersitate functionum diuersi-  
tas? Resp. Cleriad. Vachier. Paris, 4. mai.

ANDR. EL. BÜCHNER, Diff. inaug. de praecipita-  
tione chemica generatim considerata. Resp. Iac.  
Ioach. Georg. Cramer de Clausbruch, Halae Magde-  
burgicae, 4.

Eiusd. Diff. inaug. de morborum differentia indiui-  
duali

duali generatim. Resp. *Ernest. Frider. Letzau.*  
ibid. 4.

BVRMESTER, Diss. 1. et 2. de marga, eius historia  
naturali et usu oeconomico. Resp. *Matthias Bo-*  
*beck.* Lundini, 4.

IACOB. CAMPBELL, Diss. de aere quatenus mor-  
borum causa. Edimburgi.

AMAE. CHOMEL, Quaest. med. An a peculiari uteri  
structura fluxus muliebris? Resp. *Guydo Danié*  
*Despatureaux.* Paris, 4. mai.

CHYDENII Diss. de oeconomia et moribus incola-  
rum Lapponiae Kimiensis. Resp. *Henric. Wegeli.*  
Abo.

Tentamen nouae de odoribus theoriae cum physicis  
thesibus publice proponendae a MARCHIONE  
AVGVSTINO CIGLIANO. Sienae, 4. mai.

Le Muse fisiche del DAMIANI. In Firenze, 4.

IO. DIAPER, Diss. de Clystere. Edimburgi.

Lettera di GEMINO EVLABEOFILO ad ORTILAO  
ALETOFILO colla risposta del Medesimo. Luc-  
cae, 8.

Della fluidita de corpi trattato del Padre D. CLAV-  
DIO FROMOND. Livorno, 8. mai. c. f.

IO. SAM. GALLASIUS, Commentatio physico-  
chymico-medica, in causas potissimum inquirens,  
cur aqua regis aurum soluat, argentum non item:  
contra vero aqua fortis, argentum dissoluens, au-  
rum vero nulla ex parte commoueat: atque etiam  
exinde repraesentans, quod aurum fulminans  
neruis opituletur? Regiomonti, 4.

Observations sur l'histoire naturelle, sur la physique  
et sur la peinture, avec des planches imprimées  
en couleur. Par Mr. GAVTIER. Année 1754.  
Dixieme, onzieme et douzieme partie. à Paris, 4.  
mai. c. f.



CAROL. GILLOT, Quaest. med. An perficiendis medicis necessaria peregrinatio? Resp. *Petr. Ioseph. Morisot Deslandes*. Paris, 4. mai.

ALEXAND. GORDON, Diss. de variolis. Edimburgi

ALB. DE HALLER, primae lineae physiologicae. Venetiis, 8. mai.

*Physicalische Gedanken, worinnen erwiesen wird, daß die kupfernen Geschirre in der Haushaltung nicht so schädlich seyn, als die eisernen, in einer Abhandlung vorgestellt und entworffen von IOHANN ANDREAS HARNISCH. Gera, 4.*

Observations d'Histoire Naturelle faites avec le microscope sur un grand nombre d'insectes et sur les animalcules qui se trouvent dans les liqueurs préparées et dans celles qui ne le sont pas etc. avec la description et les usages des differens microscopes, etc. partie déjà publiées par feu Mr. IOBLOT; partie rédigées sur ses observations postérieures; avec un grand nombre de figures. Tom. I. à Paris, 4. mai.

PEHR KALM, Diss. historisk och oeconomisk beskription öfwer Calajoki sokn uti Oesterbom. Resp. *Christian. Salmenius*. Abo, 4.

Eiusd. Diss. historisk och oeconomisk bescription öfwer Cajansborgs län. Resp. *Erich. Castren*. ibid. 4.

Eiusd. Diss. om. Krydd och trögårdens anläggande. ibid. 4.

Eiusd. Diss. de ortu petrificatorum. Resp. *Ieremias Wallerius*. ibid.

A treatise on gangrenes, in which the cases that require the use of the bark, and those in which it is pernicious, unless join'd with proper correcting, are ascertain'd, and the objections to its use in the cure of gangrene consider'd. By THOM. KIRKLAND. Nottingham, 8. mai.

De curatione stranguriae contumacis, frequentem  
maleque tractatam gonorrhoeam virulentam con-  
sequentis, IOHANNIS HIERONYMI LAPI Dis-  
sertatio. Editio altera retractatior et auctior, cui  
primum accedit Eiusdem de Acidula ad ripam Ty-  
beris Epistola ad IOANNEM PETRUM LVCA-  
TELLIVM. Romae, 4. mai.

Narrative of some proceedings in the management  
of Chelsea hospital as far as relates to the dimis-  
sion of SAMUEL LEE. London, 8.

Eiusd. proper reply to the sergeant surgeons defence  
of their conduct at Chelsea hospital. ibid. 8.

CAROL. LINNAEI Genera plantarum eorumque  
characteres naturales secundum numerum, figu-  
ram, situm et proportionem omnium fructificatio-  
nis partium. Stockholm, 8. mai. (*Editio quinta in-  
signiter aucta.*)

Eiusd. Diss. de horticultura academica. Resp. Ioh.  
Gustav. Wollrath. Upsaliae, 4.

Eiusd. Diss. sistens Chinensia Lagerströmiana. Resp.  
Ioh. Laur. Odhelius. Holmiae, 4. c. f.

Lettre sur les maladies veneriennes dans laquelle on  
publie la maniere de preparer le Mercure dont la  
plus forte dose n'excite point de salivation, par  
Mr. LOVIS. à Louxembourg, 12. mai.

Ragionamento sopra i mezzi più necessari per far ri-  
fiorire l'Agricoltura de P. Abate D. VBALDO  
MONTELATICI; colla relazione dell'erba Oro-  
banche, detta volgarmente Succiamele, e del mo-  
do di estirparla del celebre PIER ANTONIO  
MICELI; con un discorso di ANTONIO GE-  
NOVESE, Regio Professore di Etica, sopra il ve-  
ro fine delle lettere e delle scienze. Napoli, 8.  
(*Editio altera.*)

ROBERT. MVRDOCH, Diss. de gonorrhoea. Edim-  
burgi.

F. H. L. MVZELL, Medical and Chirurgical cases.  
London. Essai



Essai sur l'hydrophobie, précédé de l'histoire d'une personne mordue par un chien enragé qui eut l'hydrophobie, et qui fut heureusement guérie. Traduit de l'Anglois de CHRISTOPHLE NYGENT; auquel on a joint une Dissertation sur la chaux vive et sur l'eau de chaux; par CHARLES ALSTON. à Paris, 12. mai.

HERM. GERARD. OSTERDYK, Diss. de motu musculari. Traject. ad Rhen. 4. mai.

NICOL. ROSEN, Theses medicae. Resp. Ioh. Georg. Beyersten. Strengnesiae, 4.

A sett of anatomical tables with explanations and an abridgment of the practice of midwifry; by W. SMELLIE. London, fol. mai.

Trattato di Chirurgia diviso in due Tomi. Il primo contiene un Compendio della detta Arte; ed il secundo un Manuale d'operazioni Chirurgiche. Opera utilissima di PIETRO PAOLO TANARON. 2 Voll. In Firenze, 8.

ALEXAND. THOMSON, Diss. de effectu pathematum in corpus. Edimburgi.

IOH. GOTTSCH. WALLERII Diss. Causas sterilitatis agrorum exponens. Resp. Ioh. Gabr. Bergman. Upsaliae, 4.



Conten-

Contenta in hac Parte.

1. Kongl. Svenska Vetenskaps academiens handlingar för År. 1753. Vol. XIV p. 3.
2. Memoires de Physique pure sans mathematiques de toutes les Academies des sciences etc. Tom. I. à Lausanne p. 32.
3. Recueil de Memoires ou Collection des Pieces academiques. Tom. I. et II. à Dijon p. 36.
4. BERTIN Traité d'osteologie, Tom. I. ad IV p. 38.
5. Essays and observations physical and literary. Vol. I. Edinburgh p. 54.
6. HALLERI Opuscula pathologica p. 80.
7. LINNAEI Diff. exhibens plantas officinales p. 97.
8. EIVSDEM Diff. Censura medicamentorum simplicium vegetabilium p. 99.
9. ROSEN Diff. Idea pharmacopoeae reformatae p. 100.
10. WALLERII Diff. Censurae circa praeparationem medicamentorum chemicorum p. 104.
11. LACHAVASSE Diff. de superfoetatione vera in utero simplici p. 107.
12. GINANNI Opere postume Tom. I. p. 109.
13. IOBLOT Observations d'histoire naturelle faites avec le microscope p. 113.
14. LOESECKE *Abhandlung der auserlesenen Arznei - Mittel* p. 116.
15. Observations sur l'histoire naturelle sur la physique et sur la peinture Tom. II. p. 129.
16. DE FISCHER De senio eiusque gradibus et morbis etc. p. 142.
17. DE LILLE Tractatus de palpitatione cordis p. 156.
18. *Kurtzer Entwurff der Königlichen Naturalien-Kammer zu Dresden* p. 159.
19. BOECKMAN Diff. sistens dejectionem roborantem p. 167.
20. CARTHEUSER Rudimenta oryctographiae Viadrino francofurtanae p. 170.
21. Noua physico - medica p. 172.
22. Supplementum alterum indicis scriptorum physico - medicorum, quae anno 1753 prodierunt p. 184.
23. Supplementum indicis scriptorum physico - medicorum, quae anno 1754 prodierunt p. 186.

